

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷九



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

證治準繩卷九

準繩

痿痺門

痺

醫書

內經謂風寒濕二氣雜至合而為痺其風勝者為行痺

行痺者行而不定也稱為走寒氣勝者為痛痺

痛痺者疼痛苦

注疼痛及歷節之類是也

證治準繩

明 王肯堂 撰

楚世稱為痛風及白虎飛尸之類是也

濕氣勝者為著痺

著痺者著而不移世稱為麻木

不仁之類是也痺者閉也五藏六府正氣為邪氣所閉則痺而不仁靈樞云病人一臂不遂時復移在一臂者痺也非風也要畧曰風病當半身不遂若但臂不遂者痺也

以冬遇此為骨痺以春

遇此為筋痺以夏遇此為脉痺以至陰遇此為肌痺以

秋遇此為皮痺

凡風寒濕所為行痺痛痺著痺之病又以所遇之時所客之處而命其名非此

行痺痛痺著痺之外又別有骨痺筋痺脉痺肌痺皮痺也

陳無擇云三氣襲人經絡

入於骨則重而不舉入於脉則血凝不流入於筋則屈而不伸入於肉則不仁入於皮則寒久不已則入五藏

煩滿喘嘔者肺也上氣噎乾厥脹者心也多飲數溲夜
卧則驚者肝也尻以代踵脊以代頭者腎也四肢懈惰
發欬嘔沫者脾也大抵顯藏證則難治矣又有腸痺胞
痺及六府各有俞風寒濕所中治之隨其府俞以施針
灸之法仍服發散等劑則病自除又有血痺周痺夫飲
作痺皆以類相從也

風痺者遊行上下隨其虛邪與血氣相搏聚於關節筋
脉弛縱而不收宜防風湯 寒痺者四肢攣痛關節浮

腫宜五積散

濕痺者留而不移汗多四肢緩弱皮膚

不仁精神昏塞宜茯苓川芎湯

熱痺者藏府移熱復

遇外邪客搏經絡留而不行陽遭其陰故痺痺燭然而

悶肌肉熱極體上如鼠走之狀唇口反裂皮膚色變宜

升麻湯 三氣合而為痺則皮膚頑厚或肌肉痠痛此

為邪中周身搏於血脉積年不已則成癰疹風瘡搔之

不痛頭髮脫落宜疎風涼血之劑

腸痺者數飲而小

便不通中氣喘爭時作餐泄宜五苓散加桑皮木通麥

門冬或吳茱萸散 胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃
以湯漬於小便上為清涕宜腎著湯腎瀝湯 血痺者
邪入於陰血之分其狀體常如被風所吹骨弱勞瘦汗
出卧則不時搖動宜當歸湯 周痺者在血脉之中上
下遊行周身俱痛也宜蠲痺湯 支飲者手足麻痺臂
痛不舉多睡眩冒忍尿不便膝冷成痺宜茯苓湯 五
藏痺宜五痺湯 肝痺加酸棗仁柴胡 心痺加遠志
茯苓麥門冬犀角 脾痺加厚朴枳實砂仁神麴 肺

痺加半夏紫苑杏仁麻黃 腎痺加獨活官桂杜仲牛
膝黃耆單解 痺在五藏之合者可治其入藏者死

診 粗理而肉不堅者善病痺 關中薄澤為風衝濁

為痺 浮絡多青則痛黑則痺 絡脉暴黑者留久痺

也 脉大而濇為痺 脉來急亦為痺 肺脉微大為

肺痺引胸背起惡日光 心脉微為心痺引背善淚出

右寸沉而遲濇為皮痺 左寸結不流利為血痺

右關脉舉按皆無力而濇為肉痺 左關弦緊而數浮

沉有力為筋痺 遲為寒 數為熱 濡為濕 滑為痰 豁大弦小為虛

行痺

即走注疼痛

行痺走注無定防風湯主之 黃檗蒼朮各二錢各用

酒炒煎就調酒葳靈仙末羚羊角灰臣蒼朮佐芥子使
用薑一片入藥末一錢搗碎以前藥再溫服 東垣云
身體沉重走注疼痛濕熱相搏而風熱鬱不得伸附著
於有形也宜蒼朮黃檗之類 濕傷腎腎不養肝肝自

生風遂成風濕流注四肢骨節或入左肩髃肌肉疼痛
漸入左指中薏苡仁散主之 兩手十指一指疼了一

指疼疼後又腫骨頭裏痛膝痛了右膝痛發時
多則五日少則三日晝輕夜重痛時覺熱行則痛輕腫
却重解云先血後氣乃先痛後腫形傷氣也和血散痛
湯主之 走注又與 節不同歷節但是肢節疼痛未
必行也綱目未免混淆今以專主走注疼痛方具於後
如意通聖散 虎骨散 桂心散 仙靈脾散 沒

藥散 小烏犀丸 沒藥丸 虎骨丸 十生丹 骨

碎補丸 定痛丸 八神丹 一粒金丹 乳香應痛

丸 地龍一兩去土炒水蛭半兩糯米內炒熟麝香二

錢半另研右為細末每服一錢以溫酒調下不拘時候

外貼方牛皮膠一兩水鎔成膏芸臺子安息香川椒

附子各半兩為細末入膠中和成膏塗紙上隨痛處貼

之 草麻子一兩去皮草烏頭半兩乳香一錢另研右

以猪肚脂煉去沫成膏方入藥攪勻塗摩攻注之處以

手心摩娑如火之熱却塗摩患處妙

陳無擇云凡人忽胸背手脚頸項腰膝隱痛不可忍連筋骨牽引鉤痛坐卧不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走注便用風藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚欲為癰疽亂投藥餌亦非也此是痰涎伏在心膈上下變為疾或令人頭痛不可舉或神思昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲口流涎唾手脚重腿冷痺氣不通誤認為癰瘰亦非也凡有此疾但用控涎丹

不過數服其疾如失 痰挾死血丹溪控涎散

痛痺

即痛風

留著之邪與流行榮衛真氣相擊搏則作痛痺若不干其流行出入之道則不痛但痿痺耳隨其痺所在或陽多陰少則為痺熱或陰多陽少則為痺寒雖曰風寒濕三氣雜至合而為痺至四時刺逆從篇於六經皆云有餘不足悉為痺註曰痺痛也此非人氣之邪亦作痛耶且人身體痛在外有皮肉脉筋骨之異由病有不同之

邪亦各欲正其名名不正將何以施治如邪是六淫者
便須治邪是人氣者便須補瀉其氣病在六經四屬者
各從其氣故制方須分別藥之輕重緩急適當其所庶
得經意 有風 有濕 有痰 有火 有血虛 有
瘀血 診其脉浮者風也 緩細者濕也 滑者痰也
洪大者火也 芤者血虛也 澀者瘀血也 因於
風者加減小續命湯或烏藥順氣散去乾薑加羌活防
風 因於濕者遇陰雨即發身體沉重宜除濕蠲痛湯

佐以竹瀝薑汁或大橘皮湯傷濕而兼感風寒者汗出
身重惡風喘滿骨節煩疼狀如歷節風臍下連脚冷痺
不能屈伸宜防已黃耆湯或五痺湯 因痰者王隱君

豁痰湯二陳湯加薑汁竹瀝甚者控涎丹 因火者潛

行散加竹瀝 因濕熱者二妙散 因於血虛者四物

蒼朮各半湯吞活血丹 因瘀血者芎歸桃仁紅花水

蛭入麝香少許 肥人多濕痰 瘦人多血虛與熱

上部痛羌活桂枝桔梗威靈仙 下部痛牛膝防已木

通黃檗 上部腫痛五積散烏藥順氣散加薑蔥煎發
其汗 下部腫痛五苓八正大橘皮湯加燈心竹葉利
小便 若腫痛而大便不通者大柴胡湯防風通聖散
主之 大勢既退當隨其所因之本病施治防其再發
忌羊肉法酒濕麵房勞 寒濕相合腦戶痛惡寒項筋
脊強肩背胛卵痛膝臄痛無力行步能食身沉重其脉
沉緩洪上急宜蒼朮復煎散 目如火腫痛兩足及伏
兔骨筋痛膝少力身重腰痛夜惡寒痰嗽項頸筋骨皆

急痛目多眵淚食不下宜緩筋湯 風濕客於腎經血

脉凝滯腰背腫疼不能轉側皮膚不仁徧身麻木上項
頭目虛腫耳內常鳴下注脚膝重痛少力行履艱難項
背拘急不得舒暢宜活血應痛丸 晝則靜夜則動其

痛徹骨如虎之嚙名曰白虎病痛如掣者為寒多腫滿
如脫者為濕多汗出者為風多於上藥中求之通用虎
骨二兩犀角屑沉香青木香當歸赤芍藥牛膝羌活秦
芫骨碎補桃仁各一兩甘草半兩槲葉一握每服五錢