

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷六十四



南京中医药大学图书馆版权所有

外科
和
劑

方
命
一
治
一
倉
有
消
上
毒
之
生
亦

明
張介賓 撰

未成膿者內消已成膿

風
天花粉

香
沒藥

貝母

皂刺

甘草

錢各二

金銀花

陳皮

錢各三

酒一碗煎數沸溫服

托裏消毒散二

治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰

散服之未成即消已成即潰腐肉即去新肉即生若

腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為

主屬血虛者四物湯為主氣血俱虛者十全大補湯

為主並忌寒涼消毒之劑

人參隨證增減

黃芪鹽水拌炒

當歸

川芎

芍藥炒

白朮炒

茯苓各一錢

金銀花

白芷各七分

甘草

連翹各五錢

右水煎服○陳氏托裏消毒散內多陳皮方在痘瘡

秘方托裏散三

治一切瘡毒始終常服不至內陷

瓜蒌大者一個杵

當歸酒拌

黃芪鹽水炒

白芍藥

甘草各一兩半

熟地

天花粉

金銀花

皂刺炒各一兩

右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封
口再用油紙重封置湯鍋內蓋煮至藥香取出分服
直至瘡愈。立齋曰此方藥品平易消毒之功甚大
且不動臟腑不傷血氣不問陰陽腫潰屢用屢效真
仙方也常治發背腦疽勢盛者更用隔蒜炙之若脉
沉實大小便秘者先用疎通而後用此其功甚捷若
火毒已退不作膿或不潰者更宜托裏潰而不斂及
膿清者用峻補

神功托裏散^四

一名金銀花散

治癰疽發背腸癰

乳癰及一切腫毒或愀痛憎寒壯熱

金銀花

黃芪

當歸

甘草^{等分}

右用酒水各一鍾煎至一鍾分病上下食前食後服之少頃再服一劑相敷患處不問老少虛實皆可服若為末酒調服尤妙

參芪托裏散^五

治瘡瘍氣血俱虛不能起發或腐潰

不能收斂及惡寒發熱者

人參

氣虛多用之

黃芪

炒

白朮

炒

當歸

熟地

芍藥

酒炒

茯苓

陳皮

各一錢

右水煎服

參芪內托散

六

方在痘疹七

治癰疽膿毒不化及潰後作痛

托裏養營湯

七

治瘰癧流注及一切癰疽不足之證

不作膿或不潰或潰後發熱或惡寒肌肉消瘦飲食

不思睡卧不寧盜汗不止

人參

黃芪炙

當歸酒拌

川芎

芍藥炒

白朮炒各一錢

熟地二錢

五味子炒研

麥冬

甘草各五分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

托裏黃芪湯八

治癰疽氣虛作渴甚效

黃芪

蜜炒六錢

甘草

天花粉

各一錢

水二鍾煎八分頻服之○加人參一錢亦可○若氣

血俱虛膿血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養

營湯

內補黃芪湯九

治癰毒內虛毒不起化及潰後諸虛

迭見

黃芪炙

麥冬各一兩

人參

熟地

茯苓

甘草炙各七分

白芍藥

當歸

川芎

遠志

官桂各五分

右每服一兩薑棗水煎服

托裏當歸湯十

治潰瘍氣血俱虛或晡熱內熱寒熱

往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數大便不實等證但瘡瘍氣血虛而發熱者皆宜服之久服亦收斂瘡口

人參

黃芪

當歸

熟地

川芎

芍藥

各一錢

柴胡

甘草

各五分

右水煎服

托裏健中湯

十一

治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃

飲食少思或作嘔瀉等證

人參

白朮

茯苓

錢各二

半夏

炮薑

錢各一

黃芪

半一錢

炙甘草

五分

肉桂

三分

右薑棗水煎服

托裏溫中湯

十二

治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因剋伐

胃氣脫陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏憤此寒變內

陷緩則不治

附子

炮去皮
臍二錢

乾薑

炒三錢

益志

丁香

羌活

沉香

木香

茴香

陳皮各一錢

炙甘草二錢

右薑水煎服

托裏益中湯十三

治中氣虛弱飲食少思或瘡不消

散或潰而不斂

人參

白朮

茯苓

炮薑

陳皮

半夏各一錢

木香

炙草各五分

右薑棗水煎服

托裏溫經湯十四

治瘡瘍寒覆皮毛鬱遏經絡不得

伸越熱伏營中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭面腫痛炊甚仍宜砭之

麻黃

升麻

防風

乾葛

白芷

人參

當歸

芍藥

甘草

蒼朮

錢各一

右水二鍾煎一鍾服臥煖處得汗乃散○或加柴胡

托裏益黃湯

十五

治脾土虛寒水反侮土以致飲食

少思或嘔吐泄瀉等證

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏錢各一

炮薑

丁香

甘草錢各五

右薑棗水煎服

托裏清中湯十六

治脾胃虛弱痰氣不清飲食少思

等證

人參

白朮

茯苓

陳皮錢各一

半夏八分

桔梗七分

甘草五分

右薑棗水煎服

托裏抑清湯_{十六}

治肝木侮脾脾土虛弱以致飲食

少思或胸膈不利等證

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮

各一錢

芍藥

柴胡

甘草

各五分

右薑棗水煎服

托裏營衛湯_{十八}

治瘡瘍外無炊腫內便調和乃邪

在經絡也宜用此藥

人參

黃芪

當歸

甘草

炙

紅花

柴胡

連翹

蒼朮

米泔浸炒

羌活

防風

黃芩

各一錢

桂枝

七分

右酒水煎服

托裏越鞠湯

十九

治六鬱所傷脾胃虛弱飲食少思

等證

人參

白朮

各二錢

陳皮

半夏

各一錢

山梔

川芎

香附

蒼朮

各七分

炙甘草

五分

右薑棗水煎服

定痛托裏散 二十

治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也

栗殼

去蒂炒
二錢

當歸

酒拌

白芍藥

炒

川芎

各一
錢半

乳香

沒藥

肉桂

各一
錢

右薑棗水煎服

內托復煎散 二一

治瘡瘍焮腫在外其脉多浮邪勝

必侵於內宜用此托之

人參

白朮

炒

當歸

黃芪

鹽水
炒