

大小便不通

二陳湯

痰飲

通聖散

眩暈

涼膈散

發熱

厚朴大黃湯

見痞

甘遂散

右以甘遂貳兩赤皮者爲末煉蜜貳合和勻
每壹兩重分作肆服日進壹服蜜水下未知
日貳服漸加之

又方

葵子末參合青竹葉膏把水壹升煮五

沸賴服

又方
葵子末參合水壹升煮去滓分作貳服
入猪脂貳兩空心服

三白散 治陰囊腫脹大小便不通

白牽牛 貳兩
桑白皮

白术

木通

去節各半兩

陳皮

右爲細末每服貳錢薑湯調下空心服未覺
再進

大便不通

麻仁丸

和劑

治腸胃熱燥大便祕結

厚朴

去皮
製炒

芍藥

枳實

麸炒各半

大黃

蒸焙一斤

麻仁

別研伍兩

杏仁

去皮尖炒伍兩半

右爲末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸臨
卧用溫水下大便通利則止

寶鑑麻仁丸

順三焦和五臟潤腸胃除風氣

治冷熱壅結津液耗少令人大便祕難或閉
塞不通若年高氣弱及有風人大便祕澀尤

宜服之

枳殼

去瓢
炒熟

白檳榔

煨半
生

兔絲子

酒浸
別未

山藥

防風

去叉枝

山茱萸

肉桂

去龐
皮

車前子

各壹兩半

木香

羌活

各壹兩

郁李仁

去皮
另研

大黃

半蒸
生

麻仁

另搗研
各肆兩

右爲細末人別研藥和勻煉蜜丸如桐子大
每服拾伍丸至貳拾丸溫湯下臨卧服
七宣丸和療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛

在腹中及積年腰脚疼痛冷如冰石脚氣
心煩憒頭旋暗倒肩背沉重心腹脹滿
痞塞及風毒連頭面腫大便或秘小便時澀
脾胃虛痞不食脚轉筋攣急掣痛心神恍惚
眠寐不安東垣云治在脉則瀦在時則秋

桃仁

去皮尖炒

柴胡

去苗

荳子皮

枳實

麸炒

木香

各伍兩

甘草

炙肆兩

大黃

麵裹煨拾伍兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸食前

臨臥各壹服米飲下以利爲度覺病勢退服
五補丸此藥不問男女老幼皆可服量虛實
加減丸數

七聖丸和劑治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕
唾稠粘心煩面熱咽乾口燥肩背拘急心腹
脇肋脹滿腰腿重疼大便秘小便赤睡卧不
安東垣云治在脉則 在時則春

肉桂

去皮

川芎

大黃

酒蒸

檳榔

木香各半

羌活

郁李仁

去皮
各壹兩

右朱味爲末煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸
食後溫湯送下山嵐瘴地最宜服虛實加減
之

厚朴湯

染古

厚朴

製

陳皮

甘草

各叁兩

白术

伍兩

半夏麴

枳實

炒各貳兩

右爲麴末每服參伍錢水壹盞半薑參一片棗
壹枚煎至捌分食前大溫服

風祕小續命湯

中風

阜角丸

得專治有風人臟腑祕澀大効

猪牙阜角

厚枳殼

去瓢羌活

桑白皮

檳榔

杏仁

製同下另研

麻仁

另研去白

防風

川白芷

陳皮

去白各等分

右爲細末蜜丸如桐子大每服參伍拾丸溫白湯送下蜜湯亦可

又方阜角丸 治大腸有風大便祕結尊年之

仄宜服

阜角

去子

枳殼

去穰炒各等分

右爲末煉蜜和丸如桐子大每服柒拾丸空心食前米飲送下

疎風散 治風毒祕結

枳殼

製半兩

防風

羌活

獨活

檳榔

白芷

威靈仙

蒺藜

炒赤去刺

麻仁

炒另研

杏仁

湯洗去皮尖炒另研

甘艸

炙各壹兩

右剉散每服貳錢半生薑伍片密壹匙水壹
盞半煎服

枳殼丸 治腸胃氣壅風盛大便祕實

阜角去皮弦子炙 枳殼炒

大黃

羌活

木香

橘紅

桑白皮

香白芷

各等分

右爲末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心
米飲下又方只用枳實阜角等分飯飲丸亦妙
仁丸 專治虛人老人風祕不可服大黃藥

者

杏仁

去皮尖
炒黃

麻仁

各另研

枳殼

去瓢
炒赤

荊子

慢火炒褪去
核各等分

令

右爲末煉蜜丸梧子大每服參拾丸溫湯下

藿香正氣散

中風

半硫丸

和

治年高冷祕虛祕及痃癖冷氣

半夏

湯洗柒次焙
乾爲細末

硫黃

明淨好者研令極細
用柳木槌子殺過

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻

入白內杵數百下丸如梧子大每服拾伍丸
至貳拾丸無灰溫酒或生薑湯任下婦人醋
湯下俱空心服

氣必蘇子降氣湯 養正丹並氣

來復丹中暑

木香檳榔丸氣

六磨湯 治氣滯腹急大便祕澀

沉香

木香

檳榔

烏藥

枳殼

大黃

各等分

右各件熱湯磨服

三和散

和剂

治五藏不調三焦不和心腹痞悶

脇肋脹脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀大便祕難雖年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣上攻胃腹滿悶大便不通

羌活

去蘿

紫蘇

去籠梗

宣州木瓜

薄切焙乾

沉香

大腹皮

炙焦黃各壹兩

芎藭

參兩

甘草

炒

陳皮

去白

木香

檳榔

麵裹煨熟去麵

白术

各半

右爲麤末每服貳大錢水壹盞煎至陸分去滓溫服不拘時

橘杏丸得治氣祕老人虛弱人皆可服

橘紅

取末

杏仁

湯浸去皮尖另研各等分

右和勻煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲送下

蘇麻粥順氣滑大便

紫蘇子

麻子仁

不拘多少

右貳味研爛水瀘取汁煮粥食之

小通氣散 治虛人憂怒傷肺肺與大腸爲傳

送致令祕澀服燥藥過大便秘亦可用

陳皮

去白

蘇嫩莖葉

枳殼

去穰

木通

去皮節各等分

右剉散每服四至水煎溫服立通

熱祕

四順清涼飲

發熱

大承氣湯

宣明

大黃

芒硝

厚朴

去麤皮

枳實

各半兩

右剉如麻豆大分半用大水壹盞半生薑參片
煎至陸分內硝煎去滓服

小承氣湯

大黃

半兩

厚朴

去麌皮

枳實

各參半

右剉如麻豆大分作貳服水壹盞生薑參片
煎至半盞絞汁服未利再服

大黃飲子 治身熱煩躁大便不通

大黃

濕紙裹
燶貳

杏仁

炒去皮尖

枳殼

麸炒

梔子仁

生地黃

各壹

川升麻

壹