

雜證論治

歌曰

婦人天癸有常經
血滿衝任匝月行
不及期來知是熱
過期血少自分明
若然色淡因痰滯
熱極多來紫黑形
氣滯未行先作痛
更時行過腹中疼
去多不住加涼血
來少無疼大補榮
經閉要推虛實候
血枯氣竭熱痰因

調經



內經云太衝脉盛月事以時下景岳云衝為五臟六腑之海臟腑之血皆歸衝
脉可見衝脉為月經之本也然血氣之化由於水穀水穀盛則血氣亦盛水穀
衰則血氣亦衰是水穀之海又在陽明可見衝脉之血又從由陽明水穀所化
而陽明胃氣又為衝脉之本也故月經之本所重在衝脉所重在胃氣所重在
心脾生化之源耳心主血脾統血肝藏血凡傷心傷脾傷肝者均能為經之病
內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息賁
者死不治不得隱曲言情欲不遂而病發心脾也風消者發熱消瘦胃主肌肉


也。息賁者，喘息上賁，胃氣上逆也。此雖言病發心脾而寔重在胃氣，因心為胃之母，胃為脾之腑也。內經又曰：有病胸脇支滿者，妨於食，病至則先聞腥臊臭，出清液，先唾血，四支清，目眩，時時前後血，病名血枯。此得之年少時有所大脫血，若醉入房中，氣竭肝傷，故月事衰少來不也。治之以四烏鯁骨、蘆茹二物并合之丸，以雀卵大如小豆，以五丸為候，飯飲以鮑魚汁，利腸中及傷肝也。此段經文全重在氣竭肝傷四字為通節之綱旨。胸脇肝部也，支滿肝病也，妨於食木邪凌土也，病則先聞腥臊臭，脾喜芳香，今脾土為木邪凌虐，病則先聞腥臊，乃肝之旺氣也，出清液，脾虛不能敷化水精也，先唾血，脾傷不能統運營血也。

四肢清陽衰不能傍達四末也。目眩陽不充而水上溢於經也。前後血陰受傷而血內溢於絡也。血枯內有乾血血不歸經胞門也。良由年少不禁氣竭肝傷而致月事衰少或不來也。治以烏鰂骨四分取其味鹹走腎性溫達肝配以蘆茹一分取其辛散內風溫去惡血二物并合功專破宿生新丸以雀卵取其溫補助陽能調子臟精血以五丸為後飯者先葯後飯使葯徐行下焦力貴專功五丸不為少也。飲以鮑魚汁利腸垢和肝傷取其臭穢之味佐以烏鰂骨而辟宿之積血也。金匱要畧言調經之法甚詳後世如王節齋薛立齋諸賢論症透術用方精切俱可為程蘇不具贅今觀葉先生案竒經八脉固屬扼要其次最

重調肝因女子以肝為先天陰性凝結易於拂鬱。則氣滯血亦滯。水病必妨土。故次重脾胃。餘則血虛者養之。血熱者涼之。血瘀者通之。氣滯者疎之。氣弱者補之。其不治之症。真言以告之。誠一代之良上。女科之明鑑也。

昂按月經先期為熱。後期為寒。為虛為鬱。為痰。丹溪曰。經水者陰血也。陽必從陽。故其色紅。上應夫月。其行有宿。故名曰經。為氣之配。因氣而行。成塊者。氣之凝。將行而痛者。氣之滯。行後作痛者。氣血俱虛也。色淡亦虛也。錯亂妄者。氣之亂也。紫者氣之熱。黑則熱之甚也。今人見紫黑作痛。或塊。率指為風冷。乘之而用溫熱之劑。禍不旋踵。此火極反見水。化熱甚。則紫黑也。若風冷。必須外得此。

十不二也。玉機微義曰：寒則凝而不行，既行而紫黑，故知非寒也。



調經

溫通氣血方 治因鬱氣血阻滯亂經不孕宜補通氣血

當歸 芍藥 熟地 枸杞 肉桂 川芎 山查 小茴香 蘼艾

此方通而不滯能理氣血走衝任通經而不傷元

黃耆建中湯 治鬱損經遲久嗽背寒脈虛食減汗出或寒熱如瘧

黃耆 桂枝 芍藥 甘草 元棗 飴糖

歸耆建中湯 治勞傷久嗽背寒晨汗減食脈虛如數經遲腹痛

當歸 黃耆 桂枝 芍藥 甘草 飴糖 生姜 元棗

此久嗽形寒減食顯然內損成勞大忌寒涼清熱止咳

逍遙散 治經遲腹痛脘閉食減脈濡或弦

當歸 白朮 芍藥 柴胡 茯苓 甘草 炙甘草 附子 鬱金 神麴 陳皮

歸脾湯

治鬱傷肝脾經遲氣弱或腹痛脈濡或寒熱便溏減食不寐俱屬鬱
勞氣血不行營衛困頓例進甘溫培養元氣

人參 白朮

茯苓 甘草

黃耆

當歸 炙甘草

遠志

廣木

貝母

赤芍湯

治脾肺氣鬱帶下血不足驚悸盜汗發熱食減瘦倦氣短肆落便

赤月經不調

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 白芍 熟地 肉桂 遠志

五味 陳皮 黃耆

八珍湯 治氣血兩虛營衛不調或腹痛經少

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 芍藥 熟地

或加茴香 蘼艾 枸杞 肉桂 紫石英

十全湯 治氣血大壞諸症 蜂起或崩或漏或發熱脈微或大而豁內真寒外

假熱等症

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 白芍 熟地 黃芪 肉桂

溫養衝任方

治經少色淡錯亂不孕下焦肢體常冷或酸軟此衝任脈損無

有貯蓄宜溫養肝腎栽培生氣

人參 歸身 川芎

白芍

熟地

肉桂

坎炁

經水寒

香附

小茴香

石英

益母

蘄艾

大營煎

治精血虧損經遲血少腰膝心腹疼痛

當歸 熟地

枸杞

杜仲

肉桂

牛膝

甘草

此方較左右歸無芎肉淮山而有當歸牛膝之通運使血中之氣行而

不滯也

溫通八脉方

治奇脉震寒經亂痲泄少腹滯痛氣冲嘔逆或下焦痲痺及腰

腎脊髀痲痛

當歸 焦熟地

枸杞 芍藥

肉桂

杜仲

補骨脂

鹿角霜

茯苓

小茴

淡從蓉

益母

指南又有八珍去白朮甘味加小茴肉桂蘄艾系附石英河車

青囊班龍丸

治肝腎虧損八脉空虛腰脊尻髀痲痛因久病崩淋衝任失營

鹿角霜

鹿角膠

補骨脂

兔絲子

熟地

茯苓

柏子仁

杜仲

淡從蓉

加

復脈湯法

治鬱損肝腎至陰脈細而數營液內虛經阻內熱心腹灼熱宜滋

陰液

人參 麥冬 生地 阿膠 龜版膠 白芍 石斛 女貞子 甘草

蔥白丸

治鬱久氣血阻痺癢癢經阻

當歸 白芍 川芎 熟地 肉桂 乾姜 茯苓 三稜 莪朮

青皮 木香 厚朴 枳殼 神麩 麦芽 大茴 川楝子

蔥白汁丸 蘄艾紅束湯吞

回生丹 治氣血瘀滯經閉腹痛脹滿或癥瘕積聚血痺成勞用此宣通氣血

此丹坊間可免药味多品方在指南集方故不列

通經方

氣血凝滯

治經閉腹痛屬氣血凝滯之實者

當歸

川芎

元胡

桃仁

澤蘭

炙附

山楂

青皮

牛膝

益母草

甚加三稜莪朮寒加肉桂乾姜

血蠱丸

治經閉腹脹成蠱

歸尾

桃仁

赤芍

三稜

五靈脂

蒲黃

山楂

元胡索

炙附

多附

木香

青皮

烏药

或加酒

大黃

或加桂枝

此方勿作湯药須預合之緩攻為宜

香砂二陳湯 治久鬱痰凝氣滯胸悶嘔逆經阻此肝胃見症宜通陽明泄

厥陰後當溫補

香附 砂仁 陳皮 半夏 茯苓 甘草 吳萸 小茴 姜汁引

烏鰂骨丸 治胸脇支滿妨食症至先聞腥臊臭出清液先唾而肢清眩目

時之前後血病名血枯

烏鰂骨丸 盧茹 二藥為末以雀卵丸之如小豆大每服五丸空服

以食壓之飲以鮑魚汁下之

澤蘭湯 調經通血脈治經閉成勞

澤蘭 當歸 芍藥 熟地 菟絲子 牛膝 柏子仁

益母勝金丹 治全上

當歸 川芎 芍藥 熟地 冬白朮 牛膝 紫丹參 羌蔚 炙附

將香附以酒醋鹽紅姜汁各炒一次以益母汁一斤酒水各半煎

經遲腹痛為寒加桂經早血熱為熱加黃芩丹皮凡遇行經作痛乃血凝氣滯加元胡

順經方 治經期不轉咳嗽失血為例經重症宜順氣導血

降香 鬱金 蘇子 山查 丹皮 山施 阿膠 丹參 羌蔚

汪云凡倒經吐血用鬱金末加韭汁姜汁童便服之其血自清痰中帶血者加竹瀝

姚江種子方

當歸の

川芎の

芍藥の

肉桂の

泡姜の

丹參の

元胡索の

杜仲の

炙附の

甘草の

三帖先服

引老酒一杯艾葉の

接服後方五帖

党參の

白朮の

當歸の

川芎の

芍藥の

熟地の

杜仲の

泡姜の

肉桂の

香附の

艾葉の

大棗

生薑