

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷三十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷三十一

刪補名醫方論卷六目錄

桂枝湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

葛根湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

越婢湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

桂枝加附子湯

芍藥甘草附子湯

桂枝甘草湯

桂枝加芍藥加大黃湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

小建中湯

炙甘草湯

桂枝人參湯

葛根黃芩黃連湯

白虎湯

白虎加人參湯

豬苓湯

五苓散

茵陳五苓散

桂枝去芍加苓朮湯

十棗湯

御纂醫宗金鑑卷三十一目錄

醫宗金鑑卷

名醫方論

快易

白濁寒在表

烏丸

汗

頭痛發熱惡風惡寒鼻
汗虛損虛瘡亦可用若
寒而汗出者禁用

生薑 三兩

甘草 二兩
炙

大棗 十二枚

右五味以水七升煮取三升服一升覆令微汗不可令如水流漓病必不除若服一升汗出病痊不必盡劑服已更飲稀粥一盞以助藥力

註凡風寒在表岷浮弱自汗出者皆屬表虛宜桂枝湯主之名曰桂枝湯者君以桂枝也桂枝辛溫辛能散邪溫從陽而扶衛芍藥酸寒酸能斂汗寒走

陰而益榮桂枝君芍藥是於發散中寓斂汗之意
芍藥臣桂枝是於固表中有微汗之道焉生薑之
辛佐桂枝以解肌表大棗之甘佐芍藥以和榮裏
甘草甘平有安內攘外之能用以調和中氣即以
調和表裏且以調和諸藥矣以桂芍之相須薑棗
之相得藉甘草之調和陽表陰裏氣衛血榮並行
而不悖是剛柔相濟以為和也而精義在服後須
臾飲熱稀粥以助藥力蓋穀氣內充不但易為釀

汗更使已入之邪不能少留將來之邪不得復入也又妙在溫服令一時許熱熱微似有汗是授人以微汗之法不可令如水流漓病必不除禁人以不可過汗之意也此方為仲景羣方之冠乃解肌發汗調和榮衛之第一方也凡中風傷寒脈浮弱汗自出而表不解者皆得而主之其他但見一二證即是不必悉具故麻葛青龍發汗諸劑咸用之也若汗不出麻黃證也脈浮緊者麻黃脈也固不

可與桂枝湯然初起無汗當用麻黃發汗如汗解
後復煩脈浮數者與下後脈仍浮氣上衝者及下
後下利止而身痛不休者皆用此以解外何也蓋
此時表雖不解腠理已疏邪不在皮毛而在肌肉
且經汗下津液已傷故脈證雖同麻黃而主治當
屬桂枝矣粗工妄謂桂枝湯專治中風不治傷寒
使人疑而不用又謂專發肌表不治他病不知此
湯倍芍藥生薑加人參名桂枝新加湯用以治榮

表虛寒肢體疼痛倍芍藥加飴糖名小建中湯用
以治裏虛心悸腹中急痛再加黃耆名黃耆建中
湯用以治虛損虛熱自汗盜汗因知仲景之方可
通治百病也

麻黃湯

治太陽風寒在表頭項強痛發熱身疼腰痛骨節痛
惡風寒無汗胸滿而喘其脈浮緊或浮數者用此發
汗雖有是證若脈浮而弱汗自出或尺中脈微與遲
者俱不可用風寒濕成痺肺經壅塞昏亂不語冷風
哮喘最宜

麻黃

三兩
去節

桂枝

二兩

甘草

一兩
炙

杏仁

六十枚
去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合溫覆取微汗不須歠粥一服汗出停後服汗出多者溫粉撲之

註凡風寒在表衄浮緊數無汗者皆表實也宜麻黃湯主之名曰麻黃湯者君以麻黃也麻黃性溫味辛而苦其用在迅升桂枝性溫味辛而甘其能在固表證屬有餘故主以麻黃必勝之算也監以桂枝制節之妙也杏仁之苦溫佐麻黃逐邪而降逆

甘草之甘平佐桂枝和內而拒外飲入於胃行氣
於元府輸精於皮毛斯毛脈合精溱溱汗出在表
之邪必盡去而不留痛止喘平寒熱頓解不須歎
粥而藉汗於穀也其不用薑棗者以生薑之性橫
散於肌碍麻黃之迅升大棗之性泥滯於膈礙杏
仁之速降此欲急於直達稍緩則不迅橫散則不
升矣然則為純陽之劑過於發散如單刀直入之
將用之若當一戰成功不當則不戢而召禍故可