

史君子

肉一兩
麵煨

甘草

炙

訶子肉

半生半
煨

厚朴

姜汁
炙

青黛

各五
錢

陳皮

二錢
五分

右爲末煉蜜丸芡實大每服三五丸米飲化下

白玉散

治丹瘤

白土

二錢
五分

寒水石

五錢

右爲末用米醋或新水調塗

薛按前方性味寒涼六腑受患毒發於表二便調和乳食如常固爲可用若胃氣虛弱者反凝滯瘀血益增其患重者須吮毒血各聚於一處砭出以泄之遍身者當隨其患處各吮聚砭之更服仙方

活命飲大便不通者更加大黃如不應加大連翹
飲治法雖多無如砭法為良百日内患者難治
神功散 治瘡瘍腫脅作痛未成者敷之即散已潰
者敷之即愈丹瘤用之尤妙但砭縫作痛

黃栢炒

草烏炒

血竭各等分

右為末津調敷患處

柳華散 治熱毒口瘡

黃栢炒

蒲黃

青黛真正者

人中白

煨各等分

右為末敷之

仙方活命飲 治一切瘡毒未成內消已成即潰此

消毒排膿止痛之聖藥也若膿出而腫痛不止者

元氣虛也當補之

川山甲

白芷

防風

沒藥

甘草

赤芍藥

當歸尾

乳香

天花粉

貝母

各一錢

金銀花

陳皮

各三錢

皂角刺

一錢

右每服二三錢酒水各半煎

塌氣丸

治肚腹虛脹

胡椒 一兩

蝎尾 五錢
去毒

右爲末麪糊丸粟米大每服一二十丸陳米飲下
薛按前症屬脾肺虛水氣泛而喘急浮腫必兼溫
補脾土以生肺金而氣自運行矣但前藥性屬辛
熱雖能祛散寒邪而恐真氣皮傷不可過劑

消積丸 治食積大便秘臭發熱

丁香 九箇

縮砂 十二箇

巴豆 二粒
去皮心膜

烏梅肉 三箇

右爲末麪糊丸黍米大每服五七丸溫水下

薛按前症若食積既去而熱不退或作嘔少食宜

用五味異功散以補胃氣或用四君子加藿香半
夏以安中氣若兼泄瀉用六君子湯如不應加升
麻柴胡以升補脾氣若久瀉不已宜用補中益氣
湯以升補陽氣若虛寒加炮薑木香如不應兼以
四神丸以補脾腎若體瘦潮熱口渴大便不調宜
用肥兒丸以消疳積

保和丸 治食積

山楂 二兩

神麴 二兩

半夏

茯苓 各一兩

陳皮

連翹

蘿蔔子 各五錢

右爲末粥糊丸桐子大每服一二十九白湯下

清中解鬱湯

治脾氣虛弱飲食停滯鬱熱生痰或

身發赤暈

白朮

炒

茯苓

陳皮

山梔

炒

山查

神麴

炒

麥芽

炒

川芎

桔梗

甘草

炙各五分

右每服二三錢水煎

四神丸

治脾腎稟虛泄瀉不食或不食去後不寤

或乳母患此致兒爲患

肉苳蔻

二兩

補骨脂

四兩

五味子

二兩

吳茱萸

一兩

右爲末用水二碗生薑八兩紅棗一百枚煮熟取

棗肉和末丸麻子大每服二三十丸空心食前白

湯下子母並服

香連丸

治赤白痢疾并水瀉暑瀉

黃連

淨二
十兩

吳茱萸

去梗
十兩

右先將二味用熱水拌和人磁器內置熱湯中頓

一日同炒至黃連紫黃色去茱萸用連爲末每末四

末入木香末一兩淡醋米飲爲丸如麻子大每服

四五十九白滾湯下

五苓散

治霍亂吐瀉躁渴飲水小便不利

澤瀉

五錢

猪苓

官桂

赤茯苓

白朮

各三錢

右爲末每服一二錢白湯調下

薛按前症若津液偏滲於大腸大便瀉而小便少

者宜用此藥分利若陰陽已分而小便短少者此

脾肺氣虛而不能生水也宜用補中益氣湯加麥

門五味虛火上炎而小便赤少者此肺氣受傷而

不能生水也用地黃丸加麥門五味

大黃丸

治風熱便秘飲水

川芎

五錢

甘草

炙二錢五分

黑牽牛

五錢半生半炒

大黃

一兩酒洗蒸晒

右爲末糊丸麻子大每服數丸溫蜜水下

薛按前方乃內疎之峻劑審其因果屬臟內實熱

方可用

白虎湯

治傷暑煩躁身熱痰盛頭痛口燥大渴

知母

一兩五錢

石膏

四兩

白粳米

八錢

甘草

炙五錢

右爲末每服一二錢水煎

羌活散

治風邪所傷頭目昏眩痰涎壅滯肢節煩

疼

羌活

前胡

麻黃

白茯苓

川芎

黃芩

甘草

炙

蔓荊子

枳殼

麩炒

細辛

石膏

另研

菊花

防風

各兩

右爲末每服一二錢水煎

地骨皮散

治壯熱作渴

地骨皮

茯苓

甘草

柴胡

半夏

人參

知母各等分

右爲末每服一二錢水煎

大羌活湯

羌活

獨活

防已

防風

黃芩

黃連

蒼朮

白朮

甘草炙

川芎

細辛各一錢

知母

生地黃各一錢

右爲末每服一二錢水煎熱服

人參羌活散 治傷寒時氣頭疼發熱

人參

羌活

獨活

柴胡

前胡

桔梗

茯苓

枳殼

麩炒

川芎

天麻

地骨皮

甘草

炒二分

右入薄荷三葉水煎

薛按前方乃解肌發表化痰利氣之劑然元氣虛

者宜用清肺散

秘旨清肺散

治感冒發熱鼻流清涕或咳嗽吐痰

輕者分藥自愈重者用此輕和之劑

橘紅

半夏炮

桔梗炒

川芎各五分

白茯苓

桑白皮蜜炙各七分

甘草炙

防風各四分

薄荷

枯黃芩炒各三分

白朮一錢

右每服二三錢薑水煎

薛按前症若風邪退而痰熱不止但健中氣則痰自化而病自愈若專用化痰利氣則中氣愈虛痰熱愈甚矣

敗毒散 治傷寒時氣寒熱咳嗽

人參

茯苓

甘草炒

前胡

川芎

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼

麩炒各等分

右爲末每服一二錢生薑薄荷水煎

薛按秘旨云小兒雖有感冒傷風鼻塞流涕發熱咳嗽以降痰爲主略加微解凡散利敗毒非幼雅所宜或胃輕者不必用藥候一二日自愈竊謂前症若手足冷或腹脹脾虛也用六君子湯加柴胡升麻若腹脹或氣喘肺虛也用四君子湯加柴胡升麻蓋肺虛則腠理不密外邪易感發表之後其

邪既去即補脾肺以實其表庶無變症矣

百部丸 治肺寒壅嗽微喘

百部炒

麻黃各三分

杏仁四十箇微炒水煮

右爲末用蜜丸皂子大每服一二丸薑湯化下

麻黃湯 治傷風發熱無汗咳嗽喘急

麻黃去節三錢水煮去沫漉出曬乾

肉桂二錢

甘草炙一錢

杏仁七箇去皮尖麩炒黃研膏

每服一錢水煎服以汗出爲度自汗者不宜服

薛按前方乃發表出汗之劑審其寒邪在表宜用

若邪既去宜補脾肺以實其表庶風邪不能再入

往往表散之後熱嗽不退復行發表多變壞症

地黃清肺飲 治肺疳咳嗽痰唾稠粘

阿膠 一錢 麩炒

鼠粘子 二分 炒

馬兜鈴

甘草 炙各五分

杏仁 七枚 法 皮尖

糯米 十粒 炒

右每服一錢水煎

葶藶丸 治傷風咳嗽面赤身熱痰盛喘促

甜葶藶 隔紙 略炒

黑牽牛 炒

杏仁 炒黃 研膏

漢防已 各一兩

右為末入杏膏蒸棗肉搗丸麻子大每服十丸薑

湯下