

用弔炎藥之意令皮膚內各質之病能愈，卽如心肺有病，胸上加弔炎藥，腦髓有病，耳後貼弔炎藥，用於他處者，意亦相同，其理難明，祇以爲皮膚上生一種輕病，則皮膚內之重病可減，且腦氣筋之性情，以外病爲重，注意於皮外之病，而皮內之病可減，但此說尙無確據，要之，人身內有舊炎症，若用弔炎藥能得其大益也。

第一方 治髮落不能茂盛者

斑蝥醋半兩 香水一兩 玫瑰花水一兩 三物調和搽於髮根內

第二方 治凍瘡

斑蝥酒三錢 樟腦洗藥十一錢 二物調和洗之

第三方 治傷筋或腹痛

斑蝥酒一錢半 樟腦洗藥一兩半 鴉片酒三錢 三物調和擦之

化痰藥 此類之藥其性能令肺之內皮並行氣之內皮合其常度如生
炎而有痰則爲內皮所生之料不合常度用化痰藥則咳嗽時痰能吐出
且能令所生之料合其常度最妙之化痰藥爲打打伊密的與吡嘑略服
少許有效有人喜用士哇盧與到魯樹汁老弱之人宜用辛衣格與補火
劑如淡輕等可也

吡嘑略 此草產於巴西國取其根入藥根小而色櫻內有圈紋密布多
服則爲吐藥少服則爲發汗藥與化痰藥其性與打打伊密的略同但其
功力頗小此藥內含一質名伊密的尼每重百分內含伊密的尼一分此
質之功力略同於打打伊密的凡用吡嘑略爲吐藥則胃作欲嘔之勢氣
力耗散筋肉寬鬆肌膚出汗如發熱生炎之病用吡嘑略發汗氣管生炎
氣喘之病用吡嘑略化痰以一釐至二釐爲一服用作吐藥以十釐至
三十釐爲一服用暖水調和飲之作吡嘑略葡萄酒法將吡嘑略二兩半
葡萄酒二升每日調攪一次待七日後濾清可用服十滴至三十滴爲化

痰與發汗劑服二錢至四錢爲吐劑如爲小兒吐劑服二十滴至六十滴每過一刻服一次至吐而止

呖哩略裸散又名度法散用鉀養三硫養八分呖哩略一分鴉片一分故用此散者必知每散十釐內有鴉片一釐不可妄用如尋常發熱病臨臥時用十釐爲一服能發汗而安心作呖哩略士哇盧丸將度法散三錢士哇盧一錢阿摩尼阿古末膠一錢加糖漿足以成丸氣管生炎服此丸有益以五釐至十釐爲一服惟此丸與度法散兩物小兒不可服之凡病不可服鴉片者卽不可用此兩物也

第一方 吐劑

呖哩略粉二十釐 呖哩略葡萄酒三錢 水一兩

三物調和爲一服

第二方 此爲小兒吐劑

呖哩略葡萄酒半兩 糖漿半兩 水一兩 三物調和每隔十分

時服一錢以吐爲度

第三方 治氣管生炎之化痰劑

叱啤略葡萄酒三兩 到魯糖漿五兩 阿拉伯樹膠水八兩

三物調和每服一錢

辛衣格 此草產於北亞美利加，俗名乳草，取根入藥，味辛而能惹胃，性能發汗化痰，氣管舊炎症，以此爲要藥，因能化痰而感動皮膚也，尋常藥方中，與淡輕_三同用，作辛衣格煮水法，將辛衣格十錢，水二升，加熱令沸，至餘一升，以一兩至三兩爲一服。

第一方 治老人氣管生炎

辛衣格煮水一兩半 淡輕養炭養五釐 二物調和爲一服每日

三服

第二方 治小兒哮喘症與傷風

辛衣格粉五釐 鈉養二炭養一釐 士哇盧粉四分釐之一 煇

三釐 四物磨勻爲一服添入大麥煮水飲之每隔兩時服一次

士哇盧 此草產於地中海邊其根形似蔥頭有大有小內含辛味之質能感動內皮食一大服則爲吐藥食一小服則能化痰頗有功用亦能治氣管生炎等病又能發汗與利小便尋常治咳之劑大半有此藥在內此藥用法將其根磨成細粉以一釐至三釐爲一服作士哇盧襍丸法將士哇盧粉一錢薑粉二錢阿摩尼阿古末二錢軟肥皂二錢糖漿一錢磨勻以五釐至十五釐爲一服用以化痰最妙作士哇盧醋法將士哇盧三兩半浸於醋酸一升內待三日則添入正酒醇一兩半以半錢至一錢爲一服如將士哇盧醋五十兩熬之至餘十三兩乘熱時加蜂蜜五磅則成士哇盧蜜醋爲尋常用此藥之法以半錢至二錢爲一服

第一方 治久咳

士哇盧二釐 叱哩略四釐 二物磨勻爲一服每隔一時服一次

第二方 治水腫 此方爲拜里醫士所作

士哇盧襍丸料十釐 水銀丸料四釐 二物磨勻作兩丸爲一服
每日一服

第三方 治水腫

士哇盧六釐 嚼囉嘶六釐 巴豆油一滴 三物磨勻作三丸爲
一服每三日一服

第四方 治咳嗽而痛

士哇盧蜜醋半錢 硝以脫半錢 水一兩 三物調和爲一服每
隔兩時服一次

第五方 治氣管舊炎症

士哇盧蜜醋半錢 阿拉伯膠水半兩 呷囉葡萄酒十滴 鈎
養二炭養五釐 鴉片酒五滴 水半兩 六物調和爲一服每隔
兩時服一次

第六方 治水腫等病之利小 便劑

士哇盧醋一錢 渣臘酒二錢 薄荷水一兩半

三物調和爲一服

到魯樹汁 此樹產於秘魯國其花似豆類之花取其乾汁成粉形如松香秘魯樹汁與到魯樹汁略同不過爲稠質實非秘魯國運來蓋出於中亞美利加之危地馬拉也此藥之性能補火化痰可治氣管炎症之初發者以十釐至三十釐爲一服如將到魯樹汁一兩浸入準酒一升內消化之以半錢至一錢爲一服此藥不能消化於水故凡用其粉者必用阿拉伯等膠水相和則不沈下作到魯糖漿法將到魯汁乾粉一兩又四分兩之一添入蒸水加熱沸之略二刻離火添蒸水足成十六兩待冷濾之加白糖粉二磅用熱水盆加熱令消化共重三磅以半錢至一錢爲一服

第一方 治傷風之化痰劑

到魯糖漿半錢 阿拉伯樹膠半兩 二物調和加桂皮水一兩爲一服

打打伊密的 詳見吐藥類

安神藥 凡感動腦髓而令人酣臥者謂之安神藥此類藥大半能止痛令寐故作此用卽如鴉片、嗎啡、罌粟殼皆能令人醉而止痛但有數病不宜用鴉片者在鴉片一節特詳論之羊躑躅亦爲安神藥能止痛但有時未能令寐、嚼囉叻能止痛令人昏蒙故外科施刀針法令人先嗅此藥則不知痛飲酒過限令人大醉不能安睡也

鴉片 此爲罌粟花結實時刺出之汁略有半乾產於土爾其國者爲上產於印度者最多而稍次其臭易辨其味苦如曬乾磨之則得黃稷色之粉

鴉片爲大有功力之藥病之危險者常用之但不可妄投以致危險如不明鴉片之用法而誤投之有中其毒而卽死者驗尸審問之官必定用藥者之罪

鴉片能令人安睡亦能平火安心搽於皮膚則能止痛而減其患苦服之

則先補火令皮膚暖而脈加速後則神倦欲睡令人酣臥如服後不能安睡則痛必可減或竟止之如腦氣筋不安或痛筋有痛亦可同時減之鴉片之大功用有三能令人安睡一也能治腦氣筋痛二也能治動筋痛三也服後所顯之徵有三能減脈之速一也能減呼吸之速二也能令血聚於腦三也身內變化之功有二能減腸中所成之各質令大便不通而止泄瀉一也能令皮膚暖和可作發汗藥二也

久服鴉片則臟腑習以爲常必加服之方能得其功用成癮之人終日如在夢中肌肉漸瘦服之過限則昏蒙難醒不知人事呼吸漸遲至停卽死如有人多服鴉片爲求死之計必速服有大功力之吐藥如不吐則用水節圖見西醫略論吸出胃中之各質又用兩人左右扶掖行走不令睡臥能飲之時則以極濃之加非水飲之

凡身內有大痛則鴉片爲最妙之止痛藥如病者不能安睡則鴉片爲最妙之安神藥如動筋時痛鴉片亦能治之凡發熱之病皮膚乾熱脈數舌

因有厚苔不可服鴉片。因鴉片之性能補火，凡中風腦炎等病，亦不可服鴉片。因鴉片能令血聚於腦也。小兒之病，切不可用之。因其性猛烈，小兒不能當也。

凡已痛而未發熱之病，可服鴉片。暫食草麻油一服，以免便秘之弊。炎症可用鴉片與錫或汞相和服之。又如肌膚滋潤，脈不甚數大者，亦可依法服之。喉炎症可與呓哩啞相和服少許，但年老之人，氣難呼吸者，則不宜用鴉片，用之恐致危險也。

鴉片能治泄瀉、血痢。凡酒癲、婦女妄言笑、臟燥等症，服此藥有益。如與呓哩啞相和，即名度法散，能治尋常傷風。因其性發汗也。

鴉片之功用，大半藉有鹼類性之質，名曰嘔啡啞。分取嘔啡啞法，必先將鴉片消化於水，再添淡輕水，則嘔啡啞凝結沈下。上等鴉片，每百分內含嘔啡啞十分至十四分。

鴉片或作丸，或作散，以一釐爲一服。但非醫士令服，不可輕用。度法散內

含鴉片，最爲簡便而穩，每十釐，內含鴉片一釐。觀有人作鴉片丸，每丸重五釐，內含鴉片一釐，又有鴉片膏，每四十釐，內含鴉片一釐，鴉片糖，每塊內含鴉片十分釐之一，凡服鴉片糖者，易知服糖塊若干，卽服鴉片若干。

鴉片酒，爲鴉片流質藥之最佳者，以十滴至三十滴爲一服，尋常以二十滴爲一服，鴉片葡萄酒，功力略同，小兒斷不可服也。英京藥肆中，有兩種鴉片水出售，功力較鴉片酒更大，一名拜得里鴉片水，一名司快兒嘆啡啞水。

有數種丸散，內含鴉片，不於藥方名內標明，如遇病者，不敢服鴉片治病，則以此等丸散與之，令服後不致畏懼，卽如度法散，與吡嘑略士哇盧丸，內皆有鴉片。觀又肥皂襪丸，每重五釐，內含鴉片一釐，又蘇合香，又司土辣，司襪丸，每重五釐，亦含鴉片一釐，樟腦襪酒，治咳嗽最妙，每半兩，內含鴉片一釐，凡用此酒者，必知每錢內含鴉片四分釐之一。

第一方 治肺胞膜生炎

鴉片四分釐之一 汞綠二釐 加玫瑰花膏足成一丸 每隔三小時服一丸

第二方 治諸痛并治動筋時痛

鴉片半釐 樟腦一釐 加糖漿足成一丸

第三方 治婦女妄言笑

鴉片一釐 甘松膏二釐 阿魏二釐 三物磨勻合爲一丸 每日服一丸

第四方 此爲平火安心之劑

拜得里鴉片水二十滴 罌粟殼糖漿一錢 水一兩半 三物調和臨臥時服之 此方性最猛烈如病者不能安臥用盡他法無效者可服此方

第五方 治諸痛或咳而胸痛如發大熱或呼吸不利者不可服此方

鴉片酒二十滴 以脫半錢 到魯糖漿一錢 樟腦水一兩半
四物調和爲一服

第六方 治咳嗽與胃不和之病

鴉片酒五滴至十滴 羊躑躅酒半錢 鉚養二炭養五釐 薄荷
水一兩 四物調和爲一服 每日三服

嘔啡啞

有毒

此物爲鴉片內之精質，有鹼類之性，尋常服法，必與鹽強水
或醋酸相和，所成之嘔啡啞，輕綠，與嘔啡啞醋酸，俱爲白色顆粒形之鹽
類質。

此藥之功用，與鴉片略同，更能平火安心，其性猛烈，用之稍不謹慎，卽爲
極危險之藥，醫士常用四分釐之一爲一服，凡食嘔啡啞與鴉片過多者，
人卽死，其故因大醉不能醒，且令眼中瞳人縮小，依此法，能辨別死者果
服此毒否也。

罌粟殼 罌粟殼之乾者，可用以入藥，英國有數處種白罌粟花，專取其

殼將其殼一兩、添水一升、加熱令沸、略一刻許、卽得罌粟殼煮水、再熬之、卽得其膏、內含嗎啡啞、但不及鴉片之多、以二釐至三釐爲一服、凡病不可用鴉片者、卽不可用此膏、如身體內諸痛、或有腫處、可將罌粟殼煮水、溫洗之、作罌粟殼糖漿法、將其殼三磅、加水四十升、加熱令沸、至減餘二升、添入糖五磅、正酒醇五兩、調攪卽成、如咳嗽不能安臥等病、以一錢至二錢爲一服、嬰兒服此、甚爲危險、因內含嗎啡啞之故、有人用以治嬰兒之病、以十滴爲一服、此事有差、

羊躑躅 羊躑躅葉、有令人醉迷之性、服之過限則有毒、作羊躑躅膏法、將葉壓出其汁、熬成膏、以五釐至十釐爲一服、作羊躑躅酒法、將乾葉五兩、準酒二升、浸之、以十滴至一錢爲一服、如服之過限、不但醉迷、尙能發狂、其令人醉也、非如鴉片之能令人安睡也、然此藥之勝於鴉片者有二、一不阻大便、一不令血聚於腦中、二也、凡病不可用鴉片者、可用此藥、卽如痛而咳嗽、并數種痛、均可用之、

第一方 此爲治痛之劑

羊躑躅膏三釐 鴉片膏半釐 黃連膏一釐 三物和勻爲一丸

第二方 治咳嗽而痛

羊躑躅酒半錢 硝以脫半錢 淡硝強水十滴 水一兩半

四物調和爲一服

啤啦咭喇

有

此爲英國毒草內之一種，其性最毒，其功用能平火安心，

服過限，令人言語錯亂，醫家用之，大半爲治眼之藥，因將此藥點入眼中，能令瞳人放大，但未嘗考究醫學者，不可用也，設誤食此藥，卽速多服吐劑，後將動物炭與水調和服之。

補火藥

此類之藥，能令各腦氣筋靈動逾常，能令腦髓更有興會，令脈

行稍速，如身弱力散者，服此能補身之力，可耐重病，常用者爲流質，如醇白蘭地酒、葡萄酒，以脫、硝以脫、綠以脫，與淡輕等，又有數種補火藥，能感動胃腑，卽如胃中發氣，食物難化，可用驅風藥感動之，此種驅風藥，大半

爲植物質，內含香油類質，間有含辛味之質者，卽如桂皮、肉豆蔻、丁香、薄荷、沒藥、阿魏、甘松等，俱含香油類質，樟腦亦與之相似也。又如薑與辣椒，爲含辛味之質，可以內服，芥末與斑蝥，亦爲含辛味之質，可敷於外皮，作引炎藥與弔炎藥。

醇 醇爲能自散之流質，爲炭四分劑，輕六分劑，養二分劑，化合而成。凡含糖之流質，發酵時則成酒醇，其糖變化不見，而有酒醇變成，如葡萄酒內所含之酒醇，藉葡萄糖而成，啤酒內所含之酒醇，藉大麥內之糖而成，人飲醇少許，則有精神興會，多飲之則大醉，啤酒等大麥所作之酒，每百分，含酒醇五分至十分，葡萄酒，每百分，含醇十分至二十五分，如將大麥等五穀造酒，或將葡萄果造酒，再蒸之，則得各種火酒，卽如蒸葡萄酒，則得白蘭地酒，蒸大麥或山芋酒，則得灰司記酒，如將糖漿令發酵，蒸之則得勒木酒，此各種火酒，每百分，含醇五十一分至五十四分，另含能自散之他質，如將各種火酒，屢次蒸之，則成正酒醇，重率〇·八三八，每百分，含