

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷六十四



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

胎毒
胎毒者水火相濟不調而致也
胎毒者水火相濟不調而致也
胎毒者水火相濟不調而致也
胎毒者水火相濟不調而致也
胎毒者水火相濟不調而致也
胎毒者水火相濟不調而致也
胎毒者水火相濟不調而致也
胎毒者水火相濟不調而致也
胎毒者水火相濟不調而致也
胎毒者水火相濟不調而致也

明 薛己 訂

形傷痛氣傷腫又云榮
因稟受胎毒或乳母膏
甘美積毒氣血不和所

致當分其經絡所屬五臟相勝與元稟虧損預為審用
攻補調和之劑速令散潰尤當審其勢之腫漫色之赤白
與痛有微甚毒有表裏若腫高焮痛便利調和邪在表
也宜表散之腫硬痛深大便秘澀邪在內也宜下之外無拘
急內則便利調和者邪在經絡也宜調榮衛腫焮大痛或
麻木不痛邪氣凝滯也用隔蒜灸及活命飲若煩躁飲
冷赤痛發熱二便不通者火熱內熾也用清涼飲活命
飲加大黃尤善若微腫微痛或不痛陽氣虛弱也用參

芪托裡散微黯微赤或不赤陽氣虛寒也用加味托裡散若惡寒而不作膿若膿熟而不潰者陽氣虛也用加味托裡散如此則未成者自能消散已成者自能潰腐尤當別其屬陰屬陽或半陰半陽而治之若泥於腫瘍禁用辛熱之說不分受症之因兼症之經槩行敗毒泛擾諸經誅伐無過以致不能起發或不能腐潰收斂變症莫能枚舉癰疽論云腫瘍內外皆壅宜以托裡表散為主但見腫痛叅之脉症虛弱便與滋補氣血無虧可

保終吉嬰兒有疾兼調其母若腫瘍之際治失其法必致潰瘍之變症此推內經之微旨而生平之徵驗者尤當觸類而長思奚庸贅

潰瘍

潰瘍者以瘡瘍腫潰而言也膿潰而腫消痛止者為順若膿潰腫痛或發寒熱者氣血虛也用十全大補湯膿潰欲嘔少食脾胃虛弱也用六君炮薑手足並冷者脾氣虛寒也用六君薑桂如不應急加附子膿潰而仍痛或

二便秘瀉者熱毒未解也用清熱消毒散熱退而渴不
退津液不足也用八珍加黃芪麥門山茱萸熱止而小
便頻數腎虛也用加減八味九料若熱不止或腫痛反
甚虛熱內作也用人參黃芪湯或熱退而肌肉不生者
氣血俱虛也用十全大補湯瘡色大白或陷下不斂寒
氣所襲也用五味異功散佐以豆豉餅膿血過多煩躁
不安乃亡陽也急用獨參湯尤當審其腫之軟硬飲食
冷熱與膿之稀稠多少肉之赤色微甚青黯及瘡口之

收斂遲速而投托裡消毒調補之劑庶無變症癰疽論
云潰瘍內外皆虛宜以托裡補接為主蓋潰瘍之變症
因由於腫瘍之際治失其宜虧損元氣之所致治者可
不慎哉

胎毒發丹

胎毒發丹者因胎毒內伏或頻浴熱湯或著烘衣或乳
母飲食七情內熱助邪為患發頭面四肢延及胸腹色
赤遊走不定古人云從四肢起入腹囊者皆不治當急

令人隨患處遍吮毒血各聚一處砭出之急服活命飲
惟百日内忌砭以其肌肉難任也若發散過劑表虛熱
而赤不退者用補中益氣湯加防風白芷寒涼過劑胃
氣受傷而熱赤不退者用異功散加柴胡升麻或兼發
搐等症用四君升麻當歸鈞藤鈞若復行攻毒必致不
起頭額間患者當卧鎌砭之

史少叅孫二歲丙申正月陰囊赤腫余作胎毒治瘡後
患發熱痰盛等症診其母有鬱火血熱用解鬱涼血之

藥子母俱服而愈至六月初患吐瀉兩眼睜動或投參
朮之類不應以為慢驚欲用附子藥請余議視其實外
關脉赤此屬風熱傷脾用柴胡清肝散加釣藤鉤木賊
草一劑即愈丁酉正月初旬頸患熱毒膿出貼藥忽暴
風啟戶即時發熱翌日頭面黯腫如斗兩耳厚寸許此
風邪上攻血得熱而沸騰也急砭兩額出黑血三盞許隨
用清熱化毒湯黯腫十退七八翌日復砭則血不甚黑
矣仍以前藥去牛蒡子加熟地黃而愈此症若不行砭

法或作破傷風治必死

一小兒四肢患之外勢雖輕內則大便秘結此患在臟也服大連翹飲敷神效散而瘥

一小兒患之赤暈走徹遍身難以悉砭令人吮四肢胸背數處使毒血各凝聚而砭之先用活命飲末酒調二服又以金銀花甘草節為末用人乳汁調服漸愈月餘後兩足皆腫仍砭之服前藥而痊數日後兩足復赤或用犀角解毒丸之類致乳食不進肚腹膨脹此復傷脾

胃而然也敷神功散服補中益氣湯加茯苓而痊

一小兒腿如霞片遊走不定先以麻油塗患處砭出惡血其毒即散用九味解毒散而安

一小兒臂患之砭出毒血而愈惑於人言服護心散以杜後患服之吐瀉腹脹患處復赤手足並冷余謂此脾胃虛弱前藥服傷用六君湯一劑頓愈又以異功散加升麻柴胡而痊

一小兒患此砭之而愈但作嘔不食流涎面黃余謂此

脾氣虛弱用異功散加升麻治之吐止食進又用補中
益氣湯涎收而安

一小兒患此砭之而愈翌日發搐作嘔手足並冷此胃
氣虛而肝木侮之用異功散加藿香木香諸症頓止又
用異功散加升麻柴胡而痊

一小兒患此砭之而愈但面赤作嘔飲冷余謂胃經熱毒
未解先用仙方活命飲又用清熱消毒散各一劑而愈
一小兒腿上患之神思如故乳食如常余謂毒發於肌表今

急砭出毒血自愈不信外敷寒涼內服峻劑腹脹不乳而死
一小兒遍身皆赤砭之投以解毒藥而愈

一小兒患此二便不利陰囊肚腹俱脹急用砭法隨以
活命飲加漏蘆木通大黃為末時用熱酒調服至兩許二
便俱通諸症頓退却去三味仍前時服而愈

一小兒患此二便不利腹脹咳嗽用活命飲加漏蘆木
通麻黃為末時時熱酒調服二便隨通遍身出汗諸症
頓退鼻息似絕無氣以動時或似躁此邪氣去而元氣

虛也急用當歸補血湯而愈

砭法治丹毒赤色遊走不定令口吮毒血各聚一處用
細磁器擊碎取有鋒芒者以筋頭劈開夾之用線縛定
兩指輕撮筋頭稍令磁芒對聚血處再用筋一根頻擊
刺出毒血輕者止用口吮出毒用藥敷之如患在頭者
不用砭法止宜用針卧倒挑患處以出毒血遲則毒血
入腹而難起矣

神功散治丹毒最效若砭後毒甚者宜用如毒輕者砭

之後不可用恐砭處皮膚既破草烏能作痛也

仙方活命飲

清熱化毒湯

清熱消毒散

柴胡清肝散

補中益氣湯

小柴胡湯

大連翹飲

柴芍參苓飲

九味解毒散

傷寒發丹

傷食發丹者因脾胃之氣未充乳食過多不能運化蘊熱於內而達於肌表也若因乳食停滯者先用保和丸消之大便秘結量加大黃通之乳食既消而丹尚作者用清中解鬱湯治之丹邪既去而乳食不思者用五味異功散補之發熱作渴或飲食少思者用七味白朮散補