

欽定四庫全書

本草綱目 卷六  
子部



南京中医药大学图书馆版权所有

盧之頤 撰

明



海藻

青蒿

苦參

白薇

紫草

葱莖白

澤蘭葉

白鮮皮

山茱萸

赤小豆

大豆黃卷

水銀

石硫黃

白馬陰莖

牡狗陰莖

本經下品一

代赭石

戎鹽

貫衆

白芨

連翹

白斂

烏頭

附子

天雄

半夏

虎掌

常山

芫花

大黃

蚤休

鬼臼

巴豆

大戟

本經中品

海螵蛸氣味鹹微溫無毒主女子赤白漏下經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子

覈曰近海州郡皆有九月寒鳥入水所化越小滿則形小矣形若革囊口在腹下八足聚生口旁無鱗有鬚兩鬚如帶甚長設遇風波即以鬚下研或粘作繩故名繩魚能吸波噀墨令水溷黑以自衛也南越志云性反嗜鳥每自浮水上飛鳥見之以為死而啄之

乃卷取入水而食之因名烏賊轉為烏之賊害也故  
腹中血及膽正黑如墨可以書字但逾年則迹滅惟  
存空紙爾世言烏鰐懷墨而知禮謂之海若白事小  
吏也外皮亦黑內肉則白背上只有一骨形如樗蒲  
子而稍長兩頭尖色潔白質輕脆重有紋宛如通  
草紋順者為真紋橫者沙魚骨也修治以血滷作水  
浸之并煮一伏時取出掘一土坑燒通紅色入螺旋  
在內經宿取出其効加倍也惡白芨白斂附子能淡

鹽伏硇縮銀

叅曰背骨竒而無枝節名曰螵蛸形相似耳上表堅薄如介裏理輕脆而通蓋維持者督闔闢者任也其口以腹則其息以胎矣吸波噀墨以自衛者此即藏精起亟陽以陰為用衛轉營為衛耳主女子赤白漏下經汁者闢者闢之也血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子者闔者闔之也別錄諸家用治男子驚癇痰瘡吐衄熱中瘡膿痘疹內經用治血枯得之少年時有所

大脫血或醉以入房致中氣竭肝血傷月事衰少不  
以時至者當病胸脇支滿妨於食病至則先聞腥臊  
臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名曰  
血枯佐以蘆茹和以雀卵飲以鮑魚汁所以利腸中  
及益肝血也悉屬營任之變肯故相宜耳

月事衰少在女子即月事不以時  
下在男子即精氣不以時溢瀉矣

本經中品

海藻氣味苦鹹寒無毒主癰瘤結氣散頸下硬核痛癰

腫癰癩堅氣腹中上下雷鳴下十二水腫

覈曰出東海海島有大小二種小者名馬尾藻生淺水中宛如馬尾大者名大葉藻生深水中葉大如藻海人以繩繫腰投水取之五月後不可取恐大魚傷人也修治用生烏豆紫背天葵同煮一伏時日乾用反甘草

參曰海藻生海中橫陳於水若藻濯然一名薅海中之水藻也一名羅水草之有文也一名綸生淺水而

葉細一名組生深水而葉大爾雅云綸似綸組似組  
東海有之正謂二藻也蓋海晦也主承穢濁水黑如  
晦也藻善條暢不以晦濁礙行漾故主經絡肉理有  
失次第淺深致氣結成癰瘤及頸下硬核或氣堅成  
癰瘕癰腫及腹中上下雷鳴亦鹹以軟之堅結自釋  
矣十二經水皆止而盈海納百川止而不盈尾閭泄  
之是也

本經中品

淫羊藿氣味辛寒無毒主陰痿絕陽莖中痛利小便益氣力強志

覈曰出上郡陽山山谷江東陝西泰山漢中湖湘間皆有一根數莖莖細頗堅高二三尺一莖三桿一桿三葉長二三寸如豆藿葉如杏葉面光背淡邊有細齒薄而有刺四月開花白色亦有紫色者碎小獨頭經冬不凋根似黃連色紫多鬚即仙靈脾也景曰西川北部有獸曰淫羊與山羊無異日羣百遍蓋食此

藿所致也羊食之而淫故曰淫羊若以為川北有淫  
羊似乎曲為之解矣又名仙靈脾當是取其益氣力  
強志而名之耳修治取生處不聞水聲者乃良以夾  
刀夾去葉之四畔花枝每角用羊脂四兩拌炒待脂  
盡為度薯蕷紫芝為之使得酒良

參曰羊性善羣淫羊功力相似藿則以形舉也莖高  
二三尺細緊勁直經冬不凋可想而知見其作用矣一莖  
三桿一桿三葉具巽木生成之數助長厥陰之用堅

固淫業者也但不可久服以有餘於用不足於體令人無子故也

本經中品

青蒿氣味苦寒無毒主療癩癬瘡殺蟲治留熱在

骨節間明目

覈曰生華陰川澤所在有之得春最早望春便發莖如指肥葉極纖細色並青翠似茵陳蒿而背不白至夏漸高五六尺許秋深開細淡黃花花下結子如粟

米莖柔勒根白硬苗葉花實並芬芳特勝功力亦相  
若也筆譚云青蒿一類自有二種一黃色一青色青  
者入藥即本經所指青蒿亦有所別陝西銀綬間見  
青蒿叢中時有一兩窠迥然特青如松檜翠碧可觀  
至秋餘蒿轉黃此蒿翠碧更倍古人取深青者為勝  
恐即此蒿獨得蒿力之專精者也不然諸蒿何嘗不  
青但青而色淡雷公云凡使惟中為妙到膝即仰到  
腰即俛使子勿使紫使根勿使莖四件若同使翻然

成痼疾修治其葉或莖實用七歲兒七個溺浸七日  
七夜取出晒乾用

參曰萬青而高纖柔整密望春便發少陽膽藥發陳  
致新之宣劑也其味苦已出乎陽其氣寒未離乎陰  
陰中之陽陽中之樞象也蓋少陽膽主骨故對待骨  
節間留熱若皮膚分理間疥瘡痂惡瘍亦屬留熱  
所致皆陳也宣發發陳陳發則新至矣主明目者以  
肝膽開竅於目不唯發陳且拂塵矣君子萬目其斯

之謂歟

本經中品

乾薑氣味辛溫無毒主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕脾腸澼下痢生者尤良久服主臭氣通神明

覈曰出漢溫池州江西浙江諸處宜原隰沙地四月

種種五月生苗如嫩蘆而葉稍闊兩兩相對惡濕洳而畏日故秋熟則無薑設一莖稍黴則根病矣社前後新芽頓長如列指狀一種可生百指皆分歧而上

即宜取出種薑否則子母俱敗秋分采芽柔嫩可口  
霜後則老而多筋乾之即曰乾生薑乾薑者即所取  
薑種水淹三日去皮置流水中漂浸六日更刮去皮  
然後晒乾入瓮缸中覆釀三日乃成以白淨結實者  
為良故人呼為白薑入藥則宜炮用

先人云辛溫夏長色相微紅具火大之力通心王之  
令若降下之陰不及醞藉之德稍遜者所當避忌又  
云血病有二陽乘陰而血溢者其治在陽以寒待之