

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷四十四



南京中医药大学图书馆版权所有

景岳全書卷四十四

倉

總論

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

倉

明 張介賓 撰

能治所當治者惟險證

險部位順而日期險

顏色險顏色順而飲食

險飲食順而雜證險雜證順而治療險治療順而觸
穢險然猶有最險者則在元氣與邪氣邪氣雖強元
氣亦強者無害只恐元氣一餒邪氣雖微者亦危設
或犯之而不為速治則順者不順而吉變為凶矣凡
此數者皆痘中之要領所當詳察詳辨也故凡欲治
痘必須先識死生辨虛實審寒熱明此六者則盡之
矣

一治痘之要惟邪氣正氣二者而已凡邪氣盛而無制

者殺人正氣虛而不支者殺人及其危也總歸元氣之敗耳使元氣不盡則未必至死凡治此者但知補瀉二字而用之無差則盡善矣故補瀉難容苟且毫釐皆有權衡必不可使藥過於病亦不可使藥不及病是以善用攻者必不致伐人元氣善用補者必不致助人邪氣務使正氣無損而邪氣得釋能執中和斯為高手然執中之妙當識因人因證之辨蓋人者本也證者標也證隨人見成敗所由故當以因人為

先因證次之若形氣本實則始終皆可治標若形質原虛則開手便當顧本若謂用補太早則補住邪氣此愚陋之見也不知補中即能托毒灌根即能發苗萬無補住之理是以發源之初最當着力若不有初鮮克有終矣此可與智者言不可與庸人道也

一治痘不宜遲凡痘瘡之有不同者無過寒熱虛實四證大都寒則虛熱則實虛寒則宜溫補實熱則宜清解然其挽回之力當於三五日前治之過此則恐無

及若七日之後毒發於外外不足則外剥而死若毒發不盡則又內傳內不足則內攻而死故治毒有時時之不可失也有如此倘初時不慎則後來之禍從此伏矣

一解毒當知表裏所謂毒者火毒也所謂解毒者求其所在而逐之也蓋痘瘡之發內則本於淫火外則成於風邪內外相觸其毒乃發故其發也不甚於內則甚於外甚於內者以火邪內盛而熾焰於外也甚於

外者以寒邪外閉而鬱火於內也故但察其無汗外熱而邪在表者則當疎之散之使熱邪從外而去則毒亦從外而解矣若察其多汗內熱而邪在裏者則當清之利之使熱邪從內而泄則毒亦從內而解矣其有內熱既甚而表邪仍在者則當表裏相參酌輕重而無解之則邪必皆散矣若邪不在表則必不可妄兼發散以致表氣愈虛而痘必終敗其證則身有汗而外不甚熱者是也若毒不在裏則必不可無用

寒涼以致中寒脾敗而毒必反陷其證則口不渴而
二便不秘者是也知斯五者則解毒治實之法無餘
蘊矣此外有虛邪虛火等證則當先酌元氣次察邪
氣無使失楫中流顧本不及則尤為切戒○凡云痘
毒者痘必自內而達外但得出盡則內無毒但見化
盡則外無毒既出既化而不使復陷則毒盡去矣故
或宜散表或宜托送或宜清解或宜固中而治法盡
之矣

一補虛當辨陰陽凡痘瘡血氣各有所屬已見前氣血條中然痘之所主尤惟陰分為重何也蓋痘從形化本乎精血凡其見點起脹貫漿結痂無非精血所為此雖曰氣為之帥而實血為主且痘以陽邪陽盛必傷陰所以凡治痘者最當重在陰分宜滋潤不宜剛燥故曰補脾不若補腎養陰所以濟陽此秘法也然血氣本自互根原不可分為兩如參芪白朮之類雖云氣分之藥若用從血藥則何嘗不補血歸芎地

黃之類雖云血分之藥若用從氣藥則何嘗不補氣
故凡見氣虛者以保元湯為主而佐以歸地血虛者
以四物為主而佐以參芪蓋氣血本不相離但主輔
輕重各有所宜而用之當不則明拙自有差耳

一治痘有要方茲表而出之以便擇用其有未盡當於
各條求之

凡解表諸方乃初熱時所必用者諸家皆以升麻葛
根湯為首程氏則用蘇葛湯似為更妥余則常用柴

歸飲以無營衛似為尤妥此當隨宜擇用○營虛表不解者五柴胡飲○陽氣虛寒表不解者柴葛桂枝湯○元氣本壯而表不解者疎邪飲或加減參蘇飲○寒氣勝而表不解者五積散或麻黃甘草湯

凡清火解毒諸方所以解實熱也如欲解毒清火而無養氣者惟四味消毒飲為妙鼠粘子湯亦佳○熱毒兩盛而不化者宜搜毒煎○煩熱作渴小水不利者導赤散六一散○血熱赤斑煩燥多渴者犀角散

○熱在陰分而失血者玄參地黃湯○肉熱不清者
東垣涼膈散○二便俱不利而火盛於內者通關散
○熱毒內蓄小水不利而為丹為癰者大連翹飲○
煩熱多驚而神不安者七味安神丸○熱毒內甚而
狂妄者退火丹

凡表裏兼解諸方如內外俱有熱邪者宜柴葛煎或
柴胡麥門冬散○裏邪甚而表邪微者解毒防風湯
○表裏俱有邪而元氣無虛者實表解毒湯○表裏

俱實熱者雙解散

凡托裏諸方有宜專補元氣者有宜兼解毒者如氣血俱虛不起者六物煎或托裏散○虛寒不達無托無表者參芪內托散或十宣散○氣分虛寒不透者六氣煎○氣血俱虛微熱不起者紫草快癍湯

凡諸補劑皆痘中元氣根本祛邪托毒者之所必賴但見虛邪必當以此諸方為主○氣分不足者調元湯○氣虛宜溫者保元湯六氣煎○氣虛微熱宜兼

涼解者參芪四聖散○血虛者四物湯芎歸湯○血
分虛寒宜溫者五物煎○血虛血滯者養血化癰湯
○血虛血熱宜兼解毒者涼血養營煎○氣血俱虛
者六物煎八珍湯十全大補湯○氣血虛寒大宜溫
補者無如九味異功煎六味回陽飲即陳氏十一味
木香散十二味異功散但虛寒而兼氣滯者宜用之
欲賴補虛大有不及

凡攻下諸方亦痘中所不可無惟必不得已然後用

之勿得視以為常也○血虛秘結大便不通者四順
清涼飲○裏實多滯秘結者前胡枳殼湯○表裏俱
實大便不通者柴胡飲子○血熱便結毒盛者當歸
丸

一凡痘出已盡內無不虛蓋隨痘而為托送者皆元氣
也使於此時不知培補化源則何以貫漿何以結痂
何以收靨倘內虛無主漿恐毒氣復陷無不危矣若
痘之稀疏者氣血之耗猶為有限若痘之多而甚者

其氣血內虧必更甚矣此不可不預為之防也

一平順之痘毒原不甚既出之後內本無邪此輩原不必治無奈父母愛子之切且不識病之輕重故必延醫診視既延醫至無不用藥既已用藥無非寒涼在彼立意不過曰但解其毒自亦何妨不知無熱遭寒何從消受生陽一拔胃氣必傷多致中寒泄瀉猶云協熱下利更益苓連最可恨也又如痘瘡初見發熱每多不審虛實止云速當解毒凡於十日之外多有

泄瀉而致斃者皆此輩之殺之也冤哉冤哉余見者多矣故筆諸此以為孟浪者戒

一痘在肌肉陽明主之故自出齊以後最不宜吐瀉與其救治於倒陷之後孰若保脾土於未壞之先故凡生果茶水之類皆宜慎用而寒涼之藥尤不可不慎也

一治痘須辨其證大都濕多則泡血熱則斑氣不足則頂陷血不足則漿毒不附裏實太補則生癰毒表實