

欽定四庫全書

子部

名醫類案卷八



北京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

名醫類案

齊濟

醫書

明 江瓘 編

未右汝州因山驗方有保
越溫不詣尸所問之即

云如也
役人扶掖至鼻血如簷

通古謂治血
大覓之得十餘斤不暇

耳清月仙生服濟不三四片又
以其滓塞鼻須臾血

定又癸未娣病吐血有醫者教用生地黃自然汁煮

服

此治熱血妄行

日服數升三日而愈有一婢半年不月見

釜中餘汁輒飲數盃尋即通利其效如此

東垣治一貧者脾胃虛弱氣促精神短少衄血吐血以

麥門冬二分人參歸身三分黃芪白芍甘草各一錢

血脫益氣

五味五枚作一服水煎稍熱服愈繼而至冬天

寒居密室以大熱炕而吐血數次再求治此久虛弱

外有寒形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補

表之陽氣瀉裏之虛熱夫冬寒衣薄是重虛其陽表
有大寒壅遏裏熱火邪不得舒伸故血出於口憶仲
景傷寒有云太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不與之
遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同遂用之以麻黃
桂枝湯人參益上焦元氣而實其表麥門冬保肺氣
各三分桂枝以補表虛當歸身和血養血各五分麻
黃去根節去外寒甘草補脾胃之虛黃芪實表益衛
白芍藥各一錢五味三枚安其肺氣臥時熱服一服

而愈

丹溪治一婦貧而性急忽衄作如注倦甚脉浮數重取

大

大為陽脉亦有
大則為虛非重取而得之也

且乳此陽滯於陰病雖重

可治急以萱草根入薑汁各半飲之

本草云萱草根
同薑汁服乃大

熱衄血
仙方

就以四物湯加香附側柏葉四服覺渴仍飲

以四物十餘貼而安

有形之血不能速生無形之氣
所當急固况症倦甚而衄如注

耶乃先生以為陽滯於陰不投參
朮而用四物後學宜細心別焉

一壯年患嗽而咯血發熱肌瘦

吐血發熱治女人要問
經次行否恐氣升而不

降當閱經水俞醫用補藥數年而病甚脉濇此因好
子容治案可法

色而多怒精神耗少又補塞藥多榮衛不行瘀血內
積肺氣壅遏不能下降治肺壅非吐不可精血耗非
補不可唯倒倉法二者兼備但使吐多於瀉耳兼灸
肺俞左二穴肺俞膀胱穴在三椎骨下橫過各一寸半灸
五次而愈

一人咳嗽吐血四物加貝母瓜蒌五味桑白皮杏仁款

冬花柿霜

今人治血大率如此

一人年五十勞嗽吐血以人參白朮茯苓百合白芍藥

紅花細辛

細辛紅花
配方甚奇

黃芪半夏桑白皮杏仁甘草阿

膠訶子青黛瓜蒌海石五味天門冬

一人近四十咳嗽吐血四物換生地加桑白皮杏仁款

冬花五味天門冬桔梗知母貝母黃芩

一人不欬吐而血見口中從齒縫舌下來者藥用滋腎

水瀉相火治之不旬日而愈後二人証同俱以此法

治之效

一人因憂病欬吐血面黎黑色藥之不效曰必得喜可
解其兄求一足衣食地處之於是大喜即時色退不
藥而瘳經曰治病必求其本又曰無失氣宜是知藥
之治病必得其病之氣宜苟不察其得病之情雖藥
亦不愈也

滑伯仁治一婦體肥而氣盛自以無子嘗多服煖宮藥
積久火盛迫血上行為衄血必數升餘面赤脉躁疾
神恍恍如癡醫者猶以上盛下虛丹劑鎮隊之伯仁

曰經云上者下之今血氣俱盛溢而上行法當下導
奈何實實耶即與桃仁承氣湯三四下積瘀既去繼
服既濟湯二十劑而愈

一人病嘔血或滿杯或盈盆盞且二三年其人平昔嗜
市利不憚作勞中氣因之侵損伯仁視之且先與八
寶散一二日服黃芩芍藥湯少有動作即進犀角地
黃湯加桃仁大黃湯稍間服抑氣寧神散有痰用礞
石丸其始脉亢大後脉漸平三月而愈屢效

一人乘盛暑往途中吐血數口亟還則吐甚胸拒痛體
熱頭眩病且殆或以為勞心焦思所致與茯苓補心
湯仁至診其脉洪而滑曰是大醉飽胃血壅遏為暑
迫血上行先與犀角地黄湯繼以桃仁承氣湯去瘀
血宿積後治暑即安

一人病咳血痰診其脉數而散體寒熱仁曰此二陽病
也在法不治當以夏月死果然

子和治一書生過勞大便結燥欬逆上氣時喝喝然有

音吐嘔鮮血以苦劑解毒湯加木香漢防已煎服時
時啜之復以木香檳榔丸泄其逆氣月餘而痊

呂滄州治一人病衄浹旬不止時天暑脉弱衆醫以氣

虛不統血

老生常談

日進芪歸茸附滋甚求治呂至未食

頃其所衄血已三覆器矣及切其脉兩手皆虛乳右

上部滑數而浮躁

脉浮參以時令

其鼻赤查而色白即告之

曰此得之酒酒酒毒暴悍而風暑乘之熱蓄於上焦
故血妄行而淖溢彼曰某嘗飢走赤日已而醉酒向

風臥公所診誠是為製地黃丸三升許

補其本

魚用防

風湯

瀉其標

飲之即效

項彥章治一婦患衄三年許醫以血得熱則淖溢服瀉

心涼血之劑益困衄纔數滴輒昏六脉微弱寸為甚

曰肝藏血而心主之今寸口脉微知心虛也心虛則

不能司其血故逆而妄行法當養心仍補脾實其子

子實則心不虛矣

虛則補母有之虛而補子之說今見此案信哉醫理無窮盡無方體

也故其命以琥珀諸補心藥遂安

方曰歸脾湯

許先生論梁寬父病右脇肺部也欬而吐血舉動喘逆

者肺脹也發熱脉數不能食者火來刑金肺與脾俱

虛也脾肺俱虛而火乘之其病為逆如此者例不可

補瀉若補金則慮金與火持而喘咳益增瀉火則慮

火不退位而痧癖反甚

真知箇中三昧

正宜補中益氣湯先

扶元氣少以治病藥加之聞已用藥未效必病勢若

逆而藥力未到也遠期秋涼庶可復爾蓋肺病惡春

夏火氣至秋冬火退只宜於益氣湯中隨四時升降

寒熱及見有證增損服之或覺氣壅間與加減枳木
丸或有飲間服局方枳木湯數月逆氣少回逆氣回
則可施治法但恐今日已至色青色赤及脉弦脉洪
則無及矣病後不見色脉不能懸料以既愈復發言
之惟宜依准四時用藥以扶元氣庶他日既愈不復
發也其病初感必深恐當時消導尚未盡停滯延淹
變生他証以至於今宜少加消導藥於益氣湯中庶
可漸取效也

一人膏粱而飲至今病衄醫曰諸見血者為熱以清涼
飲子投之即止越數日其疾復作醫又曰藥不勝病
故也遂投黃連解毒湯或止或作易數醫皆用苦寒
之劑俱欲勝其熱而已飲食起居寢不及初肌寒而
時躁言語無聲口氣臭穢熱似惡如冷風其衄之餘波
則未絕也或曰諸見血者熱衄熱也熱而寒之理也
今不愈而反害之何耶內經曰以平為期又言下工
不可不慎也彼惟知見血為熱而以苦寒攻之抑不

知苦瀉土土脾胃也脾胃人之所以為本者今火為病而瀉其土火未嘗除而土已病矣土病則胃虛虛則榮氣不能滋榮百脉元氣不循天度氣隨陰化而無聲肌寒也噫粗工嘻嘻以為可治熱病未已寒病復起此之謂也

吳球治一少年患吐血來如湧泉諸藥不效虛羸瘦削病危亟脉之沉弦細濡其脉為順血積而又來寒而又積疑血不歸源故也嘗聞血導血歸未試也遂用

病者吐出之血瓦器盛之俟凝入銅鍋炒血黑色以紙盛放地上出火毒細研為末每服五分麥門冬湯下進二三服其血遂止後頻服茯苓補心湯數十貼以杜將來保養半年復舊

徐德占治一人患衄尤急灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯立止蓋血自此入腦注鼻中常人以線勒頸後尚可止衄此灸宜效

秀州進士陸迎忽得疾吐血不止氣蹙驚顫狂躁跳躍