

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百十三



南京中医药大学图书馆版权所有

宋定回春集卷之

普濟方卷三百二十二

周王朱楠撰

折傷門
此書卷下附論

折傷門
折傷者中風有所墮墜臣血氣內若有所大怒氣上而
行下持於腦則傷肝又中風及有所擊仆若醉入房
中風則傷脾又頭痛不可取於脰者有所擊墮惡

血在內傷脾未已可則刺不可速取之也夫從高墮下

惡血留於內不分十二經絡聖人俱作風中肝經留於
脇下以中風療之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不
問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有
自汗但人有汗出皆為風證諸痛皆屬於肝況敗血凝
結從其所屬入於肝也從高墜下逆其上之血氣非肝
而何非傷寒無汗既自汗必是風化也以破血出經藥
治之夫肝膽之經俱行於脇下經屬於厥陰少陰宜以
柴胡為引用為君以當歸活血脈又急者痛也甘草緩

其急亦能生新血陽生陰長故也為臣川山甲枯婁根
桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以盪滌敗血為
之使氣味相合使血氣各有所歸痛自去矣

方

蒲黃散

出聖惠方

治從高墜下落馬墜車碾著腕損骨碎

筋傷內損惡血攻心悶絕坐臥不安宜先須按摩排
正筋骨宜服此藥止痛散血

蒲黃

兩一

當歸

分三

玄胡索

兩一

芎藭

分三

赤芍

藥一兩 淹蔕子分三 沒藥一兩 附子一兩炮裂去皮臍

栗子二兩去殼陰乾 川大黃一兩剉碎微炒 芸臺子一兩

右搗羅為散每服以溫酒調下二錢不拘時候頻服

沒藥散出聖濟總錄 治墜墮損傷筋骨皮肉發熱疼痛

沒藥研 澤瀉切焙 桂去粗皮 檳榔 甘草炙剉

白芷 蜀椒去目并閉口者炒出汗 附子炮裂去皮臍 芎藭

各一兩 當歸三分

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候

鎮心散

出聖惠方

治因傷折後驚悸心神煩悶宜服定魂

魄

虎睛

一對用生羊血浸一宿漉出陰乾

金箔

銀箔

各五十片細研

茯神

遠志

心去人參

去蘆頭各半兩

麥門冬

去心焙

蒲黃

羚羊角屑

各一兩

硃砂

二兩細研水飛過

右為末用棗肉入煉蜜同和搗三五百杵如梧桐子

大每服於食後并夜臥時以茯神湯下三十丸

續斷散

出聖濟總錄

治從高墜下傷損筋骨發熱腫痛

續斷剉 生乾地黄焙 當歸切 芎藭 附子

炮裂去皮 桂去粗皮 澤蘭葉 蜀椒去目并閉口者炒出

汗 甘草炙剉各半兩

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候

破血散痛湯 治從高損傷墜馬惡血流於脇下痛甚

不能轉側妨其飲食

羌活 防風 中桂各一錢 柴胡 連翹各二錢

當歸稍錢二 麝香少許別研 蘇子一錢半一方無 水蛭炒去

烟盡
另研

右分為二服每服酒二大盞除水蛭麝香外另研如
泥煎餘藥依一大盞去滓上火令稍熱調二味飢服
之

乾地黄散 治從高墮下傷損疼痛

生乾地黄

兩一

當歸

微炒一兩剉

附子

去皮臍一兩炮裂

川大黃

兩半

續斷

兩半

桂心

兩一

琥珀

兩半

枳殼

半兩麤炒
微黃去穰

桃仁

一兩湯浸去皮
微炒

右為細散溫酒調下一錢不拘時候

芎藭散 治從高墜下車馬諸傷腕折疼痛不可忍

芎藭

玄胡索

桂肉

去粗皮

桃仁

湯浸去皮尖雙仁微炒

附子

炮去皮臍各一兩

澤蘭

半兩

虎脰骨

二兩塗酥炙黃

右為細末溫酒調下二錢不拘時候

大膠艾湯

治男子傷絕或從高墜下傷五臟微者唾

血及金瘡傷經者

阿膠

艾葉

甘草

當歸

芎藭

各一兩

乾薑

一兩 乾地黄 芍藥 各三兩

右以水八升煮取三升去滓內膠令烊分服羸人分三服兼治婦人產後崩傷下血過多虛喘欲死腹中激痛下血不止

復元活血湯 治從高墜下惡血流於脇下及疼痛不可忍

柴胡 錢五 當歸 錢三 甘草 川山甲 炮 紅花

瓜蒌根 各二錢 大黃 酒浸 一兩 桃仁 去皮尖 五十粒

右桃仁研爛餘藥剉如豆大每服一兩水二盞半酒半盞煎至七分去渣溫服食前以利為度得利後痛或不盡服乳香神應散方見本類後黃帝鍼經云有所墮墜惡血流內若有所大怒氣上而不行下積於脇則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸和血脈又急者痛也甘草緩其急亦能生新血甘草生血陽生陰長故也為臣山甲瓜蒌根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒

製以盪滌敗血為之使氣味和合氣血各有所歸痛自然去矣

接骨丹 治從高墜墮傷損疼痛

當歸

切焙二兩

甘草

剉炒三兩

桂

去粗皮一兩半

沒藥

另研

乳香

另研各半兩

澤蘭

一兩

自然銅

火燒紅淬七次一兩研

右為細末入研藥令勻水麪糊和丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒調下不拘時候日進三服

牽牛子散

治從高墜下傷折有瘀血不散脅肋疼

痛

牽牛子生取末

當歸切焙各一兩

檳榔剉

桂心粗去

皮

木香炮各半兩

郁李仁湯浸去皮細研

青橘皮湯浸去皮

白各一兩

右為散和勻每服一錢空心溫酒調下取瘀血為效
外以敗龜膏貼方見本類後

附子散 治從高墜下落馬車碾一切傷折理血止痛

附子炮裂去皮臍

沒藥 蒲黃 當歸 芍藥 薑

黃赤芍藥已上各一兩

右為細散溫酒調下二錢不拘時候

接骨草散 治從高墜下損骨折筋傷肉

接骨草 巴戟各二兩 紫葛根剉 石斛去根剉

丁香 續斷 阿魏麝裏煨麝熟為度已上各一兩

右為細散溫酒調下二錢不拘時候

沒藥膏 治從高墜下傷損筋骨打破皮肉疼痛

沒藥 當歸剉微炒 麒麟竭 蒲黃 牡丹皮

骨碎補 橘仁微炒各一兩

右為細末以溫酒調下二錢不拘時候

葵根散 治從高墜墮損折車碾馬墜筋骨蹉跌甚者

大小腸不通皆被瘀血與衛氣不和致令不通

葵根一兩 木通 蘧麥 川大黃剉碎微炒各二兩 甘

草炙赤剉半兩 鹿葱葉并根一兩

右搗粗羅為散每服四錢以水一盞煎至六分去渣不拘時候溫酒調下滑石末一錢

桃仁湯 治從高墮下落大木車馬間胃腹中有血不
得氣息者

桃仁四十枚 大棗二十枚 大黃 硝石 甘草各一

兩 蒲黃一兩半

右呔咀以水三升煮取一升絞去渣適寒溫盡服之
當下下不止漬麻汁一杯飲之即止

乳香神應散 治從高墮下疼痛不可忍及腹中疼痛
者

乳香 沒藥 雄黑豆 桑白皮 獨科栗各已上一

兩 破故紙炒三兩

右為末每服五錢醋一盞砂石器內煎至六分入麝香少許溫服

巴戟湯 治從高墜下及打撲內損昏冒嗜睡不能飲食此謂血閉及臟腑不通

巴戟去心半兩 當歸 地黃 芍藥 川芎各一兩

大黃半兩