

欽定四庫全書

子部

巢氏諸病源候總論卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

巢氏諸病源候總論卷六

解散病諸候

寒食散發候

散脉法實或斷此不足

隋 巢元方 撰

似死脉或細數或弦駛
不能識熱多則弦駛有

源與... 樂率如是無苦非死候

欽定四庫全書

巢氏諸病源候總論

一

也勤從節度不從節度則死矣欲服散宜診脉候審正其候爾乃畢愈脉沈數者難發難發當數下之脉浮大者易發也人有服散兩三劑不發者此人脉沈難發發不令人覺藥執行已藥但於內發不出形於外欲候知其得力人進食多是一候氣下顏色和悅是二候頭面身癢瘙是三候策策惡風是四候厭厭欲寐是五候也諸有此證候者皆藥內發五臟不形出於外但如方法服散勿疑但數下之則內虛自當發也諸方互有不同

皇甫唯欲將冷廩丘公欲得暖將之意其多有情致也
世人未能得其深趣故鮮能用之然其方法猶多不盡
但論服藥之始將息之度不言發動之後治解之宜多
有闕畧江左有道弘道人深識法體凡所救療妙驗若
神製解散對治方云鍾乳對朮又對枯萐其治主肺上
通頭胃朮動鍾乳胃塞短氣鍾乳動朮頭痛目疼又鍾
乳雖不對海蛤海蛤動則目痛短氣有時朮動鍾乳直
頭痛胃塞然鍾乳與朮所可為患不過此也雖所患

不同其治亦一矣發動之始要其有始由覺體中有異與
上患相應便速服葱白豉湯又云硫黃對防風又對細
辛其治主脾腎通腰脚防風動硫黃煩疼腰痛或瞋忿
無常或下利不禁防風細辛能動硫黃硫黃不能動彼
始覺發便服杜仲湯白石英對附子其治主胃通至脾
腎附子動白石英煩滿腹脹白石英動附子則嘔逆不
得食或口噤不開或言語難手脚疼痛覺發服生麥門
冬湯紫石英對人參其治主心肝通至腎脚人參動紫

石英心急而痛或驚悸不得眠卧或恍惚忘誤失性狂
發或黯黯欲眠或憤憤喜瞋或瘥或劇乍寒乍熱或耳
聾目暗又防風雖不對紫石而能動紫石紫石由防風
而動人參人參動亦心痛煩熱頭項強始覺便宜服麻
黃湯赤石脂對桔梗其治主心通至胷背桔梗動赤石
心痛口噤手足逆冷心中煩悶赤石動桔梗頭痛目赤
身體壯熱始覺發即溫酒飲之隨能數杯酒勢行則解
亦可服大麥麴良復若不解復服朮對鍾乳朮發則頭

痛目赤或舉身壯熱解與鍾乳同附子對白石英亦對
赤石脂附子發則嘔逆手脚疼體強骨節痛或項強面
目滿腫飲酒食麴自愈若不愈與白石英同解人參對
紫石英人參發則煩熱頭項強解與紫石英同桔梗對
赤石脂又對茯苓又對牡蠣桔梗發則頭痛目赤身體
壯熱解與赤石同乾薑無所偏對

有說者云藥性草木則速發而易歇土石則遲發而難
歇也夫服藥草石俱下於喉其勢厲盛衰皆有先後其

始得效皆是草木先盛耳土石方引日月也草木少時
便歇石勢猶自未成其病者不解消息便謂頓休續後
更服或謂病痼藥微倍更增石或更雜服衆石非一也
石之為性其精華之氣則合五行乃益五臟其滓穢便
同灰土也夫病家氣血虛少不能宣通雜石之性卒相
和合更相塵瘀便成牢積其病身不知是石也如精華
不發不能致熱消疾便謂是冷盛牢劇服之無已不知
石之為體體冷性熱其精華氣性不發其冷如冰而疾

者其石入腹即熱既不即熱服之彌多是以患冷癖之人不敢寒食而大服石石數彌多其冷癖尤劇皆石性不發而積也亦有雜餌諸石丸酒單服異石初不息唯以大散為數而已有此諸害其證甚多小品方云道弘道人製解散對治方說草石相對之和有的能發動為證世人逐易不逆思尋古今方說至於動散臨急便就服之既不救疾便成委禍大散由來是難將之藥夫以大散難將而未經服者乃前有慎耳既心期得益苟就

服之已服之人便應研習救解之宜異日動之便得自
救也夫身有五石之藥而門內無解救之人輕信對治
新方逐易服之從非棄是不當枉命誤藥邪檢神農本
草經說草石性味無對治之和無指的發動之說按其
對治之和亦依本草之說耳且大散方說主患注藥物
不說其所主治亦不說對和指的發動之性也覽皇甫
士安撰解散說及將服消息節度亦無對和的發之說
也復有廩丘家將溫法以救變敗之色亦無對和的動

之說若以藥性相對為神者枯薑惡乾薑此是對之大
害者道弘說對治而不辨此道弘之方焉可從乎今不
從也當從皇甫節度自更改枯薑便為良矣患熱則不
服其藥惟患冷者服之耳自可以除枯薑若虛勞脚弱
者以石斛十分代枯薑若風冷上氣欬者當以紫苑十
分代枯薑二法極良若雜患常疾者止除枯薑而已慎
勿加餘物皇甫云然寒食藥者世莫知焉或言華佗或
曰仲景考之於實佗之精微方類單省而仲景經有侯

氏黑散紫石英方皆數種相出入節度畧同然則寒食
草石二方出自仲景非佗也且佗之為治或剝斷腸胃
滌洗五臟不純任方也仲景雖精不及於佗至於審方
物之候論草石之宜亦妙絕衆醫及寒食之療者御之
至難將之甚苦近世尚書何晏耽聲好色始服此藥心
加開朗體力轉強京師翕然傳以相授歷歲之困皆不
終朝而愈衆人喜於近利未覩後患晏死之後服者彌
繁于時不輟余亦豫焉或暴發不常天害年命是以族

弟長互舌縮入喉東海王良夫癰瘡陷背隴西辛長緒
皮肉爛潰蜀郡趙公烈中表六喪悉寒食散之

缺

遠者數十歲近者五六歲余雖視息猶溺人之笑耳而
世人之患病者由不能以斯為戒失節之人多來問余
乃喟然歎曰今之醫官精力不及華佗審治莫如仲景
而競服至難之藥以招甚苦之患其夭死者焉可勝計
哉咸寧四年平陽太守劉泰亦沈斯病使使問余救解
之宜先時有姜子者以藥困絕余實生之是以聞焉然

身自荷毒雖才士不能書辨者不能說也苟思所不逮
暴至不旋踵敢以教人乎辭不獲已乃退而惟之求諸
本草考以素問尋故事之所更參氣物之相使并列四
方之本注釋其下集而與之匪曰我能也蓋三折臂者
為醫非生而知之試驗亦其次也服寒食散二兩為劑
分作三貼清旦溫醇酒服一貼移日一丈復服一貼移
日二丈復服一貼如此三貼盡須臾以寒水洗手足藥
氣兩行者當小痺使因脫衣以冷水極浴藥勢益行周

體涼了心意開朗所患即瘥雖羸困著床皆不終日而愈人有強弱有耐藥若人羸弱者可先小食乃服若人強者不須食也有至三劑藥不行者病人有宿癖者不可便服也當先服消石大丸下去乃可服之服藥之後宜煩勞若羸著床不能行者扶起行之常當寒衣寒飲寒食寒卧極寒益善若藥未散者不可浴浴之則矜寒使藥噤不發令人戰掉當更溫酒飲食起跳踴舂磨出力令溫乃浴解則止勿過多也又當數冷食無晝夜也

一日可六七食若失食飢亦令人寒但食則溫矣若老
小不耐藥者可減二兩强者過二兩少小氣盛及產婦
卧不起頭不去巾帽厚衣對火者服散之後更去衣巾
將冷如法勿疑也虛人亦治又與此藥相宜實人勿服
也藥雖良令人氣力兼倍然甚難將息適大要在能善
消息節度專心候察不可失意當絕人事唯病著牀虛
所不能言厭病者精意能盡藥意者乃可服耳小病不
能自勞者必廢失節度慎勿服也若大傷寒者下後乃