

欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十三
四



南京中医药大学图书馆版权所有

小兒衛生微論

小兒衛生微論

卷十

論

論

論

論

能發動為病人臟腑

則隨虫所動而生焉故

大曰長虫居胃脘之間

心腹刺痛若虫貫心者

則發動為痔瘻蠹蝕

小兒衛生微論

小兒衛生微論方

一

瘡疥痂癩三曰寸白虫居腸胃之間動則損人精氣令腰脚痛弱更有一虫形若細絲或如馬尾故俗呼謂之馬尾虫此虫不拘九虫之數或云飲食中誤嚥油髮所變亦居胃中動則令兒腹中攪刺發痛不可忍受小兒虫動者多病於諸病之生皆由臟腑虛弱故也患疳勞吐瀉者尤甚錢乙論小兒虫動之證面眇白心腹痛唯是口不吐沫及無清水出也故乙又言心腹痛而吐者虫痛也心腹痛而不吐水者冷痛也但吐水不心腹痛者胃冷

也又虫痛亦與驚癇証畧畧相似但目不邪手不搐也
以此別之則無悞矣乙治虫痛者用安虫散然世人用
治虫之藥多於臨卧服之並無日分故多不驗唯於每
月初四五日間在五更時服之至日午前虫盡下矣後
以平調藥一兩服和之不可多也凡虫在人腹中每月
上旬頭向上中旬橫之下旬頭向下是以中下旬服藥
則不入虫口所以不驗也亦如牛馬生子月上旬生者行
在母前中旬生者並母而行下旬生者行在母後又如

猫之食鼠上旬則食前段中旬則食中段下旬則食下
段此物理之自然莫不知也然虫痛極者雖不貫心亦
能斃人昔錢乙治辛氏女五歲病虫痛他醫以巴椿礪
砂之屬藥治之不効至五日外多哭而俛仰睡卧不安
自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無
光而慢唇白吐沫至六日膏高而卧轉不安召乙至詳
而視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰此病大
困若更加瀉則為逆矣至次日見辛曰夜來三更而瀉

乙於瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有藥丸乙曰此子
肌厚當氣實今證反虛不可治也何以然師曰脾虛胃
冷則虫動今日青此肝乘於脾又更加瀉知其氣極虛
也而藥丸隨糞下即脾胃已絕兼形病不相應故知死
病後五日昏篤七日而死

錢乙用方
本集載之

學者當此以為法

爾今除疳勞虫動者已具於疳疾門之下外諸虫之方

叙而具後

使君子治蚘咬心腹疼痛

右以使君子火煨熟去殼與食以殼煎湯送下

紅桃散治虵咬心腹痛發歇有時

風化石灰

一兩燒赤
細研為末

硃砂

一錢細研
為末水飛

右拌勻細用飯飲一大盞入艾三五葉煎二三沸

看其多少調一字或半錢與服但須少用多則難

喫

龍膽湯治虵虫攻心其痛如刺吐出清水

右以草龍膽一兩剉碎水二盞煮取一盞去滓隔宿

不食至五更頭頓服量大小與

三角散治如前

右於七月七日採蒺藜子不以多少陰乾為散每服半錢或一錢匕飲服日三量大小加減無時

木香桃仁丹治虵攻心痛不可忍

木香

一兩

桃仁

湯浸去皮去尖并雙仁者麩炒香熟一兩

檳榔

一分

鶴虱

一兩
揀淨

黑狗脊

一兩

苦楝根白皮

半兩

右為細末獐猪膽汁和丸黍米大每服十粒射香湯

下無時

奪命丹主治如前病至危困者

狼牙草

一兩

篇蓄

一兩

苦參

一兩

雷元

半兩

薏苡仁

半兩

鶴虱

半兩

右為細末糯米和丸黍米大每服十粒生地黃汁下

無時

乳香丸治虫動心腹疼痛

乳香末

青皮

去穢炒黃為末各一分

槐花

半合炒末

風化石灰

研細
半兩

右為末勻細每服半錢槐花湯調下無時

乾漆散治如前

乾漆

炒煙盡
一錢

使君子仁

二七箇

蕪荑

去扇六
十片

棟根白

皮

取東邊
者一錢

右為細末每服一字沙糖熱水調下二三歲半錢四

五歲一錢無時

棟皮汁治如前

右取棟根皮削去外蒼皮不用只用白者以煮濃汁
量大小與服

抵聖散治如前痛不可忍者

苦棟根白皮

二兩

白蕪荑

去扇半兩

右為末每服一錢水一小盞煎取半盞放冷待發時
服量大小加減無時

勝丸子治如前

龍腦

研

蘆薈

研

射香

各一分

牛黃

半字研

胡黃連

半錢末

右為末同研勻熊膽和九菴豆大每服三五丸生米
汁水化服無時

又方

以檳榔生為末用東引石榴根煮湯調下量大小與
服或半錢一錢治寸白虫神効上旬空心食前服之
治小兒蛭虫動作

以棟實一枚煮濃汁內孔中亦治蛭虫以槐子杵爛
內孔中亦治蛭虫

治小兒寸白虫

以桃葉杵爛絞汁服之

雷元散治小兒三虫

雷元 川芎等錢

右為細末每服一錢飲調之日二服無時

胡粉牛黃丸治小兒蚘虫動腹內時時疼痛

胡粉三錢牛黃一錢射香一錢

右同研為末用獺猪膽一枚取汁浸蒸餅和丸萊豆

大五歲兒溫水下七丸以意加減無時

又方治如前

以葶藶子一分生為末水三合煎取一合一日服盡
以薏苡根煮汁作糜食之甚香而効

治蛻虫內齧心腹疼痛

以鶴虱為細末用肥猪肉汁調服五歲兒服二合虫
出便止更以意加減

治蛻虫及虫攻蝕下部痒痛

以篇蓄一把水二升煮熟五歲兒空腹服三二合乳

食前

治蟻虫攻蝕下部

以胡粉雄黃各一分同研為末每以少許傅下部

補胃膏治如前痛甚不可忍啼哭不止

良姜一兩肉桂微炮

去粗皮

肉苳蔻

麴裏煨

乾漆

炒烟盡半

兩烏梅肉

半兩炒乾

右為細末煉蜜和丸鷄頭子大每服一二粒米飲化

下無時

香雷散治如前

雷元 鶴虱 苦楝根皮 白蕪荑

去扇各半兩

右為細末每服一字或半錢用生猪肉煮淡湯調下

無時

化虫丸治虫咬腹中攪刺疼痛

蕪荑

去扇一分

檳榔

二錢

川鶴虱

一分

右為細末猪膽汁和丸麻子大每三歲五九五七歲

十九陳米飲下無時

川棟丸治胃寒虫動心腹疼痛及上中二處焦因虛而

虫動

乾漆

三分杵碎
炒烟出盡

雄黃

一分研
水飛

巴豆霜

一錢

右為細末糊丸黍米大每服五七丸量大小加減取

東引石榴根煎湯下痛甚者煎苦棟根湯或煎蕪荑

湯下

蕪荑散治上中二焦虛及胃寒虫動心腹刺痛危惡証