

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷六十二



北京中醫藥大學圖書館版權所

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

大正四年

薛氏醫書卷之二

胃經

胃經

胃經

胃經

明薛已訂

胃經中衛行脉外蓋榮者

陳於六府故能入於脉

在脾藏內在肝宣布在

大正四年

薛氏醫案

肺輸泄在腎灌溉一身滋養百脉諸經由此而生毓焉
然血之所統者氣也故曰氣主哂之血主濡之是以氣
行則血行氣止則血止陽生陰長夫倡婦隨之道也若
氣一傷則變症百出故妄行則吐血衄衄衰涸則虛勞降下
則便紅熱陷則溺赤添於腸胃則為腸風陰虛陽搏則
為崩漏此皆氣有殄戾之乖而血乃生添溢之患也然
養陰者可不先知養陽之道乎小兒患之多因稟賦積
熱或食膏粱厚味或乳母七情鬱火所致治法若氣虛

血弱當以人參補之陽旺則陰生血也若四物湯者獨能主血分受傷為氣不虛也若左寸關脉數而無力血虛也四物湯加人參朮浮而無力氣虛也補中益氣湯尺脉數或無力腎虛也六味地黄丸右寸關脉數而有力者肺胃熱也犀角地黄湯後用四物湯加人參苓白朮尺脉數而無力陰虛也用六味地黄丸若面黃目澁眊多手麻者脾肺虛也用黃芪芍藥湯

治驗

一小兒年十餘歲鼻衄肝脉弦數肝藏血此肝火血熱而妄行用小柴胡加山梔龍膽草四劑而血止又用四物苓連蘆薈山梔甘草作丸服又以地黃丸滋腎水生肝血而愈

一小兒久鼻衄右顙鼻準微赤此脾胃傳熱於肺而不能統也先用六君桔梗當歸山梔而血止次用人參黃芪散以補脾肺而愈

一小兒壯熱吐血或兼衄血右顙鼻準赤色乃肺胃

積熱用濟生犀角地黃四劑而血並止後因母飲酒復作用清胃散母子服之而愈

一小兒吐血不止鼻準赤色審其乳母有鬱熱用加味歸脾湯加味道逍遙散母子並服各數劑血少止又用八珍湯加柴胡牡丹皮而愈

一小兒因母屢恚怒發熱吐血或時衄用加味小柴胡湯之類治其母並愈後其母因勞役兼怒氣致兒患驚搐或用抱龍丸又加吐血予以加味道逍遙散母

子並愈厥後乳母仍勞役發熱此兒即驚搐或吐血或衄血母用補中益氣湯子用犀角地黄湯頓愈

一小兒十歲因傷厚味吐血用濟生犀角地黄湯解食毒清胃熱又用四君牡丹皮升麻調補脾胃而愈惟肢體倦怠兩手作麻用黃芪芍藥湯數劑而安

一小兒吐血因乳母火鬱發熱兩脇作痛後吐血以加味歸脾湯加吳茱萸製黃連治母兒不時飲數匙月餘並愈後母因怒吐血寒熱兒亦吐血先用加味

小柴胡湯二劑後用加味道遙散治其母悉愈

一女子年十四歲因驚寒熱發搐服鎮驚之藥更吐血尋衣撮空身如炙煩躁不眠飲食不入脉洪大而無倫次按之豁然而空用加減八味丸料二劑諸症悉退脉息按之如絲無氣以動用人參一兩煎服不應仍用人參一兩附子五錢二劑元氣頓復

一女子十三歲因怒吐血咬牙發搐用加味道遙散加釣藤鈎而愈次年懷抱鬱結胸滿食少吐血面赤

此因肝火動而血熱脾氣虛而不能攝血也用六味丸及歸脾湯加山梔貝母而愈

一小兒十四歲發熱吐血屬足三陰虛余謂宜補中益氣以滋化源不信仍用寒涼降火前症愈甚或謂曰小兒未有室何腎虛之有參芪補氣奚為用之余述丹溪先生云腎主閉藏肝主疏泄二臟俱有相火而其系上屬於心心為君火為物所感則相火翕然而起雖不交會而其精亦暗耗矣又褚氏云男子精未

滿而御女以通其精則五藏有不滿之處異日有難
狀之疾正此謂也遂用補中益氣湯及六味地黃丸
而痊

黃芪芍藥湯治血多歲面黃眼澁多眵手麻

黃芪三兩 甘草炙 升麻 葛根 芍藥炒黃各一兩

羌活半兩

右每三錢水煎服

愚按此手足太陰陽明藥也然血虛久則陽亦虛矣

故血不足則麻木陰虛火動變症百出實非風也此
出升陽滋陰例

人參黃芪散治虛勞客熱消瘦倦怠口燥咽乾日晡潮
熱五心煩熱盜汗胸滿食少作渴咳唾時有膿血

半夏 知母炒桑白皮 赤芍藥炒黃芪炒

紫苑 甘草炙各半兩白茯苓 柴胡 生地黃

熟地黃 秦艽 地骨皮各二兩天門冬去心三兩

人參 桔梗各一兩鼈甲醋炙五錢

右劉散每服三五錢水煎服大人亦得

一方有生薑

四物湯

方見急驚

加味小柴胡湯

小柴胡湯

方見瘰癧症

清胃散

加味歸脾湯

加味逍遙散

四君子湯

六君子湯

五方見內鈞

濟生犀角地黄湯

方見便血

補中益氣湯

方見虛羸

八珍湯

即四君四物二湯合用也

六味丸

方見腎臟

虛羸

仲陽云小兒虛羸因脾胃不和不能乳食使肌體瘦弱或大病後脾氣尚弱不能傳化穀氣所致若冷者時時

下利唇口清白熱者身溫壯熱肌體微黃更當審其形色察其見証如面赤多啼心之虛羸也面青目劓肝之虛羸也耳前後或耳下結核肝經虛火也頸間肉裏結核食積虛熱也面黃痞滿脾之虛羸也面白氣喘肺之虛羸也目睛多白腎之虛羸也仍審相勝而藥之又寒熱二症不可不辨若腹痛瀉利清白不渴喜熱此屬寒症雖在夏月宜木香丸身熱煩躁瀉利焦黃作渴喜冷此屬熱症雖在冬月宜胡黃連丸皆捨時從症之治法

也

治驗

一小兒十三歲面赤驚悸發熱形體羸瘦不時面白
噯氣下氣時常停食服保和丸及清熱等藥余曰面
赤驚悸心神怯也面白噯氣心火虛也大便下氣脾
氣虛也此皆稟心火虛不能生脾土之危症前藥在
所當禁者不信又服枳朮丸鎮驚等藥而諸症益甚
大便頻數小腹重墜脫肛痰涎飲食日少余先用六

君子湯為主佐以補心丸月餘飲食進痰涎少止又
用補中益氣湯送四神而愈畢姻後病復作墜時至
仲冬面白或顰色手足冷喜食胡椒薑物腹中不熱
脉浮按之微細兩尺微甚乃用八味丸元氣復而形
氣漸充年至二十苦畏風寒面目赤色發熱吐痰唇
舌赤裂食椒薑之物唇口即破痰熱愈甚腹中却不
熱診其脉或如無或欲絕此寒氣逼陽於外內真寒
而外假熱也仍用八味丸而諸症頓愈