

欽定四庫全書

子部

玉機微義卷四十九至



詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

玉機微義

徐用誠 原輯

劉 純 續增

霍亂明

霍亂明

內經叙霍亂所因

霍亂明

民病飧泄霍亂體重腹

筋急

按此言土運不及木乃大運水乘土而為病宜詳玩

本文

論霍亂脈證

內經曰脈伏者霍亂

傷寒論曰病嘔吐而利名曰霍亂或發熱頭痛身疼惡寒吐利或自吐下又利止復更發熱也皆是霍亂證傷寒其脈微澁者本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也

保命集云傷寒霍亂轉筋身熱脈長陽明本病也脾胃

受濕熱中焦氣滯或因冷飲或傷冷水或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏上下相離榮衛不能相維故轉筋攣痛經絡亂行暴熱吐瀉中焦胃氣所主也

謹按傷寒傳變為霍亂者殊少惟夏秋之間暄熱人腠理疎感風濕暍之氣而生此證多有陰陽虛實不同脈來浮洪者可治微而遲氣少不語者為難治

論霍亂分三因

陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔吐下利增寒壯熱頭痛

眩暈先心痛則先吐先腹痛則先利心腹俱痛吐利並
作甚則轉筋入腹則斃霍亂惡證無越於斯蓋陰陽反
戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔逆
治之惟宜溫煖更詳別三因以調之外因諸風則惡風
有汗傷寒則惡寒無汗胃濕則重著傷暑則熱煩內因
九氣所致鬱聚痰涎飲痞膈不通遂致滿悶隨其勝復
必作吐利或諸飽食膾炙恣殮乳酪水脯寒漿旨酒胃
既脹脾臟停凝必內鬱發遂成吐利當從不內外因

也

按此具霍亂三因稍備但立方未能以盡其變學者
自宜推格

論霍亂轉筋

陳氏曰轉筋者以陽明養宗筋屬胃與大腸今暴吐下
津液頓亡外感四氣內積七情飲食甜膩攻閉諸脈枯
削於筋宗筋失養必致攣縮甚則卵縮舌卷為難治

按此言霍亂者多轉筋大抵冷熱不調陰陽相搏故

筋攣痛甚者遍體轉筋此實陰陽之氣反戾風寒乘之筋失氣血所榮而為攣縮急痛也

論乾霍亂

陳氏曰乾霍亂者忽然心腹脹滿絞刺疼痛蠱毒煩冤欲吐不吐欲利不利狀若神靈所附頃刻之間便致悶絕亦涉三因或臟虛或腸胃素厚故吐利不行

按此謂人腸胃素厚形氣實者故感四氣則吐利不行而乾揮霍撩亂也大抵熱勝痰鬱則悶亂濕勝飲

鬱則吐下形氣虛者禍不旋踵嚴氏謂胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾揮霍之間變成吐利然飲食致者亦有有餘不足如飲食自倍外感濕暵而乾霍亂者宜吐之或下之過傷者宜消導之痰者劫之寒者溫之熱者清之要在適事為故也

論霍亂煩渴

陳氏曰煩渴者以陰陽反戾清濁相干水與穀併小便秘澁既走津液腎必枯燥引水自救煩渴必矣

按吐利必竭況腎水竭者乎與水者唯宜溫煖熱甚者天水輩以甘緩火也

霍亂治例

保命集云霍亂陽明證宜和中平胃建中輩或四君子湯脈浮自汗四君子加桂主之脈浮無汗四君子加麻黃吐利轉筋脇下痛脈弦者木剋土也故痛甚平胃加木瓜五錢或建中加柴胡木瓜吐利轉筋腹中痛體重脈沉而細者四君子加白芍良薑吐利四肢拘

急脈沈而遲此少陰霍亂四君子加薑附厚朴 吐利
四肢厥冷脈微緩屬厥陰建中加歸附 吐利頭痛而
身熱熱多欲飲水者五苓寒多不用水者理中丸主之
元戎云太陰證霍亂者理中加橘紅名治中湯 若吐
下心腹作痛手足逆冷理中去白朮加熟附名四順湯
若吐利後轉筋者理中加火煨石膏一兩
霍亂治法

和中之劑

四君子湯

平胃散

建中湯並治證見前

方見虛損門

治寒之劑

機要漿水散治暴泄如水周身汗出盡冷脈弱不能語

言甚者加吐

半夏 二錢

附子

乾生薑

炙甘草

桂 各半錢

良薑 三分半

右為末作一服漿水煎服之

薑附湯治霍亂轉筋手足厥冷汗嘔逆多

乾薑 一兩

附子 一箇生用

通脈四逆湯治霍亂多寒身冷脈絕

吳茱萸 三兩炒

附子 炮一兩桂心

通草

細辛

白芍

甘草 炙各半兩

當歸 三錢

右呔咀每服四錢水酒各半加生薑煎

理中湯治過食生冷遂成霍亂吐下脹滿食不消心腹

痛

方見寒門加橘皮名橘皮治中湯

嚴氏曰若臍上築動者腎氣動也去朮加桂吐多者
去朮加生薑半夏利多者仍用朮心悸者加茯苓腹
痛者加乾薑腹滿者去朮加附子厚朴

治濕之劑

三因茯苓澤瀉湯治霍亂吐利後煩渴飲水

五苓減猪苓加甘草

按此太陽例藥也

治暑之劑

局方五苓散治霍亂頭痛吐下煩渴

方見濕門

嚴氏水浸丹治伏暑傷冷冷熱不調口乾煩渴

黃丹 一兩一分炒

巴豆 二十五箇去皮心

右同研勻用黃蠟作汁為丸如梧子大每服五丸以水浸少頃別以新汲水吞下

按此劫劑也

加味香薷飲治伏暑吐利不止煩悶多渴

本方加檳榔 黃連

右呔咀每服五錢水酒各半煎服

冷香飲子治伏暑吐利煩燥

草薺仁 三兩 附子

橘紅 各一兩 甘草 半兩

右呔咀每服一兩入薑煎水旋冷服

按已上並太陽例藥也有寒熱陰陽不同要在脉證相符而行也

溫經之劑

三因木瓜湯治霍亂吐下舉體轉筋入腹則悶絕

乾木瓜 一兩 吳茱萸 半兩 茴香

炙甘草 各二錢

右呔咀每服四大錢入薑三片蘇葉十片煎