



古人云不明十二經絡開口動手便錯亦症各有所屬不可不知也  
腰背巔頂連及風府脹痛難忍足太陽膀胱經之痺也兩目紅赤如桃  
唇乾鼻燥足陽明胃經之痺也脅肋腫脹痛連兩耳足少陽胆經  
之痺也腹脹板痛不能屈伸四肢無力泄瀉無已足太陽脾經之  
東也  
半身疼痛麻木不仁左足不能屈伸者手太陽小腸經之痺也  
半身脹痛俯仰俱廢左右不能屈伸者手陽明大腸經之痺也痛  
連腰背此是外腎小便脹硬足少陰腎經之痺也咳嗽声啞氣逆噏吞手太  
陰肺經之痺也病重沉昏迷不醒或狂言亂語不省人事手少陰心

經之痺也或醒或寐或自言自語手厥陰心包絡經之痺也胸腹熱脹揭去床被乾燥無極手少陽三焦經之痺也

痧症 祕傳心法

上部

顛折痧

頭痛如打折面帶麻木顛指不止此係皮外或邪如久不治邪走心經舌上麻木舌尖吐出治法須用銅錢醮香油刮腮後穴即是腮門此處屬腎脉宜刮不宜針刺針則令人失音便用針刺風府穴即爭食堂陷窩中再下五分是瘡門穴不宜針刺藥用砂仁主霍者五枚榔王半木通五分蘆粟梗末加灯芯三十寸陰陽水煎服候溫而服

心經引用獨活細辛等分煎服

日月疝

兩太陽或左或右疼痛不止此係皮外受邪始不早治其邪走入肺經  
心肺俱脹滿身麻木眼目痠疼飲食不入口出酸水刮頸脰項即兩  
太中梗刺絲竹穴在眉稍處入髮際陷中凡用針只可淺而橫不可  
深而直以出血為止藥用砂仁主霍香丹枳榔平五分蘆粟梗半加灯  
心三十寸陰陽少煎服住涼而服引用獨活細辛各用一錢煎服

頭風疝

滿面脹疼痛此係及外受邪先用兩手指拍印堂穴再用針刺兩絲竹

穴俗云耳上肺息節也。薦用砂仁半錢、藿香半錢、木通五分、蘆粟梗半

升心三丈煎服。溫而服之。

### 蟹眼痧

兩眼凸出疼痛，滿頭脹緊。此係皮外受邪，先用兩手指摘印堂穴，抵住眶上少頃，針刺印堂穴，以手提印堂穴，摘出紅斑，以針刺出血而愈。有用砂仁半錢、藿香半錢、木通七分、枳榔半錢、蘆粟梗半錢、升心三升煎服。候涼。

### 蛇舌痧

舌頭伸縮不止，為蛇舌口吐酸水，濃痰。此係心經受邪。如或不治，則發多矣。之後心偏而發痴病也。先用錢刮兩肩井穴，即肩胛上再用

# 羊舌痺

斜舌伸左眼亦偏左舌斜伸右眼亦偏右此係脫之時感冒邪氣傳入肺經先上膈闪痛日久不治則邪氣下陷滿身脹緊先發多笑後則成癥矣須針刺舌尖斜左刺左斜右刺右再刮肩井穴药用葱白三枚白芷半分煎服

# 耳鎮痺

耳內如鐘鳴此係腎經受邪若不急治不久即耳聾矣先用針刺風府穴再用錢刮懸厘穴药用酒炒独活小煎服

# 腦後疼痺

腦後疼痛此係腦戶受邪症雖屬外皮若悞用峻药即死用針刺風府穴須

鼻瘡門穴辨清不可有差誤用錢刮兩肩膍穴為用酒炒獨活煎服

### 眼黑症

眼白變為黑色此係外皮受邪先用蕎蕎草半硝玉陰陽小煮湯洗三五次即愈如或不治則邪入腎經而目昏暗迎風下淚怕日羞明漸成外賬用鍼天沖穴刮之即而太陽用針刺而手指尖為用玉桂五分獨活平俱各酒炒煎服

### 眼白症

眼白莫遮暗此係胃經受邪如日久不治再遇懃怒傷肝本身發熱斬成內賬而光明矣為用赤茶草玉硝土用陰陽小煮湯洗三五次即止

若不止用針刮兩太陽針刺兩手指老用肉桂五分獨活五酒炒煎服

### 齒黑涉

牙齒受為黑色此係腎經受邪日久不治則邪毒入骨大熱大寒而  
難治矣用針水溝穴即人中穴也用針刮兩肩臑穴即手肘上臂也

### 舌黑少

舌頭變為黑色此係心經受邪日久不治則舌枯焦而即成不治之  
症矣用針刺舌尖上中間出血再用針刮兩肩臑穴另用獨活一至半細

### 辛王煎服

鎖喉痧

耳上經項脹痛飲食難進此係睡卧積受風邪所致用針刺匡  
風穴在兩耳後尖角陷窩中張開口即其穴左痛刺左右痛刺右  
錢亦可治之 喉風痧

喉不与肩上皮肉刺痛此係外皮受邪日久不治則漏肩風矣而手難  
牽半身不遂亦有偏左左手難牽偏右手牽用針刺而醫風穴  
用刮亦可治之 櫻桃痧

舌上有紫泡如櫻桃色此係心經受邪用針刺紫泡出血即愈若用

獨活半煎服

黑泡痧

舌上有生黑泡此係心經受邪毒入肺中不可緩治若緩治者則難治矣  
急用針刺治當血立止為引獨活半細辛八分煎服

鶴頂痧

眉心有紅色刺痛此係心經受邪熱毒上沖也如凸起而變為黑色則不能  
治矣如凸起未黑色尚可治法先用針刺出血用手撓印堂穴即愈為用  
獨活細辛各半煎火湯溫服

鼻塞痧

此症有三或左塞或右塞或兩鼻俱塞此係外皮受邪即用竹心銷鼻

中噴者再用針刺小溝穴為引獨活細辛等分陰陽水煎服

## 天頂痧

頭頂心脹緊疼痛此係外皮受邪若悞用湯藥則必成搖頭癟矣須用針刮前頂穴即頭頂心也如刮不愈用蒜好艾灸七次無有不愈此穴切忌針刺

## 中部 皮膚痧

此係外皮受邪皮膚刺痛急以針刮兩肩臂臑穴即手肘上三寸也再刮曲池穴即臂彎曲之陷窩內也次刮大陵穴在掌後一寸數間使穴在掌後一寸五分二皆是脈處又用針刺與小指尖出血為度

# 斜肩痺

此係外皮受邪左痛垂左右痛垂右如不急治將至手牽動不起即成半身不遂矣若再誤用藥餌以致不可治急以三指拍曲池穴指出紫塊針刺出血以銛刮臂臑穴

# 陰陽痺

此症有四或半身或身上半冷或半身麻木或半身難動俱係外皮受邪如急治即成半身不遂矣治法須用銛刮兩臂臑穴與肩井穴再以針刺而手指尖與無名指尖出血為度

## 縮脚症

此症有四小兒患者居多或滿身經絡收縮或手足似拘挛或左手縮或右手縮或左足或右足此係外皮受邪急用三指拍曲池穴陽交穴拍牛紫塊針刺出血用鉗刮臂臑穴药用葱白三枚白芷半两煎服

## 天泡症

此症有二或寒或热俱因肺經受邪初起時發在間使穴或大陵穴如里甚大或三五粒甚至七八粒漸長大凸出如閨子大以手捋子往上活動痛非常若迁移至曲池穴臂臑穴肩井穴尚可救治若再移至楚

胞前紫宮穴則不可治矣急用油錦扎住間使穴用兩手將泡將至曲池穴即刺點  
血而愈引葱白三寸白芷王煎服

### 板弓痧

此係腎經受邪其頭仰後其脚亦仰後胸腹凸起小兒患者居多若  
不急治則死先將兩曲池穴兩太陽穴拍出紫塊刺出黯血再刮兩肺俞穴  
在背脊第三椎督下兩傍各開一寸五分次利腎俞穴在背脊十四椎骨下各一寸五  
分引酒炒獨活煎服

### 腰痛痧

此症有三或左痛或右痛或左右齊痛俱係腎經受邪針刺而手指出血引

酒炒獨活玉服

### 紅班痧

此係外皮邪汗不能外透以致攻入腠理与心氣搏擊故發此紅班急  
以錢刮兩臂膚之曲池穴大陵穴百勞穴在背脊第一椎骨尖上更命  
門穴在第四脊椎骨兩旁各開三寸

### 紫斑痧

此因外皮受邪以致攻入臟腑故入甚于紅班者也急用照前紅班治法

則能挽回倘若遲誤則致不救矣

### 黑癰痧

此因受毒深重以致攻八臟腑故外皮發黑癰若一週時不治則口吐黑血而死  
急先刮兩肩井穴與膻中穴在胸前第六枝骨下兩乳中間次刮中庭穴  
在胸前第六枝骨下與膏肓穴命門穴腎俞穴白環穴在尾巴椿上是也  
再三指柏曲池穴陽交穴柏生紫塊針刺出血并刺間使穴与十指尖出血此症  
甚重若針刺而多血即死也

### 三指黑色痧

此係外皮受邪以致攻入臟腑若輕者十指內發里點若重者十指全黑若三四日不治即死急用針刺十指出血

### 脚趾黑色痧

此筋經受邪先筋肉微痛毒氣下攻以致脚趾黑色小便失血若过一週时不治其命沒意先用針刺兩脚尖与十指尖陽爻穴出血為独活平酒炒煎服

### 黑線痧

此係二因腎受邪毒氣已入骨髓若遇毒氣占入冲上寒後大熱用西手將臂上推捋，牛皮內隱；有黑色線此症重也即湏心主刮曲池穴又用針刺間使