

沈氏尊生書卷八

傷寒論綱目

沈金鑑輯

陽明經

陽明經脈

綱仲景曰。傷寒三日。陽明脈大。

○朱肱曰。足陽明胃之經。從鼻起。挾於鼻。絡於目。下分爲四道。并正別

脈六道。上下行腹。綱維於身。蓋諸陽在表。陽明主肌肉。絡於鼻。故病人身熱目疼。鼻乾不得卧。其脈尺寸俱長者。知陽明經受病也。戴元禮曰。脈大者。兩陽合明。內外皆陽之象也。陽明受病之初。病爲在表。脈但浮而未大。與太陽同。故亦有麻黃桂枝證也。至二日。惡寒自止。而反惡熱。三日。熱大盛。故脈亦應其象。而洪大。此爲胃家實之正脈。若小而不大。便屬少陽。內經云。陽明之至短而澀。此指秋金司令之時脈言也。又曰。陽明脈象大浮也。此指兩陽合明之病脈言也。喻昌曰。傷寒一日太陽。二日陽明。三日少陽。乃傳經之次第。其實不以日拘。此三日陽明脈大。正見二日之陽明傳。自太陽必無乎浮緊。浮緩未定。是正陽陽明也。若正陽陽明氣血俱多。其脈必大。而與太陽別矣。言外見三日證。連少陽則其脈必大而弦。又不得爲正陽陽明也。魏荔彤曰。陽明之爲病。胃家實。何以驗之。驗之於脈。如其人

本太陽傷寒三日之久。表邪不解。致變熱傳裏。入陽明成胃家實。則其脈浮緊。浮緩者忽變爲大浮與緊緩俱不見矣。既不浮則沉可知也。既云大則沉而兼滑。又可知也。向者太陽之浮候於寸者。既多今者陽明之沉候於關者必多也。關脈大而沉滑。恰是中脘爲病。則胃家之實可決也。

綱仲景曰。脈浮而大。心下反鞕。有熱屬臟者。攻之。不令發汗。屬腑者。不令洩數。洩數則大便鞕。汗多則熱愈。汗少則便難。脈遲尚未可攻。以上論胃實

柯琴曰。此治陽明之大法也。夫脈之浮而緊。浮而緩。浮而數。

浮而遲者。皆不可攻而可汗。此浮而反不可汗而可攻者。以陽明三日之脈。當知大爲病。進不可拘浮爲在表也。又曰。脈遲尚未可攻者。以證有虛實。脈有真假。假令脈遲。便非臟實。是浮大。皆爲虛證矣。特爲妄攻其實者禁也。朱肱曰。問傷寒何以須診衝陽脈。答曰。衝陽脈。是足陽明胃之經。人受氣於穀。穀入於胃。乃傳與五臟六腑。臟腑皆受氣於胃。其清者爲營。濁者爲衛。營行脈中。衛行脈外。陰陽相貫。如環無端。胃爲水穀之海。主稟四時。皆以胃氣爲本。是謂四時之變病。死生之要會。故傷寒必診衝陽。以察其胃之有無也。衝陽二穴。一名會源。在足跗上五寸。骨間動脈上去陷骨三寸。

綱仲景曰。陽脈微而汗出少者。爲自和也。汗出多者。爲太過。陽脈實。因汗出多者。亦爲太過。太過爲陽實。於裏亡津液。大便因鞕也。國危亦材曰。此雖指太陽轉屬。然陽明表證亦有之。

綱仲景曰。太陽病。寸緩關浮尺弱。其人發汗出。復惡寒不嘔。但心下痞者。此以醫下之也。如不下者。病人不惡寒而渴者。此轉屬陽明也。小便數者。大便必鞭。不大便十日無所苦也。渴欲飲水。少少與之。但以法救之。宜五苓散。傷寒脈浮緩。手足自溫者。繫在太陰。太陰者。身當發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日大便鞭者。爲陽明病也。以上論他經轉屬

柯琴曰。上條病機在渴欲飲水利水是胃家實而脈弱之正治。不用猪苓湯而用五苓散者。以表熱未除故耳。此爲太陽陽明之併病。下條病機在小便太陰受病。

轉屬陽明。以陽明爲燥土。故非經絡表裏相關所致。總因亡津液而致也。

綱仲景曰。問曰。脈有陽結陰結。何以別之。答曰。其脈浮而數能食。不大便者。此爲實。名曰陽結也。期十四日當劇。以上論陰陽結證

張雲岐曰。

此條本爲陰結發論。陽結卽是胃實。爲陰結作伴耳。陰結無表證。當屬之少陰。不可以身重不能食爲陽明應有之證。沉遲爲陽明當見之脈。便鞭爲胃家實。而不敢用溫補也。

綱仲景曰。陽明病。脈遲汗出多微。惡寒者。表未解也。可發汗。宜桂枝湯。陽明病。脈浮無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。陽明病。脈浮而緊者。必潮熱。發作有時。但浮者。必盜汗出。脈浮而遲。面熱赤而戰惕者。六七日當汗出而解。遲爲無陽。不能作汗。其身爲癢也。

魏荔彤曰。太陽中風傷寒。解肌肌不盡。解

發汗汗不盡出。外邪氣變熱內正陽生。熱陰燥陽絕。太陽病已轉屬陽明矣。然病有已入陽明而未離太陽者。則中風傷寒二條尚在表而未盡除也。豈可遽舍太陽表治而從陽明裏治乎。故仲師特舉此首條二條以立法也。蓋此乃太陽陽明之證。入陽明未深。故令其邪仍自表出。不致歸於胃而無所復傳。是解肌發汗二法始終井井者也。三條乃陽明病仍帶太陽深恐陽明病去太陽漸遠而成陽明漸多。非就脈證以明之不審也。脈浮緊由太陽傷寒而成爲寒傷營而致成陽明之脈證者。脈但浮由太陽中風而成爲風傷衛而致成陽明之脈證者。陽明病至此已將離太陽八九矣。而尙有一二太陽在主治者。猶當以下之太早爲戒而防結胸與痞也。四條乃陽明之虛脈虛證也。汗者陽氣遲者陰脈無陽不能作汗。又當助陽發汗者也。

仲景曰。脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄。以上論陽明在表證

目夏全善曰。此條主治宜桃仁承氣湯犀角地黃湯之類也。

仲景曰。傷寒四五日脈沉而喘滿。沉爲在裏。而反發其汗。津液越出。大便爲難。表虛裏實。久則譫語。發汗多。若重發汗者。亡其陽。譫語。脈短者死。脈自和者不死。以上論陽明譫語證

目朱鳩曰。表虛裏實。譫語之由也。譫語脈短。譫語之脈也。汗多則津脫營虛。故脈短。若津雖脫而不甚脫。營雖虛而不甚虛。則脈自和。

綱仲景曰陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下之則腹滿小便難也。目鱗按脈浮而緊潮熱有時之候此爲陽明初病在裏之表也。

綱仲景曰陽明中風脈弦浮大而短氣腹部滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈弦緊者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治。以上論陽明中風

目朱肱曰問十二經皆一而陽明有三何也有

太陽陽明有少陽陽明有正陽陽明也太陽陽明者本太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明也少陽陽明者本傳到少陽因發汗利小便已胃中燥實大便難也正陽陽明者病人在內風盛氣實也三陽明俱宜下惟惡寒及中寒爲病在經與太陽合病屬表可發其汗蓋太陽與陽明合病脈必浮大而長證必頭疼腰痛肌熱目痛鼻乾也脈浮大者太陽也長者陽明也頭疼腰痛者太陽也肌熱目痛鼻乾者陽明也尙惡寒者可升麻湯汗之若不惡寒反惡熱大便不祕者可白虎湯解利之不惡寒反惡熱大便祕或譖語者屬胃家實也可調胃承氣湯下之身熱汗出繁繁然者屬陽明也張介賓曰太陽陽明者邪自太陽傳入於胃其名牌約以其小便數大便鞭也正陽陽明者邪自陽明本經傳入於腑而邪實於胃也少陽陽明者邪自少陽傳入於胃也胃本屬土爲萬物所歸邪

入於胃則無所復傳。鬱而爲熱。此由耗亡津液。胃中乾燥。或三陽熱邪不解。自經而腑熱結所成。故邪入陽明。胃府者謂之實。邪土氣爲邪。王於申未。所以日晡潮熱者。屬陽明也。論曰。潮熱者。實也。是爲可下之證。然雖可下。若脈浮而緊。或小便難。大便溏。身熱無汗。此熱邪未全入腑。猶屬表證。仍當和解。若邪熱在表。而妄攻之。則禍不旋踵。

○仲景曰。陽明病。脈遲腹滿。食難用飽。飽則微煩。頭眩必小便難。此欲作穀疸。雖下之。腹滿如故。所以然者。脈遲故也。○黎按。陽明中風。其脈則浮而弦大。今脈則遲。是中寒且無陽矣。

○仲景曰。傷寒脈遲。六七日而反與黃芩湯。撤其熱。脈遲爲寒。今與黃芩湯復除其熱。腹中虛冷。當不能食。今反能食。此名除中必死。若脈遲至六七日不欲食。此爲晚發水停中故也。爲未解食自可者。爲欲

解。○以上論陽明中寒

陳士鐸曰。

傷寒脈遲。自然是寒。誤與黃芩湯。則益加寒矣。寒盛。宜不能食。今反能食。病名除中。仲景謂是死證者何也。夫能食。是胃氣有餘。如何反曰死證。不知。胃寒而加之寒藥。反致能食者。此。胃氣。欲。絕。轉。見。假。食。之。象。不。過。一。時。能。食。病。名。除。中。者。正。言。胃。中。之。氣。除。去。而。不。可。留。也。雖。是。死。證。猶。有。生。機。終。以。其。能。食。胃。氣。將。除。而。未。除。可。用。藥。以。留。其。胃。氣。也。方。用。加。減。參。芩。湯。王。履。曰。凡。言。陽。明。病。者。必。身。熱。汗。出。不。惡。寒。反。惡。熱。也。今。但。言。傷。寒。則。惡。寒。可。知。非。不。惡。寒。者。也。況。脈。遲。爲。無。陽。必。

其裏寒特甚。

綱仲景曰。陽明病。脈浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若發汗則躁。心憤憤而譖語。若加燒針。心恍惚。煩躁不得眠。若下之。剗胃中空虛。客氣動膈。心中懊憹。舌上胎者。梔子豉湯主之。若脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利者。猪苓湯主之。目吳綬曰。細繹脈浮而緊一條。乃陽明半表裏證也。邪已入腹。不在營衛之間。脈雖浮。不得以爲在表而發汗。脈雖緊。不得以其身重而加溫針。胃家初實。尚未燥硬。不得以其喘滿惡熱而攻下。陽明梔子豉湯。猶太陽桂枝湯既可驅邪亦可攻誤。虞坤曰。上條是不肯令胃燥。下條是不肯令水浸入胃。總爲胃家惜津液也。

綱仲景曰。病如桂枝證。頭不痛。項不強。寸脈微浮。胸中痞。顎氣上沖咽喉。不得息者。此爲胸有寒也。當吐之。宜瓜蒂散。目黎按。寸脈微浮。尚是陽明之表脈。用瓜蒂散。即是陽明之表劑。

綱仲景曰。病人手足厥冷。脈乍緊者。邪結在胸中心。下滿而煩。饑不能食者。病在胸中。當吐之。宜瓜蒂散。目黎按。緊本爲寒。今言乍緊者。正與厥應。不厥時。未必緊。是寒結胸中之脈證也。

綱仲景曰。太陽病。當惡寒發熱。今自汗出。不惡寒發熱。關上脈細數者。以醫吐之過也。此爲小逆。一二日吐之者。腹中饑。口不能食。三四日吐之者。不喜糜粥。欲食冷食。朝食暮吐。以醫吐之所致也。目柯琴曰。

言太陽病頭項強痛可知以脈辨之。關上者陽明之脈細弦數而不洪大雖自汗而不惡熱則不是與。陽明併病不口乾煩滿而自汗出自不與少陰兩感原其故乃庸醫妄吐所致則自汗爲表虛脈細數爲裏熱也。

續仲景曰傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之。服桂枝湯大汗出煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之。目黃仲理曰此二條必合看乃得蓋前條證也後條脈也。脈浮發熱無汗本麻黃證尚存卽是表不解更兼渴欲飲水又是熱入於裏此謂有表裏證當用五苓散。

續仲景曰三陽合病脈浮大在關上但欲睡眠合目則汗。目程郊蒨曰脈而浮大陽脈也關上陽所治是爲重陽矣與少陰脈沉細而但欲寐者自異。

續仲景曰傷寒脈浮滑此表有熱裏有邪白虎湯主之。傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之。目柯琴曰此條論脈而不及證因有白虎證而推及其脈也切勿據脈而不審其證脈浮而滑爲陽陽主熱內經云脈緩而滑曰熱中是浮爲在表滑爲在裏此雖表裏並言而重在裏熱所謂結熱在裏表裏俱熱者也脈微而厥爲寒厥脈滑而厥爲熱厥陽極似陰之證全憑脈以辨之。

綱仲景曰。傷寒十三日不解。過經讐語者。以有熱故也。當以湯下之。若小便祕者。大便當硬。而反下利脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微。今反和者。此爲內實也。調胃承氣湯主之。
目

張雲岐曰。脈調和而不微。是脈有胃氣也。內實者。胃實也。胃實則腸虛。故必以調胃承氣湯調其胃也。
綱仲景曰。陽明病。脈遲。微汗出。不惡寒者。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濶然而汗出者。此大便已鞶也。大承氣湯主之。若汗多。微發熱。惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令大泄下。
目方中行曰。脈遲汗出等八證。乃陽明之外邪。欲解。可以攻裏。而不爲大誤也。然曰。欲解。曰可攻。不過用小承氣。調胃承氣法耳。必手足濶然汗出。方可驗。胃實便鞶。外邪盡解。而當從大承氣急下之法也。申酉戌間獨熱。餘時不熱者。爲潮熱。若汗出微發熱惡寒。是陽明證尚兼太陽。縱腹大滿。胃終不實。只可微和胃氣以從權而已。

綱仲景曰。陽明病。讐語。發潮熱。脈滑而疾者。小承氣湯主之。因與承氣湯一升。腹中轉失氣者。更服一升。若不轉失氣者。勿更與之。明日不大便。脈反微澀者。裏虛也。爲難治。不可更與承氣湯也。
目柯琴曰。脈滑而疾。有宿食也。明日仍不大便。脈反微澀。微則無陽。澀則少血。此爲裏虛。故陽證反見陰脈也。然胃家未實。陰脈尚多。故脈遲脈弱者。始可和而久可下。陽脈而變爲陰脈者。不惟不可下。更不可和。脈滑

者。生脈澀者死。故爲難治。然滑有不同。又當詳明。夫脈弱而滑。是有胃氣。此脈來滑疾。是失其常度。重陽必陰。仲景早有成見。故少與小承氣試之。若據譖語潮熱而與大承氣。陰盛已亡矣。此脈證之假有餘。小試之而卽見真不足。憑脈辨證可不慎哉。

續仲景曰。傷寒若吐若下後不解。不大便。五六日上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸床。惕而不安。微喘直視。脈弦者生澀者死。微者但發熱。譖語大承氣湯主之。若一服利止後服。曰張氣善曰。此本壞病也。但不可不辨其微劇微者是邪氣實。當以下解。一服利者止後服。只攻其實。毋乘其虛也。劇者邪正交爭也。當以脈斷其虛實。弦者是邪氣實。不失爲下證。故生澀者是正氣虛。不可更下。故死。

續仲景曰。脈滑而數者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。曰龔信曰。數爲在府。故滑爲有食。數以至數言。是本來面目。疾以體狀言。在譖語潮熱時見。故爲失度。

續仲景曰。病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者屬陽明也。脈實者宜下之。與承氣湯。曰柯琴曰。煩熱自汗似桂枝證。寒熱如瘧似柴胡證。然日晡潮熱。則屬陽明。而脈已沉實。確爲可下。是承氣主證。主脈也。

綱仲景曰。得病二三日。脈弱無太陽柴胡證。煩躁心下轉至四五日。雖能食。以小承氣少少與微和之令少安。至六日。與承氣湯一升。若不大便。六七日小便少者。雖不能食。但初頭硬。後必溏。未定成硬。攻之必溏。須小便利。屎定硬。乃可攻之。宜大承氣湯。國王肯堂曰。二三日尚在三陽之界。脈弱者無陽故也。無陽者無太陽桂枝證。無少陽柴胡證也。如是則病不在表而陽邪入陰。病在陽明之裏也。七日後乃可攻者。以脈弱是太陽中風。能食是陽明中風。以此爲風也。

潮熱譫狂

綱仲景曰。傷寒若吐若下後。不解。不大便。五六日上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者。發則不識人。循衣摸床。惕而不安。微喘。直視脈弦者生。濶者死。微者。但發熱譫語。大承氣湯主之。若一服利止後服。目朱肱曰。脈弦者陽也。濶者陰也。陽證見陰脈者死。病人有陽證而脈濶者。慎不可下。下證悉具。服湯已更衣者。止後服。不爾方盡劑服之下。後慎勿中服補藥。孫真人云。服大承氣湯。得利差。慎不中服補藥也。熱氣得補。復盛。更復下之。是重困也。宜消息安養之。仲景有宣下者。有微和其胃氣者。蓋傷寒裏證。須看熱氣淺深。故仲景有宣下之。如大承氣湯。小承氣湯。十聚湯。大柴胡湯是也。有微和其胃氣。如調胃承氣湯。脾約丸。小承氣微和之之類是也。金匱云。虛者十補勿一瀉。強實者瀉。

之虛實等者。瀉勿大瀉之。故叔和序傷寒有承氣之戒。又問轉藥孰緊。答曰。大承氣最緊。小承氣次之。調胃承氣又次之。大柴胡又次之。仲景治法。蕩滌熱積。皆用湯液。不得用丸子。不可不知也。大柴胡加大黃。小柴胡加芒硝。方爲轉藥。蓋爲病輕者設也。釐按。潮熱譖狂俱見證之極重者矣。閱仲景陽明證論中。有單言潮熱者。有單言譖語者。有單言發狂者。此條乃獨舉潮熱譖狂而備言之。明乎其證之重。且憑脈以決其生死也。大約病至此。其脈必弦者少。而澀者多。故弦者生句。輕看專重在澀者死句。欲醫者于此急審其脈。或猶見弦象。則猶有下之一法。以救之。不然可勿藥也。仲景特提此條。以爲世告。余亦因獨摘此條。另立一欵。不雜入單言潮熱。單言譖語。單言發狂欵中也。

潮熱

綱仲景曰。陽明病。脈浮而緊者。必潮熱。發作有時。但浮者。必盜汗出。目劉完素曰。潮熱屬陽明。必於日晡時發者。乃爲潮熱。若日三五發者。則是發熱非潮熱也。王好古曰。脈浮而緊。是惡寒將自罷。將發潮熱時之脈也。此緊反入裏之謂。不得拘緊。則爲寒之說。

綱仲景曰。陽明中風。脈弦浮大而短。氣腹都滿。脇下及心痛。久接之。氣不通。鼻乾不得汗。嗜臥。一身及面目悉黃。小便難。有潮熱。時時嘯。耳前後腫。刺之小差。外不解。病過十日。脈弦浮者。與小柴胡湯。脈但浮無

餘證者。與麻黃湯。若不尿。腹滿加噦者。難治。○按本條不言發熱。但曰有潮熱。是明兼少陽矣。故可

與小柴胡湯。

續仲景曰。陽明病脈遲。微汗出。不惡寒者。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濶然而汗出。此大便已鞕也。大承氣湯主之。若汗多。微發熱。惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣微和胃氣。勿令大洩下。陽明病潮熱。大便硬者。可與大承氣湯。不硬者。不可與之。若不大便六七日。恐有燥屎。欲知之法。少與小承氣湯。湯入腹中。轉失氣者。此有燥屎。乃可攻之。若不轉失氣者。此但初頭硬。後必溏。不可攻之。攻之必脹滿。不能食也。欲飲水者。與水則噦。其後發熱者。必大便硬而少也。以小承氣湯和之。不轉失氣者。慎不可攻也。○朱肱曰。潮熱者。大率當下。仲景云。潮熱者實也。大承氣湯證。云其熱不潮。未可與也。則知潮熱當下無疑矣。雖然。更看脈與外證。脈若弦。若浮。及外證惡寒。猶有表證。且與小柴胡湯以解之。若腹大滿不通者。可與小承氣微和其胃氣。勿令大洩。縱使潮熱當行大承氣。亦須先少與小承氣。若不轉失氣。不可攻之。後發熱便鞕者。大柴胡湯。下之。若胸脇滿而嘔。日晡發潮熱者。小柴胡加芒硝。又有日晡發潮熱。已有微利者。又有微發潮熱。而大便溏者。或潮熱而欬逆者。皆當用小柴胡也。冬陽明潮熱。當行黃芩湯。陽明病俱宜下。惟惡

寒中寒爲病在經。與太陽合病屬表。發其汗耳。若吐若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡寒者。白虎證也。柯琴曰。胃實諸證。以手足汗出爲可據。而潮熱尤爲親切。以四肢爲諸陽之本。而日晡潮熱爲陽明主時也。後條必因脈之遲弱。卽潮熱尚不足據。故又立試法。以小承氣湯爲和。卽以小承氣湯爲試。仍與小承氣湯爲和。總是慎用大承氣耳。

續仲景曰。傷寒若吐若下後不解。不大便五六日。上至十餘日。日晡所發潮熱。不惡寒。獨語如見鬼狀。若劇者發則不識人。循衣摸床。惕而不安。微喘直視。脈弦者生濇者死。微者但發熱譖語。大承氣湯主之。若一服利止後服。目藜按此潮熱而又不大便。不惡寒。俱是可下證也。

續仲景曰。陽明病譖語有潮熱。反不能食者。胃中必有燥屎五六枚也。若能食者。但硬耳。宜大承氣湯。固魏荔彤曰。能食不能食二者。俱知津必立枯屎必盡。燥日久愈耗液傷正。自宜大承氣湯。此於不能食而辨其已有燥屎於能食而辨其將來必有燥屎。俱宜攻下也。他條言雖能食。雖不能食。俱應斟酌。不可大爲攻下。此條又言反不能食者。若能食者。俱應直捷而大爲攻下。非自體認。能得仲師之心。從孰問津乎。凡傷寒論中。仲師旣恐人不應下而下。又恐人應當下而下之太早太甚。今且恐人應下而不下。或不敢大下。故就燥屎以示之。令人旣知詳慎。又忌遲疑。中庸所以不易能也夫。

綱仲景曰。二陽併病。太陽證罷。但發潮熱。手足濶濶汗出。大便難而譫語者。下之則愈。宜大承氣湯。
方中行曰。太陽證罷。分明全屬陽明。首必先言二陽併病者。見未下時。便有可下之證。見得太陽一罷。其餘皆可下之證矣。

綱仲景曰。陽明病譫語。發潮熱。脈滑而疾者。小承氣主之。因與承氣湯一升。腹中轉失氣者。更服一升。若不轉失氣者。勿更與之。明日不大便。脈反微澀者。裏證也。爲難治。不可更與承氣也。
〔魏〕華佗形曰。脈滑而疾者。大之漸。而疾者數之稱。病由太陽轉屬陽明。必在表之邪變。熱入裏脈之浮者。必變大其緊。與緩者必俱變。疾數也。數熱也。非變熱入裏無以致成陽明也。凡病邪入經脈必變。緊緩爲數病。邪入腑脈又易數疾。稍遲。

熱入血室

綱仲景曰。陽明病。下血。譫語者。此爲熱入血室。但頭汗出者。刺期門。隨其實而瀉之。濶然汗出則愈。
〔魏〕華佗形曰。成無己曰。此熱入血室。蓋言男子不止謂婦人也。室者。可停止之處。血室者。榮血停止之所。經脈留會之處。即衝脈也。起於腎下。出於氣衝。並足陽明經。挾臍上行。至胸中而散。爲十二經脈之海。王冰曰。衝爲血海。言諸經之血。朝會於此。男子則運行生精。女子則上爲乳汁。下爲月水。內經曰。任脈通衝脈。

盛月事以時下者是也。王冰又曰陰靜海滿而去血謂衝脈盛爲血海也。卽是觀之衝爲血室可知矣。傷寒之邪婦人則隨經而入。男子由陽明而傳以衝之脈與少陰之絡起於腎。女子邪感太陽隨經便得入衝之經並足陽明。男子陽明內熱方得而入也。衝之得熱血必妄行。在男子則下血譖語在女子則月事適來適斷。皆以經氣所虛宮室不闢邪得乘虛而入。針經曰邪氣不得其虛不能獨傷人者是矣。柯琴曰血室者肝也。肝爲藏血之臟故稱血室。女以血用事故下血之病最多。若男子非損傷則無下血之病。惟陽明主血所生病其經多血多氣行身之前隣於衝任陽明熱甚侵及血室血室不藏溢出前陰故男女俱有是證必刺肝之募。卽期門穴引血上歸經絡推陳致新使熱有所洩則肝得所藏血不妄行矣。按蓄血便膿血總是熱入血室入於腸胃從肛門而下者爲便膿血蓋女子經血出自子戶與溺道不同門。男子精血溺三物內異道而外同門。精道由腎血道由肝溺道由膀胱其源各別而皆出自前陰也。黎按肝藏血腎生血心主血脾統血而其源則匯於衝衝起腎下與腎貼近血之由衝而出者卽如由腎而生故曰腎生血言腎所生以衝卽在腎下也。由是上行至脾脾之爲地寬廣故得而統之再上行至肝爲營氣凝聚之處一身之血皆歸焉故曰藏也。心爲君主血脉皆朝宗而聽命故曰主也然則血室之說成氏主衝柯氏主肝二說雖異其實則同主衝者就其源頭處言主肝者就