

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百七十卷目錄

醫部彙考一百五十

嘔吐門三

方一 人參半夏湯 小半夏湯 吳茱萸湯

小麥湯 猪苓散 附片人參散 子 又方

又方	又方	又方	婦人湯	又方
又方	又方	又方	連中湯	又方
又方	又方	又方	又方	又方

五苓散
桂枝湯
小柴胡湯
大柴胡湯
四逆散

[illegible]

甘肅 野蠻 烏拉 蒙古 丁亥 年
白木 漢 苑 角 化 我 上

黃元一丁香半製丸
竹雷湯 王博丸
九寶香散 蘇靈花酒
碧丹 大牛更湯 寶

香 燐 煮 湯
使 氣 散
鹽 煎 散
化 氣 湯
分 氣 煎 散
參 苓 白 朮 散
勻 氣 散
香 蘭

丁香丸 大養胃湯 十珍餅子 萬應回生丹

小丁氏丸 草氏龍海 粵香枳木丸

月見 參照 三聖散 下疳 下疳 下疳 下疳
沉先 上預 楊梅 木香散 關黃丹

廣濟散 再續 白木 乾薑 冬 人參 湯 黃 芩 附

子訓 九條皮重
附與第二 一百七十卷

西部彙考二百五十

嘸哇門

方一

碧霞丹 集驗方

治吐逆不止

黃丹四兩用米醋半斤煎乾

右以煑火三神煎銀內煑新令足爲天要才會

卷一百一十五

古今圖書集成

北黃丹四兩用米酢半斤煎乾
右以炭火三秤就鍋內煅紅令定爲末粟米飯丸
梧子大每服七丸酢湯下

藝術典第二百七十卷

醫部彙考二百五十

方一

望溪集

治吐逆不止

黃丹四兩用米酢半

右以炭火三秤就燒

梧子大每服七丸酢

今圖

陰陽丸 鄧氏小兒方
治諸般吐瀉
硫黃半兩 水銀一錢 研墨

右薑汁糊丸小豆大三歲三丸冷水下大人三四
十丸

治痰飲吐水無時節者其原因冷飲過度遂令脾

胃弱不能消化，食食不胃，宜變所法，不用
吐不停

右水七升煮一升五合分服
吳茱萸湯
治嘔涎頭痛

一各通肺腸治心熱實欲吐不出煩悶喘急頭痛
石膏一斤 淡竹葉 香豉各一斤 小麦
地骨皮各五兩 茯苓二兩 地仁仁三七枚

右七味咬咀先以水一斗五升煮小麦竹葉取八
升登時次下諸藥煮取一斗去滓分三服

又方

治腹脹善噯食則欲嘔泄瀉下口乾四肢更舒
怒不欲聞人聲忘談喉痹

黃連二兩 馬鈴糖二兩 白朮 乾薑各二兩
大蘇子五兩 桑白皮八兩 大棗二十枚

右七味咬咀以水一斗二升煮取三升分四服
半夏湯

一名小茯苓湯治逆氣心中煩悶氣喘吐氣上
半夏一升 生薑一斤 茯苓 桂心各五兩

右四味咬咀以水八升煮取二升半分三服若少
氣加甘草二兩

前胡湯

治寒熱嘔逆少氣心下緊聚影字滿不得食寒熱
消渴不足

前胡 生薑各二兩 甘草 枳實 大黃別枝各
二兩 芍藥 茯苓 麥門冬 當歸 半夏

滑石 石膏 苦蘆根 黃芩 附子
右十六味咬咀以水一斗一升煮取六升分四服
又方

治嘔吐四肢身冷短氣脈微三焦不調

前胡 芍藥 甘草 當歸 石膏 人參
桂心 橘皮各二兩 芍藥二兩 半夏四兩

生薑五兩 大棗二十枚
右十二味咬咀以水一斗二升下黃芩二兩合煮
取三升分三服一方不用黃芩

小麥湯

治嘔吐不止

小麦一升 人參 厚朴各四兩 甘草一兩
香竹茹二兩半 生薑汁二合 茯苓三兩

右七味咬咀以水八升煮取二升去滓分三服
猪苓散

治嘔而渴上寒

猪苓 茯苓 白朮各三兩
右三味治下篩以飲服方寸匕日三服者多飲水

犀角人參散

治嘔逆胃氣虛邪風熱不下食並皆治之
犀角 人參各二兩 薤白五兩 粟米一合

右四味咬咀以水四升半煮取一升七合下米煮
令米熟分四服去粗七里久進一服

又方

治春夏時行傷寒寒傷於胃胃冷變蛇
橘皮 桂心 葛根各二兩 白茅根一升

右四味咬咀以水六升煮取三升分三服服盡更
合有熱去桂心

又方

治嘔噦
人參二兩 胡麻仁八合 橘皮去白一兩

右四味咬咀以水一斗煮橘皮葉取五升下米煮

取三升內麻仁稍飲之
又方
治氣厥嘔噦不得息

豉一升 半夏八兩 生薑二兩 人參 前胡
桂心 甘草各一兩

右七味咬咀以水九升煮取三升分三服
又方

治腹脹
大棗十五枚 附子一枚 橘皮二兩 豉一升

生薑 甘草各一兩
右六味咬咀以水九升煮取一升分三服日三

橘皮湯

治乾嘔噦若手足厥逆者
橘皮四兩 生薑半斤

右二味咬咀以水七升煮取三升分三服不止更
合服之

又方

治傷寒後嘔乾嘔不下食
生薑根 青竹茹各一升 粳米二合 生薑二兩

右四味咬咀以水五升煮取一升分三服不止服
三劑

又方

治腹脹
通草 橘皮各二兩 枳實二合 生薑根一升

右四味咬咀以水四升煮取一升半分三服
葛根湯

治惡寒心下結胸嘔絕飲食不消又主傷寒

在痢寒冷惡氣

附子 烏頭 桂心 礬石各四兩

右四味為末蜜丸如胡豆大以酒服三九日二加至十九藥耐寒冷忌熱食近火宜冷飲食

半夏湯

治結勞虛寒心腹冷逆逆氣胃氣滿從胃達背痛噦氣往來嘔逆飲食即吐虛步不足

半夏一升 生薑一斤 桂心四兩 甘草厚朴各二兩 人參 橘皮 麥冬各三兩

右八味咬咀以水一斗煮取四升分四服腹滿加當歸二兩

建中湯

治五勞七傷小腹痛急痛勝肌虛滿手足逆冷食飲苦吐酸痰吐泄少氣目眩耳聾口焦小便自利

膠飴半斤 黃芪 乾薑 當歸各三兩 人參 半夏 橘皮 芍藥 甘草各二兩 附子一兩

大棗十五枚

右十一味咬咀以水一斗煮取三升半湯成下膠飴再沸分四服深師有桂心六兩生薑一斤無橘皮乾薑

厚朴湯

治上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫

清溫香散

厚朴 茯苓 芍藥 白朮 元參各四兩

桔梗 附子 人參 橘皮各三兩 生薑八兩

吳茱萸二合

右十一味咬咀以水二斗煮取五升分爲五服

止嘔人參湯

治下焦熱氣逆不嘔嘔吐不暴名曰走嘔

人參 蘇葉 黃芩 知母 茯苓各三兩 生薑 梔子 白朮 橘皮各四兩

石骨八兩

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

吳茱萸一升 人參三兩 生薑六兩 大棗十二枚

右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服

四逆湯

治嘔而厥弱小便便利身有微熱見厥者難治

附子一枚生用 乾薑二兩五錢 甘草二兩炙

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服

強人可大附子一枚乾薑三兩

附子梗米湯

治腹中寒氣當陽切痛胃脘逆滿嘔吐

附子一枚炮 半夏 梗米各半升 甘草一兩

大棗十枚

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

五苓散

治腹人臍下有悸吐涎沫而脈弦

澤瀉一兩一分 猪苓 茯苓 白朮各三分

桂二分去皮

右五味為末白飲服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

桂枝五味甘草湯

治支飲胃而嘔者

茯苓四兩 甘草 細辛 乾薑各二兩 五味 半夏各半升

右六味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

牛夏滿心湯

治嘔而喘心下痞者

半夏半升洗 黃連一兩 黃芩 乾薑 人參 甘草各三兩 大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

黃芩加半夏生薑湯

治乾嘔而利者

黃芩 生薑各三兩 甘草二兩炙 芍藥一兩

半夏半升 大棗十二枚

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服

小柴胡湯

治嘔而發熱者

柴胡半斤 半夏半升 黃芩 人參 生薑 甘草各三兩 大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

大半夏湯

治胃反嘔吐者

半夏一升洗 人參三兩 白蜜一升

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮

一兩主治

如吐瀉轉筋腹中痛體重脉沉而細者宜四君子湯加芍藥黃連四君子湯四味各一兩芍藥良薑各五錢同煎服

如吐瀉重腹四肢拘急脈沉而遲者此少陰也宜四君子湯加薑附片四君子湯四味各一兩生薑附子厚朴炮製各三錢同煎服

如吐瀉轉筋四肢厥厥脉微緩者屬厥陰宜建中湯加附子當歸湯

香薷飲治非時霍亂大瀉煩躁汗出轉筋疼痛不可忍

霍亂轉筋者解其汗飲之無不瘳者

霍亂腹痛心煩短氣未得吐下若轉筋緩急二十枝研末熱水調下

霍亂轉筋不止宜半夏湯為末湯煮涼水下不渴者溫水下無時如吐瀉不止身無汗者可與瀉利

門藥水散兼桂枝湯又可與白朮湯

霍亂轉筋者用理中湯去朮加附子一枚生用霍亂之逆則上吐下瀉兩脚轉筋其則霍亂轉筋

腹肚痛手足厥冷若欲死者食卒之際宜於臍中灼灸大炷一把煎湯洗次投以薑附理中湯之類其效及用

霍亂吐瀉之症其治法霍亂吐瀉下又太陰所至為中滿霍亂吐下此其土氣亂即仲景五苓散理中丸之類是也

歲土不及風乃大行民病霍亂除濕此土虛風象霍亂即經滿市村茶白朮散之類是也

熱至則身熱霍亂吐下此熱霍亂即活人香薷散

之類是也

王翰明醫著

霍亂

暑熱之時外無寒邪內傷風水冷物腹痛泄瀉或霍亂吐逆宜解脾散炒仁草果甘草扁豆乾薑烏梅或理中湯加神曲寒暑身痛砂香木此專治內濕中消食也若吐瀉脈沉微者不可用涼藥可用附子大順散熱閉于甘草乾薑杏仁桂或附子理中湯加芍藥

夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂治暑藥多用溫解治宜溫利小便醫者要識此意

若既傷暑熱復傷生冷外熱內寒宜先治其內濕中消食次治其外清暑補氣而以理脾為主於前除陽二條內相兼取用東垣清暑益氣湯已兼此意其用黃芪升麻人參白朮甘草麥冬冬苓歸五味黃藥葛根是清暑補氣也若木神離陳皮澤瀉荷皮是治內補脾也

按前證又當分別中暑中胸脈虛脈沉無汗汗發熱不熱作渴不渴或渴不渴飲飲然熱其陰陽虛實不可泛投寒涼之劑蓋為夏月伏陰在內古人用附子大順散之類溫補陽氣有旨諒何今之老婦至夏月食少體倦皆誤作渴或吐瀉腹痛頭痛諸證反服香薷散復傷元氣無不招引霍亂以致不起至若清暑益氣湯內用猪苓澤瀉之類必審其果有濕熱滯方可用之否則虧損其陰而傷其日失用當審察

若夏秋暑熱因通用冷物茶水傷其內又通取涼風

傷其外以致惡寒發熱身熱脈沉四肢厥冷不逆反嘔吐瀉瀉此內外俱傷寒也人參乾薑炒至黃芩厚朴薑水炒陳皮羌活枳實白茯苓各一錢白朮一錢五分甘草炙五分黃芪水煎食前溫服

按前證宜用此方如未應宜用香薷正氣散若內外已解藥熱未退或飲食不進宜用六君子保命集云霍亂屬明證宜用和中和平建中湯或四君子湯緩浮白汁四君子加桂枝主之脈浮無汗四君子加麻黃吐利轉筋者下痛脈沉者木

桂土也用石胃散加木瓜或建中加柴胡木瓜吐利轉筋腹痛重脈沉而遲四君子加白芍黃芪薑吐利四肢拘急脈沉而遲四君子加薑附厚朴吐利四肢厥冷脈微緩屬厥陰建中加歸附杜利頭痛而身熱熱多欲飲水者五苓散兼多不飲水者理中丸上元氏云太陰霍亂者理中加橘紅杜下腹痛手足逆冷理中加熟附子吐利後轉筋者理中加大煅石膏兩

若夏暑在途常服以壯元氣清熱解暑服之免中

暑霍亂泄瀉痢疾等證方用人參一錢二分白朮一錢五分五味子十粒粒碎麥冬去心白芍藥炒白茯苓各一錢知母陳皮黃芩各七分黃芪炒三分甘草炙五分煎水煎食溫服

按前證若人元氣虛弱宜用補中益氣去柴胡升麻加麥冬五味或少加炒黑黃芪人參益氣湯亦可

若遇勞傷苦勞力過多即服後方二三服見生內傷暑熱之病此方主於補氣實正一錢半黃芪人參

丁香半夏丸

治積寒在胃嘔吐吞酸

丁香不見火一兩 乾薑炮 半夏湯泡七次

橘紅各二兩 白朮一兩半 右爲細末生薑自然汁打糊爲丸如梧桐子大每

服五十九粒溫湯送下食前

大黃香散

治發熱惡寒惡熱惡寒七情傷感氣鬱於中變成嘔

吐或作寒熱惡寒惡熱不進飲食

藿香葉 半夏麴 白朮 木香不見火各一兩

白茯苓 人參 桔梗剉炒 枇杷葉拭去毛

官桂不見火 甘草炙各半兩

右爲細末每服三錢水一大盞生薑五片棗子一

枚煎至七分去滓溫服不拘時候

旋覆花湯

治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花去梗 半夏湯泡七次 陳皮去白

乾薑炮各一兩 甘草炙 檳榔 白朮七炒

人參各半兩

右咬咀每服四錢水一大盞生薑七片煎至七分

去滓溫服不拘時候

竹茹湯

治胃受邪熱心煩舌燥嘔吐不止

葛根三兩 半夏湯泡七次二兩 甘草炙一兩

右咬咀每服五錢水一大盞生薑五片

煎至七分去滓取清汁微冷細細服不拘時候

玉澤丸

治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐及久新翻胃不

開得病之由皆可服之其良方也

人參 白朮薑炒去蘖 白朮 乾薑炮 丁香

肉豆蔻對藥末 橘紅 白豆蔻仁 藜蘆炒

附子炮去皮 枳實 木香不見火 南星炮 檳榔

半斤湯泡七次 甘草炙

右等分爲細末每服一錢人參一錢和勻生薑

自然汁搜和丸如梧桐子大每服湯送下食前

取出每用溫湯吞下不拘時候病重者不過三

服發熱者去附子大便硬者去肉豆蔻

丹升

治風陽衰虛心火怯弱不養脾土中氣和失布中州

虛寒飲食不進胃弱痞塞或食而不化或滿或已食

而不消痰涎惡心翻胃吐食氣虛寒未致不化

心腹絞痛泄利不止一切脾胃諸疾

硃砂人塊不夾石者五十兩 人參 縮砂仁

肉豆蔻對藥末 紅豆 華澄茄 白豆蔻仁

高良薑剉炒 附子炮去皮 藜蘆炒 白朮

厚朴薑炒 丁香不見火 五味子 乾薑炮

胡椒 益智仁 橘紅 麥冬 草果仁各四兩

右將人參等二十味各如法修製剉如豆大以銀

鍋一口用白沙蜜五斤將藥一牛同蜜拌勻入銀

鍋內以夾生絹袋盛好絲綿帶入銀鍋內以桑

柴火湯煮四日四夜換蜜五斤入煎藥一牛和

勻再煮二日三夜取汁淨焙乾入乳鉢用玉鍾

研道細十分細末爲丸如粟大陰乾每服十

粒加至十五粒空心食前用人參湯送下藥湯亦

得嘔吐用淡溫湯送下忌食穢膩

大半製湯

治嘔吐

半夏 陳皮 茯苓各一錢半

右咬咀水一盞薑一錢半煎八分食後服

沉香氣湯

治三焦氣滯滿氣不宣心腹脹痛嘔吐痰涎五噎

五瀉

沉香 木香 丁香 藿香葉 人參 甘草

白朮各一兩 肉豆蔻 桂枝 檳榔 陳皮

砂仁 川芎 枳實炒 白檀各二兩 青皮

白茯苓 白豆蔻

右每服二錢水煎人參少許

鹽煎散

治男子婦人一切冷氣攻衝胃弱刺痛不已及脾

胃虛冷嘔吐泄瀉腸鳴小腸氣痛人血虛痛

差活 砂仁 甘草炙 茯苓 草果 川芎

肉豆蔻 藜蘆 藿香 華澄茄 李薤炒 檳榔

良薑油炒 枳殼炒 厚朴 陳皮 薑水各等分

右用水煎加鹽少許

分氣蘇飲

治脾胃不和氣逆嘔促心下脹滿嘔逆不食

五味子 桑白皮 茯苓 甘草炙 草果

腹皮 陳皮 桔梗各一錢 紫蘇十五兩

右咬咀每服四錢水煎薑三片人參少許

勻氣散

治氣滯不舒胸膈痞塞食不消心腹刺痛服滿

噎塞嘔吐惡心調脾胃進飲食

生薑 沉香 丁香 檀香 木香各二兩
藿香 甘草炙各四兩 砂仁 白果仁各二兩

右為末每服二錢沸湯調下或水煎服

快氣散

治一切氣心腹脹痛胃弱噎塞嘔氣吞酸胃中痰

逆嘔吐及宿酒不醒

砂仁 甘草炙 香附 生薑

右為末鹽湯調下

化氣湯

治一切氣逆何弱噎塞心脾卒痛嘔吐酸水吐火

小野氣婦人血氣

沉香 胡椒各二兩 訶砂仁去殼 桂心

木香各二兩 陳皮炒 乾薑炮 菰木炮

青皮去穢炒 茴香炒 甘草 丁香皮各四兩

右為末每服二錢煎蘇鹽湯調下婦人淡醋湯下

參香白木散

治脾胃虛弱飲食不進或食嘔吐泄瀉及大病後

調劑脾胃

山藥 白茯苓 人參 白朮各一斤 蓮子

砂仁 白扁豆炒 桔梗 蘇黃炒黃各一斤

甘草炙二斤

右為末每服二錢煎蘇鹽湯調下

丁香香散

治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香 乾薑 川烏炮去鹽 甘草炙各半錢

紅豆去皮 貝薑炒 青皮 胡椒各一錢

陳皮二錢 益智去皮三錢

右作一服水二鍾生薑三片鹽一捻煎至一鍾不

拘時服

藿香半復散

治胃虛中寒停滯飲嘔吐噎逆

藿香二錢 半夏湯泡七次炒黃色三錢半

右作一服水二鍾生薑七片煎至一鍾食前服

丁附治中湯

治胃寒停滯嘔吐不已

丁香 青皮炒 陳皮 白朮 人參各二錢

附子炮 甘草炙各一錢 乾薑炮半錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾空心服

沉香煎丸

治嘔吐除中滿痞氣痰逆惡心煩悶不調

沉香 硫黃別研木炭 檳榔麝香 胡椒

沒藥別研 丹砂別研木炭 豆豉 丁香

硃砂別研木炭 青皮去白炒 木香各二兩

縮砂去皮 巴豆去皮心腹新瓦上壓去油一分

同燒研沒開用白粉和作餅炙焦別研為末

果未與陳久者湯浸取沉者炒各半兩

右除別研藥外餘藥為細末別研藥研勻煉蜜

和丸如黍豆大磁盒盛貯封每服二九食前臨臥

用溫生薑糯米湯下量人虛實人小加減

丁香丸

治因食冷物凝滯胃間嘔吐不止

大丁香半兩 乾薑 肉桂各二錢 木香

胡椒 藿香 甘草炙各三錢

右為細末湯浸蘇枳和丸如黍大焙乾時導乾

嘔不吐飲湯水入即愈吐如覺痰瀉更加附子

鹽意

大麥胃湯

治飲食停滯胃弱不化朝食暮吐暮食朝吐上氣

復熱四肢骨痛二便不調及胃虛寒氣在下二氣

逆爭但出入不喘不得食

厚朴去皮 生薑各二兩 白朮 山藥 人參

川芎 橘皮 當歸 五陳子 藿香 黃芪

批把藥剉去毛尖薑汁炙 甘草炙各一兩

肥藥三兩同厚朴生薑二味炒

右咬咀每服四錢水二鍾生薑二片煎一校煎

七分去滓空心服或為細末湯調下亦可

十珍餅子

治大人小兒嘔吐痰涎痰涎難管無問久新皆治

丁香 沉香 官桂去粗皮 藿香 肉豆蔻

果炙黃湯洗乾 木香各半兩 水銀銼砂子

脂同各七錢 半夏湯洗七次焙乾薑汁製一兩

右為細末煉蜜和丸如小豆大捏作餅子每服十

餅不拘時生薑湯下或化散服亦得通病加減

助胃膏

治嘔吐不食

人參 白朮 茯苓 橘皮 訶砂仁各一分

丁香 木香 白豆蔻 蘇枳仁各一錢半

白豆蔻仁一錢

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸生薑湯

渴化下

炮附子丸

治胃脘有熱胃中有寒嘔吐不止

附子炮去皮片

右礬金細末以麝和九如梧桐子大就溫以火

黃末為衣每服十九粒至二十九粒湯送下

加味二陳湯

治胃熱嘔吐不已

半夏湯炮七次 陳皮各半兩 白茯苓三錢

甘草一錢半 刮荊竹青四錢

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分

去滓不拘時服

麥門冬湯

療煩熱嘔逆食下則出

麥門冬 青竹茹各三兩 茅根 生薑各五兩

人參 甘草炙各一兩

右切以水七升煮取二升五合分溫三服如人行

五里進一服不吐利忌海藻松菜

加味七氣湯

治氣鬱嘔吐

半夏製二兩半 人參 厚朴製 蘇桂各一兩

茯苓一兩半 甘草炙半兩

右咬咀每服三錢半生薑七片煎一枚煎至七分

去滓服加木香實亦得

小丁沉丸

治乾嘔和調胃氣

丁香 藿香子炒各半兩 木香各半兩 沉香

縮砂仁 白芷炒 益智仁 甘草炙 橘紅焙

生薑一斤細切入香鹽四兩淹一宿焙乾各一兩

阿膠一分用煎升熬成膏

右為細末入阿膠膏拌勻用酢漿粉糊和丸如梧

頭實大研并炒磨香細末各少許同為末每服一

丸細嚼用鹽湯送下空心服

草豆蔻湯

治乾嘔和胃下氣

草豆蔻去皮 藿香 根枝去蘊微炒 白木

橘紅焙 山芋各半兩 桂心 丁香各一分

右咬咀每服三錢水一盞煮 枚碎煎藥末少許

同煎至七分去滓食前溫服

生薑丸

治乾嘔忘心益津液和胃氣

生薑一斤和皮切以青皮三兩同淹一宿焙乾

甘草炙 陳皮湯浸去白焙乾各四兩 香白芷

縮砂仁去皮 胡椒各一兩 蓬木炮二兩

右為細末以麝和丸如小彈子大用丹砂細末

為衣每服一丸細嚼溫酒送下食前服

溫中白丸

治胃寒嘔噦

白木炒三兩半 半夏二兩製 乾薑一兩

丁香各半兩

右為細末生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服三

十九粒不拘時生薑湯送下

思食丸

助脾胃消飲食止嘔逆

烏梅肉五錢 神麝炒 麥麝炒各三錢 人參

乾薑炮 甘草炙各二錢

右為細末連藥和丸如梧桐子大每服三五十粒

食前用米飲湯送下

參香枳木丸

開胃進食止嘔吐

人參 木香各三錢 枳實炒二兩 陳皮四錢

白木一兩半 乾生薑一錢半

右為細末用荷葉包米煨飯和丸如梧桐子大每

服五七十粒不拘時用米湯送下

開胃丸

治乾嘔氣逆不止

半夏制微炒二兩 人參一兩半 白豆蔻去皮

陳皮去白焙 白木各一兩

右為細末用生薑汁同藥肉和丸如梧桐子大每

服二十九粒加至三十九粒不拘時用粥飲送下

參麥湯

治乾嘔不下食

人參一兩 陳麥米一兩半 生薑切碎五兩

半夏湯炮七次去毒四兩用生薑同搗碎焙乾

右同入銀石鍋中慢火焙令焦黃細搗篩每服三

錢水一盞生薑三片煎一枚去棧煎至七分去滓

微熱空心服

三聖散

治嘔逆不食

半夏七枚大者梔子殼并華木內浸一日一攪水七

粒取出焙乾 丁香四十九粒 胡椒四錢

右爲結未大人用生薑湯調一字小兒訪頭生薑汁後點藥少許口中立愈至甚者不過三服

丁香附子散

治脾胃虛弱胃弱結吐逆不止

每丁香四十九兩 生薑半斤取自然汁半碗

附子一兩

右用附子微孔四十九以丁香刺上面燒內薑生薑汁用文武火熬盡又用大羅面一箇取一穴子

入附子及燒內將薑蓋之又用文武桑柴火燒香熟度取出切附子作片子焙乾搗爲細末每服一錢米湯一盞開下日進三服

紫泥丸

治中焦吐食由食積爲寒氣相假故吐而痛宜服之

半夏 代赭石 縮砂仁各三錢 烏梅去核 丁香 檳榔各一錢 杏仁去皮尖 沉香 木香 白木各一錢 陳皮五錢 白豆蔻

巴豆霜另研各半錢

右爲細末入巴豆霜合勻酢糊丸黍米大每服五十九丸吐愈則止治小兒食積吐食大如

五棗丹

治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

皂莢一錠 凡二十塊留性安分土壅勿令出烟

巴豆十二箇白粉一兩五錢同炒令黃色爲度

右爲末酢糊爲丸黍米大每服十九丸鹽湯下食後加減

桔梗湯

治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先抑中

白木一兩半 桔梗 橘紅 枳實各炒 茯苓 厚朴微製炒香各一兩 半夏一兩

右改咀每服一兩水一盞煎至七分取清溫服調

木香散一錢隔夜空食前服之三服之後氣漸

下吐漸止然後用木香散如芍藥二兩黃芪一兩

半每料中推算加上件分兩依前服之病愈則已

如大便燥結食不盡下以水承氣湯去積微下之

少利爲度再服前藥補之如大便復結又依前再微下之

木香散

治氣逆嘔吐

木香 檳榔各五分

右爲細末煎服調服

荆黃湯

治暴吐者上焦氣熱所衝也經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於火服洪而汗

刺客一兩 人參五錢 甘草二錢半 大黃二錢

右爲細末都作一服水二盞煎至一盞去滓調服

治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先抑中

白木一兩半 桔梗 橘紅 枳實各炒 茯苓 厚朴微製炒香各一兩 半夏一兩

右改咀每服一兩水一盞煎至七分取清溫服調

木香散一錢隔夜空食前服之三服之後氣漸

下吐漸止然後用木香散如芍藥二兩黃芪一兩

半每料中推算加上件分兩依前服之病愈則已

如大便燥結食不盡下以水承氣湯去積微下之

少利爲度再服前藥補之如大便復結又依前再微下之

木香散

治氣逆嘔吐

木香 檳榔各五分

右爲細末煎服調服

荆黃湯

治暴吐者上焦氣熱所衝也經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於火服洪而汗

刺客一兩 人參五錢 甘草二錢半 大黃二錢

右爲細末都作一服水二盞煎至一盞去滓調服

檳榔散

治氣逆嘔吐

檳榔二錢 木香一錢半 輕粉少許

右爲細末用煎藥調服如爲丸亦可用水浸茶餅

爲丸如小豆大每服一十九丸食後服

青錢丸

治上焦吐頭痛有汗脈弦

柴胡二兩去苗 黃芩七錢半 甘草 人參

半夏湯洗各半兩 青黛二錢半

右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大每服五十丸生薑湯食後服

白木散

治中虛損有痰而吐

半夏兩半 白木 木香 甘草各二錢

檳榔二錢半 茯苓一錢

右六味同爲細末每服二錢煎生薑湯調下食前

吐而食臥者肝熱於脾而吐乃由脾胃之虛宜

治風安胃之藥

金花丸

治痰食嘔吐

半夏湯洗一兩 檳榔一錢 雄黃一錢半

右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大小兒另丸

生薑湯下從少至多漸次服之以吐爲度藥終於

脾故欲食自下

附子丸

治下焦吐食朝食持吐暮食朝吐大便不通

附子炮五錢 巴豆霜一錢 硃一分

右同研極細篩黃蠟爲丸桐子大每服一二丸冷

水送下利爲度後服服至沉凡常服不令再閉

白木散

治痰食嘔吐

白木 茯苓去皮 人參 藿香葉各五錢

甘草一兩半 木香一分 葛根一兩

右爲末白湯調下一錢煩渴者加滑石二兩甚者

加薑汁搗飲之

乾薑不逆人參湯

治傷寒食入即吐

乾薑 黃芩 黃連 人參各三錢

水煎溫服

羌活附子湯

治陰證寒厥嘔逆

羌活一錢 大附子半枚炮 茴香 丁香

乾薑各一錢半

右水煎入鹽一撮熱服

大橘皮湯

治嘔逆胃滿虛煩不安

橘皮 甘草各二錢 人參五錢

右薑七片水煎服

小橘皮湯

治嘔而手足厥冷者

陳皮五錢 生薑一兩

右水煎溫服

右邊瀉服

單人參湯

治氣虛嘔吐

人參三兩

右用水三盞煎至八分熱服兼以麥煮粥食若

卒吐嘔逆溺飲入口即吐困弱者為九服之調胃

亦宜

單白朮散

治胃冷有積與食飲吐者

白朮五錢

右為末好酒調服

金木六君煎

治肺腎虛寒水泛為痰嘔吐等證

當歸 半夏 茯苓各三錢 熟地三五錢

陳皮一錢半 炙甘草一錢

水二鍾生薑三五片煎七八分食遠溫服

和胃二陳湯

治胃寒生痰惡心嘔吐胃弱瀉瀉氣

乾薑炒二錢 砂仁四五分 陳皮 半夏

茯苓各一錢半 甘草炙七分

水一鍾半煎七分不拘時溫服

芥水二陳煎

治寒飲水氣停蓄心下嘔吐吞酸等證

諸苓 澤瀉 茯苓各一錢半 半夏 三錢

炙甘草八分 乾薑炒黃 白朮各一二錢

陳皮一錢

和胃飲

治寒濕傷脾薑朮吐瀉及痰飲水氣胃脘不清嘔

惡脹滿腹脹等證此即半胃散之變方也凡嘔吐

等證多有胃氣虛者一聞芥水之氣亦能動嘔故

以乾薑代之

陳皮 厚朴薑汁製各一錢半 乾薑炮一二錢

炙甘草一錢

水一鍾半煎七分溫服此方凡薑香木香丁香香

芥半夏扁豆砂仁澤瀉之類皆可隨宜增用之若

胃脘有滯而兼時氣寒熱者加柴胡

排氣湯

治氣逆食滯腹脹嘔吐等證

陳皮 藿香 枳殼各一錢五分 香附 澤瀉

烏藥各二錢 木香七分或一錢 厚朴一錢

水一鍾半煎七分無服

大和中飲

治飲食滯滯腹脹嘔吐等證

陳皮二錢 枳實一錢 砂仁五分 山楂

麥芽各二錢 澤瀉 厚朴各一錢半

水一鍾半煎七八分食遠溫服

小和中飲

治胃腸脹悶嘔吐等證

陳皮 茯苓 厚朴各一錢五分 山楂肉

扁豆炒各二錢 甘草五分

水一鍾半煎生薑三五片煎服

大分清飲

治積熱閉結小水不利嘔吐等證

茯苓 澤瀉 木通各二錢 諸苓 枳殼

梔子或倍之 車前子各一錢

水一鍾半煎八分食遠溫服

小分清飲

治小水不利濕滯嘔吐腹脹不能受補等證

茯苓 澤瀉 諸苓各三錢 薏仁一錢

枳殼 厚朴各一錢

水一鍾半煎七八分食前服

神香散

治胃弱胃脘脹冷難解疼痛嘔噎腹瀉飲食不

諸藥不效者惟此最妙

丁香 白豆蔻或砂仁亦可

二味等分分為末清湯調下五七分甚者一錢日數

服不拘

正柴胡飲

凡外感風寒發熱惡寒頭痛身痛嘔吐等證

柴胡二三錢 防風 甘草各一錢 陳皮一錢

半 芍藥一錢 生薑三五片

水一鍾半煎七八分熱服

柴陳煎

治傷風發熱寒熱咳嗽熱病滿多痰嘔吐等證

柴胡二三錢 陳皮一錢半 甘草一錢 半夏

茯苓各一錢 生薑三五片

水一鍾半煎七分食遠溫服

抽薪飲

治諸凡嘔吐火熾盛而不可補者

黃芩 石斛 木通 梔子炒 黃蘗各一二錢

細甘草三分 枳殼 澤瀉各錢半

水一鍾半煎七分食遠溫服內熱甚者令服更佳

太清飲

治胃火煩熱嘔吐等證與白虎湯出入酌用

知母 石膏 木通各一錢半 石膏生用五七錢

水一鍾半煎七分溫服或冷服或加麥門冬

四味同陽飲

治嘔吐元陽虛脫危在頃刻者

人參一二兩 製附子 炮薑各二三錢

炙甘草一二錢

水二鍾武火煎七八分溫服徐徐飲之

六味回陽飲

治嘔吐陰陽將脫等症

人參一二兩或數錢 炙甘草一錢 製附子

炮薑各二三錢 熟地五錢或一兩 當歸身三

錢等或大者

水二鍾武火煎七八分溫服

理陰煎

治真陰虛弱嘔逆嘔吐惡心吐瀉腹痛等證

熟地三三七錢或一二兩 炙甘草一二錢

當歸二三錢或五七錢 乾薑炒黃色一二三錢

或加肉桂一二錢

水二鍾煎七八分熱服

溫胃飲

治中寒嘔吐吞酸腹滿不思飲食及婦人厥寒嘔

逆胎氣不安等證

人參一二三錢或一兩 白朮炒一二錢或一兩

扁豆炒二錢 陳皮一錢或不用 炙甘草一錢

乾薑炒焦一二三錢 當歸一二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

參薑飲

治脾胃脾氣虛寒嘔吐飲噎氣短小兒吐乳等證

乾薑炮五分或一二錢或用煨生薑二五片

人參三五錢或倍之 炙甘草三五分

水一鍾半煎七八分徐徐服之

黃芽丸

治脾胃虛寒或飲食不化或時發腹痛泄瀉各般

嘔吐等證

人參二兩 休乾薑三錢

煉白蜜為丸大實大常嚼服之

一瓦丹

治脾胃虛寒嘔吐等證

人參 製附子各等分

煉白蜜丸如黑豆大每用滾白湯送下三五分或

一錢凡藥餌不便之處或召送大隨帶此丹最妙

溫膽丸

治吐酸

人參隨宜 白朮未出沒妙 當歸各四兩

芍藥炒焦 茯苓 細桂枝 史君子煨取肉

用根去合口者妙出汗 懷慶各二兩 乾薑炮

果桑黃湯泡一宿炒各一兩

右為末神酒調為丸如梧子大每服五七丸或百

丸隨時白湯下

聖木煎

治寒濕瀉利嘔吐尤為聖藥

冬白朮五六七八錢炒或一二兩 乾薑炒

肉桂各一二錢 陳皮酌用

水一鍾半煎七分溫熱服

單方

嘔吐瀉厥卒死者飲新汲水三升佳

心痛吐水不下飲食發止不定雄雞二兩酢一斤機

火煎成膏用乾薑餅和丸梧子大每服七丸薑湯下

暴得吐逆不下食生薑末一錢匕溫水服仍以細

麝半匙壓定

胃弱嘔逆不食用草豆蔻仁一枚高良薑半兩水一

盞煮取汁入生薑汁半合白麝作餅力以羊肉膠汁

煮熱空心食之

口吐清水乾乾艾煎湯服之

食已即吐大黃四兩甘草二兩水三升煮一升半分

再服

嘔逆脈道內有寒歲半夏一升洗滑粉研小麥麴一

升水和作餅丸水煮熟初吞四五枚日三服稍增至

十五枚旋黃旋吞覺病瘳再作息羊肉餵養此乃許

仁則方也

乾嘔不吐者旋湯汁服一升最妙

嘔嘔不止白脂麻一大合清油半斤煎取三合去麻
 退服方效
 嘔逆不止麻仁枳椇木煎取汁著少鹽嚥立效李陳
 中酒嘔逆赤小豆黃汁徐飲服之方效
 嘔逆不止臭火酒一杯新洗月水一杯和服其妙新
 乾嘔厥逆頻嘔生薑椒家聖藥也
 嘔吐不止生薑一兩酢醬一合銀器煎取四合連滓
 啗之又殺腹內長蟲方效
 頭暈吐逆胃冷生痰也用川乾藁粳一錢半甘草炒
 一錢二分水一鍾半煎減半服藥用有效方效
 嘔嘔吐水真橘皮去口為末五更安五分於掌心紙
 之即睡三日必效皮不真則不驗方效
 嘔吐痰水白檀榔一顆煎熟橘皮一錢半或為末水
 一盞煎半盞溫服方效
 耐心吐水檀榔四兩橘皮一兩為末每服方寸匕空
 心生蜜湯調下方效
 嘔嘔厥逆寒濕煎汁啗之方效
 乾嘔不思進汁溫服半升日三次入黃汁更佳方效
 胃冷嘔逆氣厥不通母丁香三箇陳橘皮一塊去白
 噀水煎熱服方效
 痰逆嘔逆心胃滿悶不下飲食厚朴一兩薑汁炙黃
 為末并時米飲調下一錢匕方效
 嘔逆不食胸脇動一兩炒研細丸梧子大空心湯
 服一十九日服方效
 天行嘔逆入即吐連子一枚水煮三五沸冷水浸
 少頃吞之方效

吐逆不止不拘男女連日新飲湯藥不能下者即效
 五靈脂治婦人未夠胎計和丸夫子大每服一丸煎
 生薑酒磨化猛口熱吞不得數日急將溫酒少許磨
 之服之
 脾虛吐食羊肉半斤作生以蒜薑薤或五味和作空
 腹食之方效
 大行病後嘔逆食即反出用青羊肝作生淡食不過
 三度食不出方效
 嘔逆酸水羊屎十枚酒二合煎一合頓服未定更服
 之方效
 食後喜嘔鹿角燒末二兩入參二兩烏木薑湯服方
 寸匕日三服方效
 嘔吐酸漿水煎頭垢豆豉服一杯效方效
 虛寒嘔嘔飲食不下細辛去葉半兩丁香二錢半為
 末每服一錢柿蒂湯下
 嘔嘔不止飲逆者薑根三斤切水煎濃汁頻飲二升
 必效若以童子小便煮服不過二升愈方效
 嘔嘔不止飲逆者薑根九一三十枚以沸湯煮熟洗
 出投漿水中待溫吞二兩枚啗定即不用再吞未定
 至更再吞方效
 嘔嘔心下痞堅生薑八兩水三升煮一升半夏五合
 洗水五升煮一升取汁同煮一升半分再服方效
 乾嘔吐逆涎水沫出半夏乾薑各二分二味以酒以
 藥水一升半煮取七合頓服之方效
 病人乾嘔取羊乳汁飲一杯
 乾嘔酒浸馬原一宿取汁服之
 又方薑散三升飲汁佳

又方空腹飲薑汁一升
 惡心取苦瓠瓤并子一升碎以酒水三升煮取一升
 頓服須臾吐并下如蝦蟇衣三升
 又方服小便一百日佳
 又方麻子一升格令香熟獨取酒三升熟研連取一
 升飲盡日二服盡一石瘕一切病自能飲食不能消
 任性多少
 治食飲嘔吐方頓服生熟湯三升即止
 上氣嘔吐水一升為末煮丸黃時以井華水服如
 梧子丸九日亦可作散空腹服之及以酒煮服
 蘇問曰心熱病者熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面
 赤無汗刺少除太陽
 脾熱病者先頭重煩煩心煩身熱刺足太
 陰陽明
 霍亂曰霍亂有者長太息心中憤懣惡人將捕之
 邪在臟逆在胃腸泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰
 嘔嘔取三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以閉霍逆
 如調其虛實以去其邪

甲之經曰熱病汗不出而苦嘔煩心承光主之

頭項惡寒汗不出機惡寒嘔吐曰承光痛引額頭

項痛風濕汗不出

醉者風熱發熱而角形痛不能飲食類煩嘔吐者合主

之

傷寒熱盛煩嘔大椎上

背脊熱惡寒背脊強使仰難食不下嘔吐多涎高命主之

胃脘脹滿背脊痛惡風寒飲食不下嘔吐不潔仕魂門

主之

振寒身重汗不出仲欬嘔噦滿氣高善驚逆煩不得汗

煩滿因風濕凝結汗澤上之左寒刺右右寒刺左

熱病煩心而汗不止則身振身重不不休心中痛曰

赤黃小便如血欬嘔嘔中熱若不寒太息脈滑乾

喘逆身熱如大頭痛如破氣胃痛太陵主之

熱病煩心善嘔嘔中滿腹滿動而熱間使主之

熱病腹滿善嘔嘔煩悶大都主之

熱病汗不出善寒者身反折口噤善噦煩嘔痛不

可以類類而有不似者善寒上下取之出血見血立

已

瘧疾逆心而不得臥嘔甚熱多寒少欲閉戶牖而寒

寒厥足熱主之

陽厥懷懷而寒少腹脹頭痛腹股瘦痛滑中小便不

利者嘔三三主之

欬而嘔逆食不下裏熱皮肉痛痛少氣不得臥胃

滿去痛而上下脫脫者中滿腹脹胃氣痛主之

頭痛滿下不用飲食中滿腹脹胃氣痛主之

動身常溫惡心痛無可振者脾命主之

肺系惡胃中痛惡寒自滿腹脹熱善嘔嘔胃中熱喘

逆氣相迫逆多滿嘔不得息胃肝風汗出面腹脹兩

中食飽不下食積痞肩息脹脹皮膚背脊痛寒熱煩滿

中府主之

寒濕滯占頃手臂不仁唾沫乾引飲手腕攣屈肢

痛肺脹上氣耳中生風欬喘逆善嘔嘔嘔吐飲食不

下膨脹然少商主之

寒熱欬喘沫掌中熱虛則肩臂寒微少氣不足以息

寒熱交兩手而醫時則寒熱則煩飽則善面色變

口噤不開惡風沒出刺微主之

寒熱善嘔惡汗主之

嘔惡寒時有微熱脅下支滿喉痛聲啞聲外廉痛淫

淫經腹下腫馬刀瘻肝腫傷痛太衝主之

氣痛噦嘔面腫奔豚天樞主之

胃者背相引心下滿滿嘔吐多唾飲食不下海門主

之

欬逆上氣喘不得息嘔吐胃滿不得飲食命府主之

胃滿欬逆喘不得嘔吐煩滿不得飲食神藏主之

胃滿腹滿所出口苦舌乾飲食不下脾命主之

胃滿積滿脾痛骨疼飲食不下嘔逆氣上煩心紫腎

主之

胃者積滿胃寒飲食不下嘔吐食復出中庭主之

傷食發下滿不能展轉反側目青而嘔期門主之

胃下積滿嘔吐逆腹泉主之

胃中寒脹氣多身熱腹滿腹中滿而嘔腹脹風寒胃

骨積滿嘔吐吞息惡煩食不下胃命主之

頭痛滿下不腹鳴臍腹脹嘔時泄三焦命主之

食飲不化入腹意出下脘主之

腹中腸鳴盛盛然食不化宿痛不得臥煩熱中不嗜

食胃者積滿腹意而嘔嘔心痛及傷他身黃疾骨

氣發章門主之

溺難痛口渴卒少腹脹欬逆嘔吐卒除腹脹痛不

可以候仰面無熱腹中痛身熱無痛行間主之

風眩善嘔煩滿脾庭主之如腹背脊上星主之取上

星者先取臍後取天隨風池

頭身風善嘔寒中少氣胃中熱解急嚴間使主

之

凡好太息不嗜食多熱汗出病至則善嘔嘔已乃

哀即取公孫及井倉實則脾中切痛腹面痛起心

在多數者則鼓腹中氣大寒熱不嗜臥蓋亂公

孫主之

嘔吐煩滿魂門主之

黃腫善久者下滿欬吐脾命主之

食飲者不能言通谷主之

寒熱頭痛如鼓日晡即發嘔逆煩滿嘔吐泄汗難言

或脾主之

肺氣熱呼吸不得臥上氣喘沫喘氣相迫沫留滿脅

膈急急難振振振振振振中有熱支滿不嗜食汗

不出腹脅痛脾命主之

氣痛輕小便黃氣滿寒則通滿身時寒欬逆逆難

康石門主之

脈經曰左手關前寸口陰挺者憂心脈也苦心下毒

張口中熱時者瘡口中傷爛利人大陽經治陽

左手關上陰挺者無肝脈也苦難新難言言下有

邪氣善吐刺足少陽經治陽

右手關上陰動者無脾脈也若少氣下利腹滿身重

四肢不欲動善嘔刺足陽明經治陽

千金方日刺門主日苦而嘔

脾經章門主背痛不得臥胃滿嘔無所出

章門主心痛而嘔

商丘商門通谷主喜嘔又云商丘主脾虛冷人病寒

不樂好太息多寒熱喜嘔

倉府靈藏神藏巨關主嘔吐胃滿

率谷主煩滿嘔吐

天客主欬逆嘔吐

胃脘解輸主嘔吐

曲澤主逆氣嘔逆

中庭中府主嘔逆吐食不遺出

石門主嘔吐

陽陵泉主嘔嘔汁心下憤憤

維道主嘔逆不止

少商勞宮主嘔吐

經骨主病熱欲嘔

大鍾太谿主煩心滿嘔

魂門歸關主嘔吐不住多逆

隱白主嘔中嘔吐不欲食

臍輸主吐食又交章門胃脘

巨關胃堂主吐食

頭維主嘔逆滿嘔沫流汗

燒戶中府主肺寒熱呼吸不得臥欬逆上氣嘔沫喘

俠白主欬乾嘔煩滿

少海主氣逆呼吸噎噎嘔

巨關主煩心喜嘔

百會主汗出而嘔症

商丘主寒熱好嘔

大椎主傷寒熱煩嘔

腎輸主頭身熱赤振悸腹中四肢淫淫欲嘔

臂澤主氣隔喜嘔腹脹不得汗煩心身痛

四肢寒熱腰膝不得便仰身黃腹滿食嘔者候胃氣

第十一椎上及左右各一寸五分三處各七壯

乾嘔灸心主尺澤亦佳

又方灸乳下一寸三十壯

又方乾嘔不止粥食湯藥皆吐不停灸手間使五十

壯若四肢厥脈沉絕不止者灸之使通此起死人法

吐逆嘔不得食灸心臍百壯

吐嘔逆不得下食灸今日食明日吐者灸臍臍百壯

吐逆不得下食灸胃堂百壯

吐逆不得食灸巨關五十壯

吐逆食不住灸胃臍百壯三報

吐逆飲食却出灸臍臍百壯三報

吐逆嘔汁吞酸灸神光百壯三報

吐逆霍亂吐血灸手心五十壯

噎噎嘔逆灸石臍百壯

臍臍骨滿嘔吐上氣等病灸上椎并兩乳上第二肋

間各七壯

胃中痛引臍背心下嘔逆而無微瀉灸臍門上隨年

脾中風者其人但臥坐而腹滿身重黃吐鹹汁出者

尚可治惡灸臍臍百壯服續命湯若目下青手足青

者不可復治

導引

古今醫聚曰嘔吐導引法正坐兩手向後捉腕摩肋

上下七息左右換手亦然除腹冷宿氣積胃口飲食

退逆吐逆不下

又法便臥展體兩手左露兩足膝以鼻內氣自極七

息除腹中食嘔

又法坐直舒兩腳以兩手挽兩足自極十二通急脇

胃不能受食吐逆以兩手直交兩足底脚痛舒以頭

性膝下自極十二通急脇胃不能受食吐逆

保生秘要曰吐酸導引法先念昔推開至極其於腎

虛想水升上頂門通下心頭以流之

傷食嘔吐導引法按實仰反候空心披衣起牀正身

直立雙手用力拿兩肘兩肘尖著地脚跟雙膝起倒

力替二九之數解飽勿令忌傷臟腑

醫案

衛生寶鑑內中書云承相史公六年旬有七卒元丁卯九月間因內傷自利數行覺肢體沉重不思飲食痔瘡閉塞舌苔不知味腹中疼痛頭亦痛而惡心胸以通聖散大劑利利服之覆以厚衣遂大汗出前證不除而反覺劇易數醫四月餘不愈予按金匱云燕命子治之予診視得六脈沉細而微按不欲食食即嘔吐中氣不調源干升降口舌乾燥頭目昏眩肢體倦怠足動冷臥不欲起不寐不飲酒肢體麻木又因內傷自利又復發汗是重竭津液脾胃愈虛不能滋榮周身百脉故使然也非甘辛大溫之劑則不能溫其氣經云脾欲緩急食甘以緩之又脾不足者以甘補之黃芪人參之甘補脾緩中故以爲君形不足者溫之以氣當歸辛溫和血調榮木香辛溫升降滯氣生薑益智草薤白薤仁辛甘大熱以湯中藥理其正氣白朮炙甘草橘皮甘苦溫厚陽胃榮養腸胃而和中神機辛熱導滯消食而爲佐使也右件咬咀一兩水煎服之嘔吐止飲食進越三日而證悉去左右侍者曰前證雖去九日不大便如何予曰水相牛高氣弱既利且汗脾胃不足陽氣虧損津液不周也豈敢以寒藥有導之劑下之仲景曰大溲溲後小便數大便堅不可用承氣湯如此雖內結宜以蜜煎導之須臾去燥屎一二下燥塊遂覺腹中空快上下氣調又以前藥服之喜飲食但有所傷則以橘皮枳木丸治導之其病乃得平復承相曰病既去矣當服藥藥以防其復來予曰不然但慎口節飲食食不可服藥大用藥則刑民有罪則刑之身有疾則藥

之無邪妄則良藥無病妄藥反傷正氣事志曰允當則雖服而舍之可也承相悅而然之奇效良方曰政和中心一人病傷寒汗汗身涼數日忽嘔吐來與飲食俱下不瀉者皆進一香薷香滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後熱留胃格其有邪湯正相當當急治藥之即則愈醫學正傳曰在城黃氏婦年將二十歲後因食傷致胃虛不納數四十餘日夫因穀氣則惡心而嘔則氣亦嘔求予治予曰藥不能入口又將何法以治之乎想求不已遂制一方用人參白朮茯苓各一錢甘草二分陳皮蒼朮砂仁各五分炒神曲一錢十粒以上陳倉米一合煎滾水一大白盞煮湯泡伏龍肝研細攪渾放澄清取一盞加薑棗同煎調藥至七分稍冷服此藥連納而不吐別以陳倉米煎湯時時服之日進前藥二三服漸能食粥而安後以此法治十餘人皆驗醫宗必讀曰長壽高元圃久患嘔吐問醫頗衆病竟不減余診之曰氣口大而軟此穀氣少而藥氣多也且多犯辛劑可以治表裏不可以治中虛可以理氣虛不可以理氣弱投以養平夏五錢人參三錢陳倉米一兩白蘆五錢甘肅水煎服二劑減十劑安

詳上醫按曰府厚沈文絕母食過熱香酸而嘔吐絕食服承運導劑加藥熱口乾流涎又食冬瓜一星而嘔吐愈餘余診此脾氣虛寒也急用鹽水煎于炒熱熨臍腹又令其子口氣潤其母神氣少附以參木附子陳皮枳朮丸如粟米大連服五七粒次日加至十餘粒漸服藥劑一二藥乃思飲食又以參木藥五十餘劑而愈

通作傷風頭痛及吐清水不均冬夏吃薑便止余作中氣虛寒用大君當歸黃芪木香炮薑而療連更部文卿嘔吐不止吐苦酸味氣口脈大於人連三倍連服此散劑予曰此食鬱上宜吐不須用藥乃候其吐清水無酸氣寸脈漸減尺脈漸復復草吐止至午脈復復初發自安

余年六十有七已卯春二月飲食後偶聞外言忤意嘔吐數水內熱作嘔飲食不進惟飲冷水氣口脈大而無倫面色青赤此胃中濕熱鬱木投之以藥入口即吐第二日吐穀物第七日吐酸水十一日吐苦水脈益洪大仍投冷水以黃連一味煎湯冷飲少許至二十日口白自伏至至二十五日加陳皮三十七日加當歸炙甘草至二十日始愈清熱飲水盡漸進清熱湯而得痊

婦人吞酸嘔酸嘔吐涎涎而色白或用一陳黃連枳殼之類如常煎作湯壯腹脹滿余曰此脾胃虧損未傷寒中不信仍作大治肢體腫脹如蠶食以六君加附子木香治之胃氣漸解飲食漸進大歸經又加補中益氣加炮薑木香枳殼平夏夏服數合

華湖徑傳持久患心腹疼痛每作必覺嘔吐酸逆