

壽世保元

卷之八

增補醫林狀元壽世保元彙集卷八

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周登亮元龍校

小兒科

小兒形色論

論歌脉十五條

夫小兒半週兩歲為嬰兒。三四歲為孩兒。五六歲為小兒。七八歲為韶兒。九歲為童子。十歲為稚子矣。小兒半歲之間有病當於額前眉端髮際之間以名中食三指輕手滿額按之。兒頭在左用右手。在右用左手。食指為上中指為中名指為下。若三指俱熱主感受風邪。鼻塞氣粗發熱咳嗽。若三指俱冷主外感內傷發熱吐瀉。若食中指熱主上熱下冷。名中指熱主夾驚食指熱主胸膈氣滿乳食不消。又要觀形察色。假如肝之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑。先要分別五臟形症。次者稟受盈虧胎氣虛實。明其標本而治之。無不可者。

◎入門審候歌

觀形察色辨因由。陰弱陽強髮硬柔。若是傷寒雙足冷。要知有熱壯皮求。鼻便如是瘡疹耳冷應如風熱症。渾身自熱是傷寒。上熱下冷傷食定。

◎觀形察色面目圖



左腮屬肝

右腮屬肺

額屬心

鼻屬脾

顏厲賢

眼胞絡屬脾

痒爛主風熱

眼烏珠屬肝

青主肝有驚

眼瞳人屬腎

不轉睛翳座

眼尾角屬心

紅主心有熱

眼白睛屬肺

白主肺受冷

◎觀面部

左腮屬肝。其色青者為順。白者為逆。若色赤。主肝經風熱。發熱徇急。青黑。主驚風腹痛。淡赤。主潮熱痰嗽。右腮屬肺。其色白者為順。赤者為逆。若赤色甚者。主咳嗽喘急。悶亂。飲水傳於腎。則小便赤澀。或淋閉不通。

額上屬心其色赤者為順黑者為逆若青黑主驚風腹痛痲癎啼哭微黃主盜汗頭髮乾燥驚悸骨蒸
鼻屬脾其色黃者為順青者為逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便閉而鼻燥衄血
頰屬腎其色黑者為順黃者為逆若色赤主腎與膀胱有熱而小便不通

●又

面赤心家熱 面黃脾有積 面白肺家寒 面青肝有風 唇赤心家熱 唇黃脾有積 唇白肺虛寒

唇燥脾有熱 眼赤心經熱 眼青肝有驚 眼黃脾有積 眼白肺有驚 鼻青主吐瀉 人中青感風

人中赤肺家 人中黑腹中 風池黃吐逆 山根紫傷驚 承漿黃主吐 唇紅面赤傷 臉青唇黑驚

唇青面白驚 面黃如土驚 痢下眉頭皺 驚風面頰紅 渴來唇帶赤 熱甚眼瞳瞤 面黃多食積

青色是驚風 面白多成瀉 傷寒色紫紅

●手指脉紋式

夫小兒三歲已下有病須看男左女右手虎口三關紋理兩手食指本節為風關中節為氣關第三節為命關其紋曲直不
同如紋只在本節病易治透過中節則病重過第三節則難治驚則紋青淡紅則寒熱在表深紅必主傷寒痘疹紋亂則
病久紋細則腹痛多啼乳食不消紋粗直射指甲必主驚風惡候紋黑如墨必困重難醫治此乃神聖工巧之一端也

●虎口三關脉紋圖

虎口又手處是也三關在第二指久看三節

第一節名風關第二節名氣關第三節名命關



●脉指歌

小兒食指辨三關男左女右一般看若知初氣中風候不是命門醫亦難要知虎口氣紋脉倒指看紋分五色紅黃女樂五

臟和紅紫依稀有損益紫青傷食氣虛煩。青黑之時症候逆。忽然純黑在其背。好手醫人心胆寒。若也直上到風關。粒米短長分兩端。如鎗衝射驚風至。分作枝叉有數般。弓反裡順外為逆。順逆交連順已難。又頭長短猶可救。如此醫人仔細省。初者掌心中有熱。便知身體熱相從。肚熱脚冷傷積定。脚熱額熱是感風。額冷脚熱驚所得。瘡疹發來耳後紅。孩子無事忽大叫。不是驚風是天動。大叫氣促長聲。謔吃熱毒悶心竅。急須吐下却和脾。若將嘔藥真堪笑。病後努氣眉頭皺。不努不皺腸有風。冷熱不調分赤白。脫肛因毒熱相攻。十二種痢何為惡。甚口刮腸大不同。孩兒有病不可下。不熱自汗兼自瀉。神困顯陷四肢冷。乾嘔氣虛神却怕。吐虫面白毛焦。穗府氣潮熱食不化。鼻塞咳嗽及虛痰。脉細腸鳴煩燥訝。方將有積與疏通。下了之時必生謬。孩兒實熱下無辜。面赤睛紅氣壯強。脉大弦洪肚上熱。肝腮喉痛尿如湯。屎硬腹脹腸肋滿。四肢浮腫夜啼長。遍體生瘡肚隱痛。下之必愈是為良。

●小兒脉理

小兒一歲變蒸已足。方有脉。自十口而生。于見小兒初生未滿月。手掌高骨之際。亦有脉急。吸吸而動。脉者氣血之波瀾。既生乃成人必有氣血焉。得無脉。但不有大人察其端的之至意也。

●小兒脉歌

小兒有病須憑脉。一指三關定息數。避冷數熱古今傳。浮風沉積當先識。左手人迎主外証。右手氣口主內疾。外候風寒暑濕侵。內候乳食痰積致。洪緊無汗是傷寒。浮緩傷風有自液。浮洪多是風熱感。沉細元因乳食積。沉緊腹中痛不休。弦緊喉間作氣急。緊促之時疹痘生。緊數之際驚風至。虛軟慢驚作癆瘵。緊實風癩發搐。擗軟而細者為疳蟲。牢而實者因便秘。脉兆大小便中血。虛濡有氣兼驚悸。滑主露濕冷所傷。弦急客忤君須記。大小不勻為惡候。二至為脫三至卒。五至為虛四至損。六至平和曰無疾。七至八至病猶輕。九至十至病勢急。十一二至死無疑。此訣萬中無一失。

●小兒五臟主病脉歌

心脉

心脉浮數驚與熱

傷暑焦喘明白訣

芤腸疝氣及盤腸

壅結口瘡小腑溢

心脉沉遲臟腑寒

肝脉

肝脉浮數疔主風

目赤翳膜又主筋

流淚出血眼生翼

或痒或痛怕羞明

肝脉沉遲主有寒

諸氣有冷痛難當

小便頻數腸中冷

下指端詳仔細者

或痒或痛怕羞明

肝脉沉遲主有寒

面青唇白眼喜張 諸病傳入慢風候 良醫仔細要參詳

脾脉 脾脉浮數熱痰涎 能食胃惡脾臟堅 滯頤口瘡停塵結 唇紅臉赤胃中熱 脾脉沉遲主風吹

更加吐瀉慢脾傳 氣虛胃弱不能食 滯頤嘔惡醒脾丸

肺脉 肺脉浮數主便血 傷寒咳嗽遍身熱 氣急痰盛或瘡疹 瀉痢潮熱大腑泄 肺脉沉遲主風寒

臟腑滑腸或洞泄 仍有咳嗽與痰涎 下根不足即無根

腎脉 腎脉浮數實有熱 偏墜膀胱痛又赤 口臭咬牙是腎驚 停身齒肉出鮮血 腎脉沉遲定有寒

臟腑停留入腎囊 偏墜膀胱尤不痛 光浮虛大最難當

●小兒死症真訣

黑色如懸針眼下虛醫也須怕 忽然腹痛鼻青時 不必更求醫 青色連目橫入耳 此候必知死 黑色繞口及連目 看者定不

足 黑色眉間也不良 十日必然亡 人中黑色入口來 孩子入泉埋 水腫之病準頭黑 報君腎氣滅 咳嗽切忌白入眉 肺絕

要君如孩子吐時鼻色白 命斷能再得 中風切忌面如妝 烏能得久長 目端無光兼直視 必定三朝死 更有腫人不動時

死候要君知 目似開如又不開 也是死之媒 口噤全然不進乳 此病終不起 瀉下之物如溺血 孤兒不得活 長吐不止止

又吐休要勞心 顧病久不食 更咬食 終與死為鄰 瀉利不歇歇又來 指目下泉台 小便艱難又大渴 畢竟難得活 大使用

藥全不通 扁鵲也無功 耳上生瘡黑斑出 醫人無此術 久嗽四肢皆逆冷 無由難得醒 體熱多應睡不醒 休要費精神 痘

疹出後熱不退 此候應為害 下糞青黑不止時 不覺見良醫 久瀉之後加燥渴 命必難得活 腹腫脹時氣又養 終久命不

甦

●小兒死候形症

大衝無脉滿口粘涎身出黑汗 舌縮生瘡 五心凸腫 瀉出黑血 丹毒遍身 瀉止又瀉 直視看人 面黑狂燥驚叫咬人 吐瀉不

止 魚口氣囊 鼻乾黑燥 忽作鴉聲啼哭 無淚 兩眼半開 四肢羸瘦 氣喘無烟 肚大青筋 四肢逆冷 汗珠不流 唇反舌縮 用

手撒入 搖頭動項 顛倒作坑 涎如牽鋸 拘腰凸肚 鼻內氣冷 患者皆死 已上並是死候 難以醫療 不可順情

●看兒眼法

小兒諸病。但見兩目無精光。黑睛無運轉。目眩無聲。如魚眼。猫眼之形。箇箇不治。或神藏於內外。若昏困者。無妨。其有病。而眼中神氣不脫者。可以活。眼者。五臟六腑神氣之所發。神氣已脫。脈雖僅存。亦未能保。

●相兒命短長法

兒初生。叫聲連延。相屬者壽。聲絕而復揚。急者不壽。啼聲散。不成人。啼聲深。不成人。臍中無血者好。臍小者不壽。

通身軟弱。如無骨者不壽。魚口長大者壽。自開目者不成人。目視不正。數動者。大非佳兒。汗血者多死。不壽。

汗不流。不成人。小便凝如脂膏。不成人。頭四破。不成人。常搖手足者。不成人。早坐早行。早齒早語。皆惡性。非。

佳兒。頭毛不周匝者。不成人。髮稀少者。強不聽人。不聽。額上有旋毛者。早貴。妨父母。兒生枕骨不成人。能言而死。

死。凡骨不成者。能偻而死。掌骨不成者。能匍匐而死。躡骨不成者。能行而死。臍骨不成者。能立而死。身不收。

者死。魚口短小者死。股間無生肉者死。頭下破者死。陰不起者死。陰囊下白者死。卵縫通達。黑者多壽。

●急驚

脈訣啓蒙曰。小兒脈促急為虛驚。直指云。浮數洪緊為急驚。沉遲散緩為慢驚。虎口脈紋青紫為驚風。紅者風熱。

輕。赤者風熱盛。青者驚積。紫者驚熱。青紫相半。驚積風熱。俱有主急驚風。青而淡紫。伸縮來去。主慢驚風。

紫絲青絲。或黑絲隱隱相雜。似出而不出。主慢脾風。形勢灣入裏者順。出外者逆。

夫急驚風者。因內有鬱熱。外挾風邪。心家受熱而積驚。肝家主風而發熱。夫木制在釜。火盛則金受剋。金衰不能平木。木能。

生火。火得風。則燭烟起。故子母縱橫。血亂氣併。痰涎壅塞。關竅不通。風火蕃盛。而不得泄。暴烈而成急驚也。其症牙關緊。

急。壯熱涎潮。竅視反張。搐搦擅動。唇口眉眼。眊引頻併。六脉浮數洪緊。治先搐搦。開通關竅。痰涎壅盛。以吐風散吐之。次。

用敗毒散。保命丹。或雄黃解毒丸。下之。驚退而神志未定。投安神散。但噴約不下。通關不嚏。眼眊及轉口中出血。兩足攪。

跳。肚腹搐動。或神緩而摸床尋衣。狂罵而晨昏氣促。心中熱痛。忽大叫聲者。不治。

噤驚散。半夏。牙兒。右等分為末。用豆許吹入鼻中。

一論小兒急慢驚風。發熱口噤。不省人事。手心伏熱。痰涎咳嗽。上壅喘急。並宜湧法。吐風散。全蝎。炒。一。

赤小豆。三十箇。右為末。每一散兒服一字。溫米飲調下。未吐再服。

瓜蒂。炒。十。

一論小兒急驚風初起發熱手足搐搦眼上視等症並一切感冒風寒頭痛發熱咳嗽鼻塞聲重及痘疹欲搐發搐並時行瘟疫等症宜加味敗毒散羌活獨活前胡柴胡白茯苓人參枳殼去穢桔梗天麻全蝎

姜薑白附子地骨皮川芎甘草右作一劑生薑三片水煎熱服

一論小兒急驚搐搦眼着口呆搐頭天行疫咳嗽熱服南極壽星湯膽星防風白附子蟬退薄荷甘草

右針水煎服

一小兒潮熱驚啼木通車前子赤茯苓麥門冬蟬退防風白芍甘草燈草水煎服

一小兒驚風咳嗽痰喘天南星一箇大者炮去皮為末每服一錢生薑三片水煎溫服

一論小兒胎驚內疳肚腹堅硬目睛上視手足搐搦用弓反張痰嗽喘熱一切急慢驚風並皆治之至聖保命丹

南星炮去皮用白礬水浸一宿再出晒乾再用生薑水浸一宿晒乾再炒半夏同上青黛薄荷各一全蝎去尾天麻白附子炒姜薑炒

防風鬱金甘草各五麝香許少朱砂五錢右為細末煉蜜為丸朱砂為衣每服一丸燈心薄荷湯送下

一論小兒痰喘急慢驚風至死但開口灌下無不活者用千金散內閣秘傳全蝎炙直薑各三朱砂四分

牛黃厘冰片天麻黃連各四分膽星甘草各二右為末每服五七釐薄荷燈心金銀煎湯不拘時調下

一論小兒驚風退後恍惚虛怯安神定志調理之劑安神散人參茯苓去皮遠志去心天麻白附子麥門冬

全蝎蓮肉茯苓去皮朱砂各等右為細末每服燈心湯調下

一小兒沉困發熱驚搐不乳視其脉紋如亂魚骨此風熱急驚之症也先用抱龍丸少許祛風化痰後用六君子湯加柴胡

壯脾平肝遂就退而驚定愈矣

一小兒癰癭啼叫額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君子湯加木香柴胡鈎藤鈎啼叫漸緩更加當歸又二

劑而安

一小兒目內色青發搐目上視叫哭不已或用牛黃清心丸不愈反咬牙頓悶小便自遺此肝經血氣虛甚故耳余用補中

益氣湯及六味地黃丸而痊

●慢驚

天慢驚風者。因外感風寒。內傷乳食。而作吐瀉。或得大病之餘。或誤吐下之過。脾胃兩虛。脾與肺母子也。母虛亦令子虛。而

生枯痰。胃虛則能生風。風能動能開。故其症目偏喜開。痰帶咽喉。如牽鋸狀。口鼻氣冷。唇緩面青。涎流口角。將復與飛。是

也。始宜祛風活痰。健脾生胃。不可妄用腦麝。色粉等藥。其有眼閉四肢厥冷者。名曰慢脾風。極危篤速。用回陽之藥。手足

漸溫。復以醒脾散理之。其脈約不勁。大衝脈尚有者。灸百會穴。但面黯神慘。魚口鴉聲。脾痛脇動。身冷粘汗。頭搖髮直。睛

定口瘡。喘逆。尺部唇縮。氣逆者不治。加味和中散。治小兒慢驚風。人參 白朮 去蘗各 白茯苓 皮 陳皮 各五

半夏 全蝎 炒 天麻 細辛 薄荷 甘草 右到一劑生薑薑煎服。乳母亦宜服之。

一論小兒吐瀉不止。作慢驚風。脾困昏沉。默默不食。宜醒脾散。人參 白朮 去蘗 白茯苓 皮 木香 全蝎 姜蚕

白附子 天麻 甘草 一方去天麻姜蚕。加泡南星。半夏麴陳倉米二石粒。水煎。旋熟服之。右到生薑三片。棗一枚。

水煎服。

一論慢驚。乃元氣虛損。而至昏憤。急灸百會穴。若待下痰不愈。而後灸之。則元氣脫散。而不救矣。此乃臟腑傳變。已極。總歸

虛處。惟脾受之。無風可逐。無驚可療。此因脾虛不能攝涎。而作痰也。此方常治慢驚。涎潮發搐。或吐或瀉。不思飲食。神昏

氣弱。宜用 紫金錠子 人參 白朮 去蘗 白茯苓 皮 山藥 炒 乳香 赤石脂 醋炒 辰砂 各二

麝香 錢 右為細末。以糕一兩為丸。如彈子大。金箔為衣。每一粒。薄荷湯研化服。

一 小兒嘔吐不食。手足搐搦。痰涎上壅。手足指冷。額黑唇青。此腎水勝心火也。用五味異功散。加木香炮姜。頓安。乃去泡姜

再劑而愈。

一 小兒潮熱發搐。痰涎上湧。手足指冷。左腮至申酉時。青中隱白。手足時搐。此肝經虛弱。肺經所勝。而朝搐。脾土虛弱。而手

足冷也。用補中益氣湯。以調補脾肺。用六味地黃丸。以滋補肝腎。而愈。蓋病氣有餘。當認為元氣不足。若用瀉金伐肝。清

熱伐痰。則誤矣。

一 小兒慢驚。睡多驚啼。凡面黃脈細者。難治。用此藥與乳母服之。釀乳法。木香 沉香 藿香 丁香 減 陳皮

人參 神曲 炒 麥芽 炒 右到每服四錢。紫蘇十葉。生薑十片。棗二枚。水煎。先令乳母食。後捏去宿乳汁。服之。即便卧。

雲時。令約入乳之脈。次令兒吮。不可過飽。亦良法也。五味異功散。方見 補中益氣湯。方見 六味地黃丸。方見

曾補專世錄元

慢驚風

○慢脾

慢脾之症面赤額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙床手足微搐不收或身或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二益由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰慢脾風若逐風則無風可逐療驚則無驚可療但脾間痰涎壅滯而然耳世所謂慢驚難療者慢脾風是也宜服 加味四君子湯 人參 白茯苓分三 蒼朮分三 炮乾姜分四 白朮分六 製附子分 羌活分三 炙甘草分四 石剉生薑三片棗一枚水煎服

一論慢驚慢脾危惡之症藥力不到者但看兩脚面中間陷處有大衝脉即灸有會穴三五壯炷如小麥大灸後仍與醒脾之劑調之

一論小兒慢風內虛昏迷不醒宜 加味大醒脾散 人參 白朮去土 白茯苓去皮 橘紅 丁香 木香 南星炮

全蝎去毒 天麻煨 白附子煨 山藥煨 石蓮肉去殼 石菖蒲 肉苳蔻 砂仁 甘草

一論小兒驚風後聲啞不能言及諸病後不能言 天南星一个炮去皮為末每半字五歲兒半錢猪胆汁調食前服

一論治慢驚慢脾之聖藥也一錠即有起死回生之功頃刻奏效故名回生錠真海上仙方也急驚亦効 回生錠

人參錢五 白朮去土 白茯苓去皮 懷山藥 桔梗各一 甘草錢三 膽星錢五 赤石脂煨五 辰砂錢二 乳香五分

蒙石煨金 牛黃錢一 麝香錢一 右為末五月五日午時取搗勻印作錠子食酒為衣陰乾每服三五分薄荷湯化下

○諸疳

脉訣啓蒙曰小兒脉單細為疳勞 虎口紋白色白色者為疳 夫疳者甘肥無節乳哺不調或賦稟怯弱血氣不足益十

五歲以前為疳已後為勞也書籍五疳病關五臟要亦脾家有一臟有積先治而防傳其餘也脾家病去餘臟皆已症雖

分乎冷熱治當以補為先宜用地黃丸五疳膏肥兒丸之類

一論小兒疳病面黃肌瘦肚大青筋大便色疳白小便渾濁或澄之如米泔此疳病也 消疳湯 山查 白芍炒

黃連炒 白茯苓 白朮去土 澤瀉各一 青皮四 甘草分三 石剉一劑姜薑煎服

一治小兒疳積發熱肚大青筋骨瘦如柴 消疳退熱飲 山查去土 烏藥 燈心 竹茹 檳榔尖 史君子煨

蕪荑仁 淮木通 黑牽牛 大黃 柴胡 莪木煨 枳殼去 黃芩 糖亭蔗 石剉水煎溫服

一論肝膽經熱毒癰癰。或耳內耳下生瘡。發熱潮熱。或肝經濕熱下注。囊癰便毒腫潰。或小腹脇股結核。凡肝膽經部分一切瘡瘍發熱並用之。
九味茶胡湯 柴胡 黃芩 人參 山梔 半夏 龍胆草 當歸 芍藥 甘草 水煎服

一論小兒肝疳。白膜遮睛。肝經虛熱血燥。或風客淫氣而患癰癰核結。或四肢發搐。眼目抽動。痰涎上壅。凡傷損出血多。抽搦發熱。入治腎府。腦熱消瘦。手足如冰。寒熱往來。清泄肚脹。口臭乾渴。齒齦清爛。爪黑面顴。遍身兩耳生瘡。或耳內出水。或發熱自汗盜汗。使血諸虛失瘡。或小便淋閉。咳嗽吐血。或咽喉燥痛。口舌瘡裂。或遺精不足。肢體瘦弱。解頰顴。即五遲五軟。或畏明下簾。或早近女色。精血虧耗。五臟齊損。凡屬腎肝諸虛不足之症。皆宜用此以滋化源。其功不能盡述。

六味地黃丸 懷生地黃 酒浸砂鍋內。磁碗盛。蒸到極黑。山茱萸 酒蒸去 乾山藥 各四 牡丹皮 去 白茯苓 去皮 福澤瀉 去毛 各 右忌鐵器。為細末。和地黃膏。如蜜煉為丸。如梧子大。每服三五十丸。空心白滾水下。

一治小兒五疳。潮熱面黃肌瘦。煩渴肚大青筋。手足如柴。精神困倦。歷試有效。無疾預服此藥。則諸疾不生。元氣虛弱者服半月。身體健壯。保嬰五疳膏 青皮 麩 炒二 橘紅 炒五 白朮 去皮 蜜水 炒一兩半 白茯苓 去皮 炒七錢 麥門冬 去心 史君子肉 炒七錢 山查肉 麥芽 炒五 金櫻子肉 各炒五錢 芡實仁 二錢 蓮肉 心 隔紙炒 甘草 右為細末。和勻。重七兩。每

次用約末一兩。煉蜜四兩。調成膏。每日中向晚間各服一二茶匙。溫水漱口。身熱咳嗽。加地骨皮百部。肚腹飽脹。大便稀水。腹鳴作聲。或蟲出。不知加檳榔。木香。稟受氣弱。加人參。仁。錢

一論消疳化積。磨癖清熱。伐肝補脾。進食殺虫。潤肌膚。養元氣。真王道也。肥兒丸 人參 三錢 白朮 白茯苓 去皮 各黃連 三錢 胡黃連 五錢 史君子 去殼 神曲 炒 麥芽 炒 山查肉 各三錢 甘草 炒三錢 蘆薈 二錢 半碗 或泥封固 用透 右為末。黃米糊為餅。白湯化下。或作丸。黍米大。每服二三十丸。看兒大小。米湯下。

●癖疾

夫癖塊者。嬰兒飲食失調。三焦關格。以致停滯腸胃。不得宣通。初得為積。久則氣血與痰裹積。塞於腹脇。及瘰癧縱飲生冷漿水。亦能成之。其症作痛。有時面黃肌瘦。倦怠無力。或生潮熱。寒熱是也。治先定去寒熱。次用消堅散結。和脾胃。益胃之劑。理之。更用灸法貼約久之自効。

一論小兒腹中癖塊。發熱增寒。口乾小便赤。或大便稀澀。或腹脹腫滿。或痰嗽喘熱。不思飲食。面黃肌瘦。四肢困倦等症。

諸症

淨府湯 柴胡錢 黃芩八分 半夏八分 人參三錢 白朮八分 白茯苓二錢 猪苓五錢 澤瀉二錢 三棱七錢

義木錢 山查肉錢 胡黃連三錢 甘草三錢 右剉一劑生薑三片 棗二枚 水煎溫服

一論小兒癰積日久不消元氣虛弱脾胃虧損肌肉消瘦肚大青筋發熱口乾肚腹脹滿 抑肝扶脾散 人參五錢 白朮

茯苓八分 陳皮六分 青皮六分 龍胆草酒洗 白芥子炒八分 柴胡三錢 山查八分 神曲六分 黃連三錢 胡

黃連三錢 甘草三錢 右剉一劑生薑三片 棗一枚 水煎溫服 黃龍丸 扶溝劉小亭傳 雄黃五錢 蜈蚣二條 砂鍋

足 蘆薈三錢 阿魏三錢 牛黃一分 天竺黃三錢 右為末化黃蠟一兩為丸如葉豆大先服七丸則熱退次服九丸則塊

消三服十一丸則病根除每用黃蠟煎雞子清入藥於內黃酒下 肥兒丸 方以 治癰疾如神

一專貼癰積氣塊身體發熱口內生疳此藥用狗皮攤貼患處每個重七錢貼三日止熱七日覺腹微痛十日大便秘下膿血

為駁大有神効忘生冷臺腥發物百日 神仙化癰膏 真香油二斤 秦光五錢 三棱五錢 黃丹一斤二兩水黃柏五

穿山甲十四 當歸三錢 義木五錢 全蝎十四 大黃三錢 蜈蚣五錢 木鼈子七錢 石將藥入油內煎黃色為度濾去渣

搗爛待用油冷時下黃丹用文武火熬槐柳條不住手攪黑烟起滴水成珠手試軟硬方可離火次下五味細藥並入搗

爛粗渣於內 真阿魏二錢 乳香五錢 沒藥五錢 麝香錢 皮硝三錢 攪勻以磁器內盛之如用坐熱水中鎔開不

可火上化如有馬刀櫃子瘡加琥珀一兩在內無不效驗

一將軍百戰百勝膏 貼癰如神 大黃 白芷各二錢 三棱 義木各一錢 木鼈子一錢 蜈蚣十條 穿山甲片十五 巴豆

一百五 草麻子一百五 梔子五錢 黃連五錢 槐柳條三百 香油二斤入藥熬黑色去渣濾淨再加黃丹一斤熬點

水成珠再加血蝎五錢 蘆薈五錢 天竺黃五錢 輕粉五錢 阿魏五錢 麝香五錢 胡黃連二錢 硼砂二錢 為末下油為膏

一治小兒癰疾發熱之甚及眼瞤方 明目化癰丹 牛黃一分 片腦一分 熊膽一分 麝香三錢 乳香三錢 石共為細末先

將乳汁於銅杓內炭火上滾黃色下前約急取出攪勻於油紙上丸如米粒大男左女右即時點入大眼角內合眼自化

頭上出汗至胸前第二九汗出劑上第三九汗至腋下再點二三九如腹痛下膿血自愈妙不可言 化癰金丹 內閣

秘傳 蟾酥水 黃蠟各二錢 羚羊角 牛黃各五錢 麝香三錢 巴豆肉錢 硃砂 冰片各二錢 右為末凡如菜子大

每用一粒用扁頭針在患處刺破皮入之用膏約貼之一伏時揭起其癰化膿血出盡服調理脾胃之藥而愈

一論小兒患癖年深不愈諸醫以攻剋殺伐之劑屢投不愈以致元氣耗傷脾胃損傷血氣乾涸肢體羸瘦面色痿黃肚大青筋身熱自汗喘急氣促世渴腹脹浮腫不思飲食遂以補中益氣湯久服而愈

●熱證

小兒之病惟熱居多夫熱有虛有實實則面紅目赤氣麤口乾燥渴小便赤澀大便堅閉五心煩熱日夜焦啼發壯熱宜大連翹飲主之虛則面白眼青氣微口中清冷恍惚神緩大便稀而小便煩夜則盜汗發虛熱宜惺惺散主之其有身體乍熱沸鬱驚惕上感下虛此冷熱不調候也如熱在表宜汗在裏宜下表裏俱熱則宜解散其或表裏已解熱又時來此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外不可再服涼藥必使陽斂於內身體自涼宜參苓白朮散主之又有潮熱則發熱有熱驚熱顛叫恍惚夜熱多發旦止餘熱寒邪未盡食熱肚腹先發熱消熱骨蒸盜汗壯熱一旬不止煩熱心燥不安積熱煩赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去不定癖熱涎嗽飲水寒熱發如瘧狀血熱已午時發熱瘡疹熱耳聾夫冷十六者大同而小異諸症得之各有所歸其間或有三兩症交互者宜隨其輕重而處治之蓋小兒氣稟純陽臟腑生熱陰陽氣變稟蒸於外致令身熱也若肝熱則兩眼赤痛流淚羞明或生翳障心熱則口内生瘡小便赤腫淋瀝不通肺熱則鼻衄不止大腑閉結脾熱則多涎沫口內長流心脾熱則身重舌古胃熱則作口臭腎熱則耳聾或出膿汁此五臟所生主熱各不同是不可以概論也大抵熱則生風風則悸矣

一論小兒心經邪熱心與小腸受感乃水竇之處常宜通利壅則結滑則利熱則澀盛則淋平涼心火三焦自順不待疾作而解證成而療者疎待有之矣一十五味加湯使用總覺溫熱客熱寒邪風邪官之肺經心將受之不受觸傳於小腸或閉或澀或赤或白淋瀝不通營衛不通壅之作疾其發多端以致胸熱眼目赤腫唇口白瘡津液不生涕唾稠盛須在表裏俱得其宜驚風悉能散之痰熱亦自消除連翹之功可謂大矣

大連翹飲 連翹 蘆麥穗 滑石 車前子 牛旁子 赤芍藥

各八分 柴胡 甘草 六一錢 荊芥穗 蟬退 石剉作一劑竹葉十個 燈草十莖 水煎服

山梔子 木通 當歸 防風 各四分 黃芩

一錢 柴胡 甘草 六一錢 荊芥穗 蟬退 石剉作一劑竹葉十個 燈草十莖 水煎服

一錢 柴胡 甘草 六一錢 荊芥穗 蟬退 石剉作一劑竹葉十個 燈草十莖 水煎服

風痰熱變蒸熱加麥門冬 實熱再熱加大黃 胎熱瘡疹餘毒加薄荷葉 痘疹毒熱加大黃芒硝

論小兒溫積熱毒唇口腫破生瘡牙齦出血口臭煩熱咽喉煩燥不寧並痘疹餘毒未解或頭面身體多生瘡癤宜

五

一論小兒溫積熱毒唇口腫破生瘡牙齦出血口臭煩熱咽喉煩燥不寧並痘疹餘毒未解或頭面身體多生瘡癤宜

橘化毒丸 犀角鎔三 桔梗一 生地黃浸 赤茯苓皮去 鼠粘子微炒各 粉草 朴硝各三 連翹 玄參各六

青黛錢 石為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸薄荷湯研化下兼有驚加朱砂為衣

一論小兒變蒸一症乃小兒蒸皮長骨變幻精神不須服約其有兼傷風咳嗽痰涎鼻塞聲重變蒸發熱宜服此方 惺惺散 人參 白朮去 白茯苓皮去 甘草炙 桔梗 白芍炒 天花粉 細辛 薄荷葉 石到每服三錢水煎溫服

●感冒

一論小兒感冒風或冒寒 用老葱三四根舂極爛以手抹來相搭滿掌烘溫暖向疾者遍身擦之通氣處再偏擦幾偏暖處出汗立愈又不相妨 出痘疹屢驗絕妙

一治小兒面青身冷默默不語用燈火遍身手足按穴爆之立醒

一論小兒傷寒頭痛壯熱惡寒咳嗽鼻塞聲重痘疹欲出發痛驚風喘嗽手足搐搦等症宜服 人參敗毒散 羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 白茯苓 川芎 薄荷葉 人參 甘草 石到姜蔥煎服

一論小兒風寒外感驚風內積發熱喘促咳嗽痰涎潮熱搐搦並痘疹初作 羌活膏 人參 羌活 獨活 前胡 川

芎 桔梗 天麻各五 薄荷 地骨皮各三 甘草錢 右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸薑湯研化下

一論小兒四時感冒傷風瘟疫身熱昏睡氣粗喘滿痰實壅嗽及驚風潮潮蟲毒中暑並瘡疹欲出發痛皆可服之壯實小

兒三五日服一丸可免驚風痰嗽等症宜 抱龍丸 南星為末八指月黃牛胆中 天竺黃 雄黃 辰砂研各 麝

香錢 右為細末煎甘草膏為丸如皂角子大每服一丸薄荷湯研化下有碎內者作三服或用臘雪水者甘草膏汁和

藥尤佳 按右方若風熱痰嗽或急驚發搐昏睡咬牙形病俱實宜用此方若初冒風寒咳嗽痰盛氣喘者屬客邪內作

也先用十一味參蘇飲若邪既解而腹脹吐瀉或發搐咬牙睡而露睛屬脾肺氣虛也用四君子湯加陳皮名異功散切

忌祛痰太散若過服而致前症者尤宜補溫脾肺 參蘇飲方見 咳嗽

●脾胃

一論小兒諸病因約攻伐元氣虛損脾胃衰敗惡寒發熱肢體倦怠飲食少思或兼飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴脉洪大

弦虛或微細軟弱右關寸獨甚亦堪用之大凡久病或過服剋伐之劑虧損元氣而諸症悉具之最宜此湯調補若無有

前症之兒為患者尤宜用之 補中益氣湯 黃芪蜜水 揀參各八分 白朮去油 當歸身酒洗各錢 陳皮 甘草各五分

升麻 此胡各二 右劉姜棗煎 空心溫服

一論小兒脾胃虛弱或因射代之過致飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實脾胃虛損吐瀉少食宜用 四君子湯 人參 白朮去油 白茯苓皮去 甘草各五分 右劉姜棗煎服 六君子湯 治脾胃虛弱飲食少思或大便不調

肢體消瘦面色痿黃即四君子湯加陳皮半夏

一論小兒脾胃虛弱吐瀉不食或驚搖痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有疾致兒患此者母亦當服之 異功散 人參 白茯苓皮去 白朮去油 甘草各五分 陳皮各等 右劉姜棗煎服

傷食

經云脉滑者有宿食也 虎口脉紋黃色為脾家有積 小兒脉沉者為乳不消 夫小兒傷食皆因乳哺不節過食生冷堅硬之物脾胃不能消化積滯中脘外為風寒所搏或因夜卧失盜以致頭痛身熱面黃目胞微腫腹痛脇脹足冷肚熱喜睡神昏不思飲食或惡食或惡心或嘔或噦或口噴酸氣或大便敗卵臭或氣短痞悶或胃口作痛或心下痞滿按之則痛此皆為陳積所傷也宜以萬應丸利之若食停於內或外入感寒邪者則人迎氣口俱緊或頭痛惡寒拘急兼前等症宜以太和散佐之葛氏曰乳者奶也哺者食也乳後不可與食食後不可與乳因小兒脾胃怯弱乳食易傷難以消化初得成積久則成癖成疳變為百病可不慎乎 萬應丸通治見 治傷食百病

傷食

一論內傷乳食肚腹脹痛外感風寒頭痛發熱宜服 太和丸 紫蘇 陳皮 香附 羌活 蒼朮 川芎 枳殼 山查 神曲炒 麥芽炒 甘草

一治小兒食積腹痛膨脹肚硬青筋 黑丑半生 檳榔各三錢 木香分五 右為細末每服五分赤砂糖調入滾水服立消

一論小兒時常傷食及黃肌瘦肚大腹脹用此焦餅令常食之 消食餅 蓮肉皮去 山藥炒 白茯苓皮去 芡實去殼 神曲炒 麥芽炒 扁豆 山查去 右各等分為末每四兩入白麩一斤水同和烙焦餅用

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃 啓脾丸 人參 白朮去油 山藥 白茯苓 蓮肉去心皮 山查各一兩 枳肉 陳皮 澤瀉 山查各五分 右為末煉蜜為丸如菜豆大每服三四十九空心米湯下小兒常患傷食諸症服之立愈

一論小兒傷食肚大腹脹用微酒小曲一枚為末打入雞子一個攪勻入鹽少許蒸熟食之每早服一次可數次而愈

一論健脾胃進飲食消滯積殺疳虫長肌肉乃保嬰第一方也保嬰丸臨川徐培鴻試驗人參錢白朮錢橘紅

肉錢三奇神曲錢三右共為細末用生荷葉包梗米煮熟去荷葉將米杵爛以淨布扭出再煮成糊為丸如麻仁大

或二十五丸或三十五丸或五十九丸陳米炒熟煎湯不拘時服

一小兒食積後咬牙欲吐頃間腹脹昏嘔鼻青黃赤此脾土傷而肝氣所動食積發厥也先令雞翎探吐出酸物頓醒節其

飲食勿藥而愈

一小兒好吃糝成腹脹痛用白酒曲末同黃連末為丸服之立愈

一小兒因停食腹痛服峻利之藥後患瘧日晡而作此元氣下陷以補中益氣湯治之千金肥兒餅小兒無病日常食

三五餅可防患於未然妙不可言

嬰孩恆闕乳飲食不消停脾胃一傷損吐瀉兩相併痰嗽加喘喘

腹脹吐青筋赤子焦啼叫慈母若傷情吾心懷幼切家蓮子茯苓

已上各四兩神曲麥芽陳人參史君子山查國老并六味每二兩白糯米二升藥米均為末

布裏甑內蒸白糖二斤半調和餅印成每食二三餅諸病即安寧肥兒王道藥價可擬千金

●吐瀉

大小兒吐瀉皆因本氣未完六淫易侵兼以調護失常乳食不節遂使脾胃虛弱清濁相干蘊然而作大概有冷有熱有食

積三者之不同也蓋冷者脾胃虛寒水穀不化小便白而大便青或如糖柏手足厥冷或吐或瀉宜助胃養主之如上之

症或兼有外感風寒內傷生冷身熱乍涼乍熱作吐瀉者宜霍香正氣散主之熱者脾胃有濕大便黃而小便赤口乾煩

渴四肢溫或吐或瀉宜甘露散主之上之候有兼中暑受熱作吐瀉者宜如金湯主之或益元散亦可食積者因傷食

過多積滯脾胃則肚脹發熱若吐如酸酸氣若瀉如敗卵臭宜萬應丸微利即愈利後不愈乃脾胃虛弱仍以助胃養主

之凡吐瀉初起即服燒針丸鎮固之即効大抵吐瀉之症多因乳食冒傷脾胃乳食傷胃則為嘔吐乳食傷脾則為泄瀉

吐瀉不止漸至日深導其胃氣之虛慢驚之候自此而得可不慎乎

◎吐瀉不治症

小兒瀉不止精神好者脾敗也

吐瀉唇深紅者內熱故也不退必死

面黑氣喘者不治

大瀉不定止之又瀉腎敗也

瀉瀉不覺必死

燒針丸

治吐瀉如神

黃丹水飛

朱砂

白礬水服各

右為末棗肉為丸如黃豆大每服三四丸

四九我針尖上放燈燭上燒過存性至爛涼米泔水調服瀉者食前吐者無時外用棗豈粉以雞子清和作膏以塗腳心如瀉塗額門上止則去之

一治脾胃虛弱吐瀉不食凡虛寒症先服此以正胃氣

五味異功散

人參

白朮

茯苓

陳皮

甘草

散姜棗煎服

一論小兒吐瀉脾胃虛弱飲食不進腹脹滿腸鳴吐瀉虛寒等症

助胃膏

人參

白朮

丁香

香砂仁

白豆蔻

肉豆蔻

官桂

薑香

甘草

陳皮

山藥

右為細末

煉蜜為丸如彈子大每服

一丸米湯化下

一論四時不正之氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛

霍亂吐瀉中濕身重泄瀉脾胃不和或飲食停滯後感外

寒頭痛增寒嘔逆惡心肋膈悶或發寒熱無汗

藿香正氣散

藿香

紫蘇

陳皮

厚朴

白朮

去芦

白茯苓

桔梗

大腹皮

白芷

甘草

右剉一劑

姜棗煎服

一論小兒夏秋之月霍亂吐瀉身熱口渴

加減如令湯

猪苓

澤瀉

白朮

赤腹苓

黃連

乾葛

天花粉

甘草

右剉生薑煎服

如熱勝加石羔知母

瀉極加升麻

腹痛加炒白芍

肉桂三

分寒痛亦加

一論小兒五種泄瀉赤白利疾宜用

鐵門栓

文蛤

白礬

黃丹

右為末

用黃蠟一兩

化開為丸

如棗

豆大每服大人十五丸小兒五七丸用茶一錢姜三錢煎湯下

小兒水瀉痢疾用蜜三匙

枯礬末三錢

蘿蔔汁調服出

微汗忌醋

一論小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻並不止津液枯竭發熱煩渴多燥但欲飲水乳食不進虛困失治變成慢驚風癇不問陰

陽虛實並宜服之。七味白朮散。人參。白朮煨。白茯苓去。藿香。木香。乾薑。甘草。右剉薑棗煎服。

如小兒頻瀉利將成慢驚。加山藥扁豆肉豆蔻各一錢。薑汁一錢煎服。若慢驚已作。加細辛天麻各一錢。全蝎二個。附子八

分。若小兒冬月吐瀉多是胃寒胃虛所致。加丁香一粒。若胃虛不能食而泄瀉不止者。不可用淡滲之藥。但胃元氣少故也。以白朮散補之。如不能食而渴者。倍乾薑加天花粉。如能食而渴者。白虎湯加人參。

一論小兒嘔吐不止宜。金棗丸。木香。半夏。南星湯泡遠其汁。丁香。陳皮各二錢。砂仁。藿香各五錢。人參一錢五分。

右為細末。姜汁打糊和成錠。辰砂為衣。淡姜湯送下。

一論小兒久瀉又痢不止及滿口生瘡。白爛如泥。痛哭不已。諸醫罔效。巴豆去殼。瓜子仁各。燒紙錢一。共搗一處如

泥。津調貼在兩眉間。豆巾待成泡揭去即愈。

一論小兒泄瀉。用巴豆汁末為膏。貼在臍門上。燒線香一炷。火盡即去。巴豆立效。

一小兒泄瀉不止。用山藥炒為末。不拘多少入粥同粥食之立止。

一小兒久瀉。兼脫肛。小腹重墜。四肢浮腫。面色青黃。時或兼青。諸藥到口即嘔吐。兼乳母憂鬱傷脾。大便不實。先用補中益

氣湯。後用五味異功散。及四神丸。調治其母。不兩月而子母俱痊。

一小兒傷食嘔吐。服射代之藥。嘔中見血。用清熱涼血之藥。入大便秘下。血唇色白。而或青。問其故於余。余曰。此脾土虧損。肝

木所乘而然也。令空心用補中益氣湯。食遠用異功散。以調補中氣。使涎血各歸其源而愈。

一小兒吐瀉不止。或取轉過多。四肢發厥。虛風不省人事。用此四肢漸煖。神識漸省。益陽散。天南星為末。每服三錢。入

京棗二枚同煎溫服。

一治小兒吐不定。五倍子兩箇。一生一熟。甘草二握。用濕紙裹炮過。同為末。每服半錢。米泔水調下。

痢疾

小兒八痢者。乃饑飽勞役。風寒暑濕。因觸冒天地八風之邪而得。故以命名痢也。大抵多由脾胃不和。飲食過度。停積於脾

胃不能消化。又為風寒暑濕干之。故為此疾。傷熱則赤。傷冷則白。傷風則純下青血。傷濕則下如豆汁。冷熱交並。赤白兼

下。若下迫重。重急窘迫。急痛者。火性急速。而能燥物故也。或夏末秋初。忽有暴折於盛熱。無所發散。奪肌膚之中。發