

307.25

22

2449

2546

瘍醫準繩  
二之三

疔瘡

# 疔瘡

疔瘡者以其瘡形如丁蓋之狀而得名皆生頭面四肢發黃疱中或紫黑必先癢後痛先寒後熱凡人一二日間惡寒發熱四肢沉重心悸眼花頭疼體痛稍異如常之證須宜徧身尋認如有小瘡與嘗患之瘡稍異卽是疔也大抵起紫疱者多起堆核者少發於手上者多發於別處者少生兩足者多有紅絲至臍生兩手者多有紅絲至腋生脣面口內者多有紅絲入喉以鍼刺瘡不痛無血是其候也經云膏粱之變足生大疔大抵多由恣食厚味卒中飲食之毒或感

四時不正之氣或感蛇蟲之毒或感疫死牛馬豬羊之毒或人汗入肉而食之皆生疔瘡各宜審而治之若嘔逆直視譫語如醉者不可治矣又有內疔一證與外疔之證大同但瘡形不現過數日間有一處腫起者卽是內疔所發之處但腹痛甚者便須作內疔治之不可緩也緩則殺人 華元化云疔有五色屬五臟紅屬心發於舌根青屬肝發於目下黃屬脾發於口脣白屬肺發於右鼻黑屬腎發於耳前以種類言之千金方外臺秘要神巧萬全方皆稱一十三種殆不止也 麻子疔狀如麻子而稍黑四邊微赤多

痒少痛忌食麻子油衣麻衣并入麻田中行穿麻布  
人 火疔發於頂門或發於面身熱如火狀如湯火  
燒灼瘡頭有黑靨四邊煙焰又如赤粟米忌火灸燒  
鍼烙 脾疔生於脣四白 眉疔生於眉 髭疔生  
於髭中 龍泉疔生於脣上 虎鬚疔生於脣下  
魚尾疔生於眼角外 顴骨疔生於顴骨上亦名赤  
面疔其狀色白頂陷如錢孔鼻有紫色者大凶 耳  
疔生於耳中亦名黑疔連腮赤腫 鼻疔生於鼻內  
痛引腦門不能運氣鼻如大瓶黑色者不治 頰疔  
生於面頰骨尖高處 氣疔形如氣泡感怒而生

腐疔色白有皰三日內頂陷狀如初灸瘡因夏月造豆腐時人汗滴於內食之而生忌食豆腐 鬼疔因中陰邪之毒而生 瓜藤疔延蔓無數忌瓜田中行石疔皮肉相連堅韌如石刺之不入肉微痛忌砂礫 鹽膚疔大如匙面四邊皆赤有黑點如粟粒起忌食鹹物 水洗疔狀如錢形或如錢孔瘡頭白裏黑靨汁出而中韌極癢透骨搔則快然忌水洗渡河及飲漿水 浮漚疔其狀圓曲少許不合長而狹如薤葉大內黃外黑黑處刺不痛黃處刺則痛 三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日

生一明日二後日三乃至十若滿三十六藥所不能  
治未滿者可治俗名黑炮忌嗔怒畜積愁恨 豬疔  
形圓而小瘡口內有油 羊疔形長而白色 牛疔  
形圓而小瘡內無油炮起搯不破有寒熱 狗疔色  
赤而長或帶尖與牛疔同無忌不殺人 驢馬疔其  
狀三角頂上有黑點根脚有赤色或突起 水疔狀  
如水泡因飲隔宿水而生忌飲水 臍疔生於臍  
脇疔生於脇 刀鏃疔狀如薤葉長寸許肉黑如燒  
烙忌刀鍼 暗疔生兩腋下而無頭但腋下堅鞭四  
肢拘急寒熱大作陰囊腫痛睪丸附生突兀如疔寒

熱併作亦名暗疔 寸疔生手指骨節間 虎口疔

生合谷穴 魚臍疔狀如魚臍 茱萸疔中凹邊突

蛇眼疔頭黑皮浮形如小豆狀似蛇眼忌惡眼看

并嫉妒人見之及觸毒藥 紅絲疔一名血箭疔一

名赤疔一名紅演疔生於舌根下或生頭面或生手

足骨節間其證最急宜迎其經刺出惡血則愈稍遲

毒氣攻心嘔噦迷悶者死若絲近心腹者就於絲盡

處刺出惡血更挑破初起瘡頭以泄其毒 芝麻疔

走注不定徧身疼痛不能轉側 爛疔潰出膿水大

如匙面色稍黑有白斑忌沸湯熱食爛物 雌疔瘡

頭稍黃向裏黯亦似灸瘡四面皸漿起心凹色赤大  
如錢孔又有一枚在他處以水啜之則見大忌房事  
雄疔其狀頭黑黯突起四畔仰皸漿起有水出色  
黃大如錢孔忌房事 黃疔有眼在皮發如齒齧之  
色手足麻木涎出不語者死 黑疔狀如黑皸 櫻  
桃疔狀如櫻桃 蛇頭疔生手指頭兩旁狀如蛇頭  
甚腥穢紫黑色痛引心有潰爛脫落者 足面疔狀  
如粟米痒極入骨急隔蒜灸之 大抵如豆如曰如  
箔金如茱萸如石榴子或發疹搔破而青黃赤色汁  
出或衣物觸着而疼痛忽生或白而腫實或赤而浮

虛其狀不一初覺頂不起者急隔蒜灸之灸而有皖者吉無皖者凶服汗劑得汗則生無汗則死刺出紫血者危出黑血者死 緩者一日瘡頂皖色微白二日皖色大白三日色微紫四日色真紫皆緩之候也 急者五日色微青小緊六日色深青大緊七日色黑其形如魚臍或如灸瘡之狀皆急之候也 凡生疔瘡身熱頭疼手足溫和飲食如常疔之四圍赤腫名曰護場可治 凡生疔瘡眼白睛凝不轉渴欲飲水內熱瘡盛唇舌青臥牀不能起五心腫頭暈眼花氣粗食不進脈伏譫語惡心腹痛冷汗出手足冷滑

泄無度疔之四圍無赤腫名曰不護場不可治 瘡  
證急者有應如生一疔之外別處肉上再生一小瘡  
卽是有應可用鍼挑破護場瘡口圍有赤腫生多瘡  
者謂之滿天星飲食如常頭痛身熱手足溫 瘡證  
凶者無應別處肉上無瘡不護場疔四圍無赤腫腹  
痛甚者有內疔若毒入心腹眼黑如見火光煩悶嘔  
逆恍忽癡眠瞳人不動赤脉貫睛胸脇赤腫瘡陷不  
起發皆死候也 凡疔瘡必有紅絲路急用鍼於紅  
絲所至之處出血及刺疔頭四畔出血若鍼之不痛  
或無血者以鍼燒紅頻烙患處以痛爲度若下部所

患多宜隔蒜灸之痛則灸至不痛不痛則灸至痛若  
灸之而不痛者宜明灸之及鍼疔四畔出去惡血却  
以稜鍼深刺破疔頭瘡口用海馬拔毒散敷之或雄  
礬丹敷之待疔四圍發黃胞浮腫知痛爲佳若疔未  
發用火鍼四畔亂刺如有紅絲脈盡處亦以火鍼三  
向刺斷<sup>①</sup>——如此樣刺了卽敷藥若疔不痛不發  
者用艾火於疔瘡上灸之三壯候瘡邊起黃胞發後  
方可貼膏藥凡疔腫皆刺中心至痛又刺四畔令出  
惡血去血傳藥藥氣入鍼孔佳若不鍼透瘡內不得  
力也若起紫疱初然切不可鍼破服藥趕出胞自破

出血水爲妙若服藥炮又不破方以鍼挑破無妨若起紫皰腫痛者以萬病解毒丸外塗內服若成膿不乾者以米醋調鐵鏽塗之自然凸出膿水卽乾一多有患此不覺而暴死者用燈照看徧身有小瘡卽是疔毒宜灸瘡處候甦更服敗毒藥并追疔奪命湯若內疔之證用化毒丸置舌上含化出涎或只用蟾酥一粒重者二粒置病人舌上含化化後良久用井水漱去毒涎爲妙若牙關緊急及喉內患者並宜含蟾酥丸或朱墨丸良久用井水漱去更宜服二丸少停又服二丸又服奪命丹或雄黃丸通利一行得利爲

度又用霹靂火汗之再用前藥調之或初生一箇次  
生二個逐漸流注者急將初生者用鉄筒拔毒膏點  
破消蝕惡肉卽不流注却以油髮蚰退土蜂房皂角  
刺各另燒存性等分白芨減半爲末揆之以平瘡口  
此卽前所謂三十六疔者也其魚臍疔瘡頭深黑破  
之黃水滲出四畔浮漿其毒尤甚通用前法及服萬  
病解毒丸以清心行血 治法表實者宜解表以荆  
防敗毒散追疔奪命湯初發之時必發熱身疼此乃  
毒氣在表故發表則毒從毛腠而出 裏實者宜攻  
裏以救命追黃湯連翹攻裏散表證皆罷毒氣入裏

口渴便秘毒在內也故攻裏則毒從臟腑而出表

裏俱實者宜解表和裏以化毒消腫和裏散加紫河  
車獨腳蓮紫金藤苦花子其證發熱身疼口渴便秘  
乃表裏俱見故攻發並用也腫勢盛脉浮數者宜

散之蟾酥丸返魂丹毒勢盛脉沉實者宜下之奪

命丹萬病解毒丸無表裏證服散毒消毒藥後以

復元通氣散加麝香少許虛弱人以五香連翹湯

合十宣散稍虛者只以人參敗毒散

按五香連翹湯乃溫熱走竄之

藥既是虛人豈其所宜當用薛氏法爲長

疔毒拔出用金銀白芷散十

宣散調理未潰者不須此藥初發惡寒發熱或拘

急或頭疼或寒熱交作或肢體重痛或大便秘結宜以敗毒散加防風荆芥連翹黃芩青木香金銀花天花粉大黃生地黃若無惡寒但發熱者可服劫瘡消毒散十神散萬全散若表證皆罷毒氣入裏者可用雄黃丸 怯弱之人不可用峻利藥攻之宜隔蒜灸五十壯以人參敗毒散數劑若生道遠位僻之處非峻利則藥力不到若以峻利則胃氣先傷虛虛之禍有所不免不若灸之爲宜 疔瘡四畔紅赤漸散開闊走允不止此名疔瘡走黃宜以通聖消毒散通利兩三行次去大黃朴硝調理而愈或解毒消瘴散亦

可用之有效此宜作瘴氣治之無誤 疔瘡腫硬脈  
數煩躁喜冷口渴便秘宜以連翹攻裏散壹服次用  
蟾酥丸若兼有表邪者以荆防敗毒散加金銀花天  
花粉大黃連翹脈實有熱更加黃連黃芩或只加苦  
花子退熱治瘴之妙藥也 若因剝割疫死牛馬豬  
羊脅悶身冷遍體俱有紫泡此疔毒也急灸泡處良  
久遂甦卽以人參敗毒散加防風荆芥投之 若忽  
然惡寒作嘔肩臂麻木手心瘙癢遂脅悶不自覺知  
但有一泡此疔毒也急灸五十壯而甦又五十壯知  
痛投以荆防敗毒散而愈古人謂暴死多是疔毒急

用燈照徧身若有小瘡紫泡異常者卽是急灸其瘡  
但是胸腹溫者可救 若因開割瘡死牛馬猪羊之  
毒或食其肉致發疔毒或在手足或在頭面或在胸  
腹或在脇肋或在背脊或在陰胯或起紫泡或起堆  
核腫痛創人發熱煩悶頭疼身痛骨節煩疼先用天  
馬奪命丹次用四神丸解毒消瘡散次以七神散又  
以萬病解毒丸劫瘡消毒散兼服朱墨丸并用祛瘡  
散多用毛屎梯根磨水服或仙人薯根磨水服如不  
熱磨酒服大熱不退者宜用退熱消毒飲又要以瘡  
瘡散箍住不使走黃又以洗瘡散淋洗次以刷瘡散