

欽定四庫全書

子部

名醫類案卷九



北京中医药大学图书馆版权所有

名醫類案卷九

齊肅

林

為執
胃
胃
胃

明 江瓘 編

不能食洩遺血衆醫以

脫而不能寐召翁診其

則脾胃俱受傷耳所以

沉右寸過左一倍兩關

弦濇尺反盛蓋煩勞不勝則逆鬱而不通不通則不能升降而作臍脹臍脹則不食肉沸而不下則關橐閉而洩且不輸故洩遺血乃和以八補之劑兼五鬱之藥不數日而愈越三月復作如前治立除

此案重見第四

卷腫
脹門

陝人高文病淋一日口噤厥逆

見症奇一日之淋而口噤厥逆耶

他醫

以為風翁曰誤矣此熱客膀胱故難洩耳投以八正散二服而洩大行病且愈所以知文之病者診其脉

尺沉而大按之而堅知病之在下也膀胱者津液之府氣化則能出此蓋由於熱淋而更接內故移熱於膀胱而使洩難也

東垣治一人病小便不利目睛突出腹脹如鼓

非鼓脹因小便

不出而脹膝以上堅硬皮膚欲裂飲食且不下服甘淡滲

泄之藥皆不效李曰疾深矣非精思不能處思之半夜曰吾得之矣內經有云膀胱者津液之府必氣化乃能出焉今服淡滲之藥而病益甚者是氣不化也

啟元子云無陽則陰無以生無陰則陽無以化甘淡

氣薄皆陽藥獨陽無陰其欲化得乎明日以滋腎丸

羣陰之劑投之再服而愈

方見
升溪

長安王善支病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅

塞之極腿脚堅脹裂出黃水雙睛凸出晝夜不得眠

飲食不下

獨為
關

痛苦不可名狀伊戚趙謙甫詣李求

治視歸從夜至旦耿耿不寐究記素問有云無陽則

陰無以生無陰則陽無以化又云膀胱者州都之官

津液藏焉氣化則能出矣此病小便癰閉是無陰而陽氣不化也凡利小便之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥陽中之陰非北方寒水陰中之陰所化者也此乃奉養太過膏粱積熱損北方之陰腎水不足膀胱腎之室久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦非膈上所生也獨為關非格病也潔古云熱在下焦填塞不便是關格之法今病者內關外格之病悉具死在旦夕但治下焦可愈隨處以稟北方寒水所化大

苦寒之味者黃柏知母桂為引用丸如桐子大沸湯下二百丸少時來報服藥須臾如刀刺前陰火燒之痛溺如瀑泉湧出卧具皆濕床下成流顧盼之間腫脹消散李驚喜曰大哉聖人之言豈可不遍覽而執一者也其症小便閉塞而不渴時見躁者是也凡諸病居下焦皆不渴也

非先生不能道此語

二者之病一居上焦

在氣分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有濕

故不渴也二者之殊至易別耳

治下焦

羅謙甫治劉太保淋疾問曰近夏月來同行人多有淋
證氣運使然抑水土耶羅曰此間別無所患獨公所
有之殆非氣運水土使然繼問公近來多食何物曰宣
使賜木瓜百餘對遂多蜜煎之每客至以此待食日
三五次曰淋由此也內經曰酸多食之令人癰凡治小便
不利不奪飲則已曰醋味致淋其理安在曰小便主
可用酸氣經云酸入于胃其氣濇以收上之兩焦弗能出入
也不出則留胃中胃中和濕則下注膀胱之胞胞薄

以懦得酸則縮踈約而不通水道不行故癰而潰乃作淋也果如言而愈

黃明之六月中小便淋莖中痛不可忍相引脇下痛以川練子生甘草一錢元胡索七分人參五分茯苓四分琥珀澤瀉柴胡當歸稍各三分作一服名曰參苓琥珀湯用長流水三盞煎至一盞溫服空心食前大

效

此方可法

中書右丞合刺合孫病小便數而少日夜約至二十餘

行臍脹腹滿腰脚沉重不得安卧至元癸未季春羅
奉旨治之診視脉得沉緩時時帶數常記小便不利
者有三不可一驟而論若津液偏滲於腸胃大便泄
瀉而小便澁少一也宜分利而已若熱搏下焦津液
則熱濕而不行二也必滲泄則愈若脾胃氣澁不能
通利水道下輸膀胱而化者三也可順氣令施化而
出也分利滲泄順氣三
法治之不可不記今右丞平素膏粱濕熱內蓄
不得施化膀胱竅澁是以起數而見少也非滲泄分

利則不能快利遂處一方名曰茯苓琥珀湯內經曰
甘緩而淡滲熱搏津液內蓄臍腹脹滿當須緩之泄
之必以甘淡為主遂以茯苓為君滑石甘寒滑以利
竅猪苓琥珀之淡以滲泄而利水道故用三味為臣
脾惡濕濕氣內蓄則脾氣不治益脾勝濕必用甘為
助故以甘草白朮為佐鹹入腎鹹味下泄為陰澤瀉
之鹹以瀉伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行以
辛散之桂枝味辛散濕潤燥此為因用故以二物為

使煎用長流甘爛水使下助其腎氣大作湯劑令直

達于下而急速也

此方尤妙于五苓散五苓散加滑石琥珀君臣佐使用法不同

兩

服減半旬日良愈

丹溪治一老人因疝疼二十年多服蒼朮烏附等藥疝

稍愈又患淋十餘年其間服硝黃諸淋藥不效忽項

右邊發一大疽連及缺盆不能食淋痛愈甚叫號困

憊時當六月脉短濇左微似弦皆前烏附積毒所致

凝積滯血蓄滿膀胱脉澁為敗血

濇為血虛而斷為敗血亦合症而云

短為血耗忍痛傷血叫號傷氣知其溺後有如敗膿

者詢之果然遂先治淋令多取土牛膝根莖葉濃煎

湯行瘀并四物湯大劑與三日後痛與敗膿漸減五七

日淋止瘡勢亦定蓋四物能生血也但食少瘡未收

斂用四物加參芪白朮熬膏以陳皮半夏砂仁木香

煎取清汁調膏與之遂漸能食一月瘡安

先行瘀生新後調元

補胃行氣開痰故曰非

開痰不足以行氣也

一人小便不通醫用利藥益甚脈右寸頗弦滑此積痰

在肺肺為上焦膀胱為下焦上焦閉則下焦塞如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉以藥大吐之病如失

一婦脾疼後大小便不通此痰隔中焦氣聚下焦二陳加木通煎服再一服探吐之

沈宗常治黎守溺不下或竄以藥益閉常曰結絡不解痰成癖法當吐果吐而洩如故

孫琳路鈴本殿前司健兒善醫寧宗為郡王病淋日夜

凡三百起國醫罔措有薦之者光宗時在東宮亟召之至孫求二十錢買大蒜淡豉蒸餅三物爛研合和為丸令以溫水下三十丸且曰今日進三服病當退三分之一明日再進如之三日則病除已而果然奏官右列或問其說孫曰小兒何緣有淋只是水道不通利蒜豉皆通利無他巧也

滑伯仁治一婦病艱於小溲中滿喘渴一醫投以瞿麥梔苓諸滑利藥而秘益甚診其脉三部皆弦而瀉曰

經云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣所

謂水出高源者也臃中之氣不化則水液不行病因

於氣徒行水無益也法當治上焦乃製朱雀湯朱雀湯

雄雀肉一隻 赤小豈一合 人參一兩 赤茯苓

一兩 大棗肉一兩 小麥一兩 紫石英一兩

紫苑五錢 遠志五錢 丹參五錢 甘草三錢

和勻為粗末每服三錢水煎食遠溫服 河間朱雀丸

茯神二兩 沈香五錢

硃砂五錢 參湯下 倍以枳桔煎用長流水一

飲而洩再飲氣平數服病已東垣案渴此案不渴分在氣在血合前東垣案

看之方

知其妙

一婦年六十餘病小溲閉若淋狀小腹脹口吻渴診其脉沉且澁曰此病在下焦血分陰火盛而水不足法當治血血與水同血有形而氣無形有形之疾當以有形法治之即以東垣滋腎丸服之而愈

兩案一弦而澁一沈

而澁以渴者屬氣分不渴者屬血分

韓悉治一人淋素不服藥教以專啖粟米粥絕他味旬餘減月餘痊

虞恒德治一老人年七十秋間患小便不通二十餘日