

片玉心書 卷之五

王九如



萬氏秘傳片玉心書卷之五

王九如

羅田密齋萬全

著

孫通之萬全刻

瘡疾門

王雅慶章

瘡疾治法有二新瘡先截後補久瘡先補后截

凡瘡要分早晚治之如上半日發者此邪在陽分氣

位也先用平胃散加常山草果截之後用平瘡券

脾丸調理而安如下半日發者此邪在陰分血

位也輕者以四物湯加桂枝桃仁紅花發出血中

寒邪甚者以小柴胡湯加升麻當歸提到兩分然
后以小柴胡湯加常山草果截之零愈以平瘧養
脾丸調之而安
如瘧來寒多熱少者以平胃散加常山桂枝草果仁
截之熱多寒少者以白虎湯加常山草果青皮截
之寒熱相半者用小柴胡湯加常山草果截之后
以平瘧養脾丸調之如大入以補中益氣湯調之
以上數症皆先截后補也
如久瘧連綿不退者或二三日一次其邪已深不可

妄用截藥只以平瘡恭脾丸調之有汗要无汗无汗要有汗其瘡易退再要避風寒禁雞魚冷水无不安者如犯禁戒維九轉靈丹亦難治也

凡瘡後轉作痢症者此症多得于夏末秋初因内有伏阴多傷生冷故也當從虛治不可妄用通利之

藥如平常下痢者以香連丸米湯送下

如瘡痢併作者以平瘡恭脾丸橘皮和中丸相間之服

如瘡后遍身浮腫者此因汗后受風故也以胃苓丸加五加皮大腹皮灯心長流水煎湯治之大兒加

戒胃苓湯治之外用浴法于日當午時向避風處
以溫水拂拭遍身畧睡一時以被蓋之微汗為度
每日依此行之為妙甚効
如瘧后腹脹或喘或不喘者此因內傷生冷脾肺俱
病故也蓋脾主脹喘屬肺以痛氣丸消脹以葶藶
丸定喘治之后以集聖丸調之
如瘧后腹中有痞者此瘧母也因多食冷水所至亦
有熱而瘧者治以月蟾丸主之
凡瘧后形體黃瘦者只以集聖丸調之

平胃散 此治濕養脾之藥也

蒼朮 米泔浸炒 厚朴 姜汁炒 陳皮 二 甘草 一 加

常山 三 草果 三 姜朮引

四物湯 見痢 此藥性平治血不足之至藥也

桂枝湯 此發散風邪之藥也

桂枝 赤芍 甘草 姜朮引

小柴胡湯 此半表半裏之藥也

柴胡 二 黃芩 一 半夏 七 人參 七 甘草 五 加山枝

丹皮名加味小柴胡湯 姜朮引 心中飽悶加

枳壳桔梗 痞滿加黃連枳實 瀉加知母石膏

內熱甚錯語心煩不得眠者合解毒湯

白虎湯 此藥性寒所以治熱也

石膏 知母 粳米 甘草 水煎服

以上諸方截瘧必用常山草果者蓋此二味乃治

瘧必用之藥也

補中益氣湯 此補中氣不足之聖藥也

黃芪 人參 甘草 柴胡 升麻 白朮

當歸 陳皮 水煎姜枣引 有汗用白朮無汗

用蒼朮治瘧加青皮

加減胃苓湯 此滲利之至藥也

朱苓 澤泄 赤茯苓 白朮 官桂 五加皮

蒼朮 陳皮 厚朴 甘草 木通 大腹皮

防風 生薑皮 灯心 姜引 取順流水煎服

平瘧養脾丸

歸身 人參 陳皮 去穢各一 黃芩 二 草果仁 一

南星 炮一 白朮 五 白茯苓 一 柴胡 五 甘草 炙五

共為末米糊丸如黍米大竹葉炒米湯下一方加

常山

黃芪

鱉甲

醋炙
黃色

月蟾丸

木香

人參

黃芪

當歸

桔梗

史君子肉

黃連

山稜

枳實

莪朮

鱉甲

炙
苦練根皮

乾蟾

燒
性

存

柯子肉

夜明砂

綠丸

各
分

共為末

醋糊丸

陳米湯下

祖傳

治瘡之法

以斬

鬼丹

截之

胃苓丸

調之

常用

胃散

加常山

草果為末

每服

一字

于臨

癸日

五更

用桃柳枝

七根煎湯

調服

治大人痲疾方

人參

五

常山

三

酒炒

十

楨即

三

草果仁

四

菜豆粉

炒

炒

甘草炙

貝母

三

青皮

五

冰煎服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

又方

常山

楨即

一

當歸

一

蒼朮

一

甘草

一

陳皮

一

一

一

一

一

一

一

先一服用酒搗

細滾酒泡服

如不效

將桃枝七根

燈心七根

水煎二三滾

露一宿

發日五更

溫服禁

生冷鷄魚

癸物

禁

禁

禁

禁

禁

禁

生

冷鷄魚

癸物

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

西

江月

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

西

江月

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

禁

瘧疾來時潮熱內傷外感生痰初時截法似神仙不
可恭虎遺患外感小柴飲子內傷平胃為先內加
草果典常山東面挑柳枝煎
截后緣調脾胃只消清瘧養脾祛邪補正作良醫不
讓仲陽錢氏瘧久若成痞塊面黃腹滿消肌月蟬
集至是根基此個方見審記

如是小兒久瘧或于午后来潮又如間日又三朝截
法不宜急暴只用養脾清瘧相蕪集至和調神丹
斬鬼莫輕饒癸日五更分曉

瘧痢如逢併作其間吉凶須知六端飲食要如時胃
氣完全可治若是不思乳食強將脾胃扶持胃苓
丸子莫差池間以香連止痢
久瘧多成壞症脾焦肚大青筋頭乾脚細臧元神飲
食全然不進面目虛浮怯弱四肢无力難行不須
醫治枉勞心丸死一生危病

平瘧養脾用人參

白朮陳皮當歸身

茯苓厚朴姜汁炒

蒼朮五錢米水浸

粉草半夏浸七次

青皮柴胡與黃芩

瘧疾來時潮熱內傷外感生痰初時截法似神仙不
可莽虎遺患外感小柴飲子內傷平胃為先內加
草果與常山東面桃柳枝煎
截后緣調脾胃只消清瘧養脾祛邪補正作良臣不
讓仲陽錢氏瘧久若成痞塊面黃腹滿消肌月蟬
集至是根基此個方兒密記

如是小兒久瘧或于午後來潮又如間日又三朝截
法不宜急暴只用養脾清瘧相蕪集至和調神丹
斬鬼莫惟饒癸日五更分曉

瘧痢如逢併作其間吉凶須知六端飲食要如時胃
氣完全可治若是不思乳食強將脾胃扶持胃冬
九子莫差池間以香連止痢
久瘧多成壞症脾焦肚大青筋頭乾脚細減元神飲
食全然不進面目虛浮怯弱四肢无力難行不須
醫治枉勞心九死一生危病

平瘧養脾用人參

白朮陳皮當歸身

茯苓厚朴姜汁炒

蒼朮五錢米水浸

粉草半夏浸七次

青皮柴胡與黃芩

常山草果二錢半

鱉甲三錢劔如神

發熱門

小兒凡病有熱症既不同治亦多異源分虛實不可
妄用汗下也

傷風發熱其症汗出身熱呵欠目赤澁多睡惡風喘
急此因解脫受風所致宜疎風解肌退熱先服柴
葛解肌湯發去風邪熱退之時再服涼驚丸以防
內熱

傷寒發熱其症无汗身熱呵欠煩悶項急而赤喘急

惡寒口中氣熱此因解脫受寒所致宜發散寒邪
退熱鎮驚先服醒神散發去寒邪後以涼驚丸以
防內熱以上二症如小兒稟賦原實者可用涼
驚丸若虛怯者不如只用胃苓丸甚効
如傷風寒發熱又吐泄者不可發散此脾虛怯也只
以五苓散吞理中丸甚効
傷熱發熱多得于夏其症身熱自汗作渴昏睡手足
俱熱此因天氣已熱包裹太重受其熱也先以
白虎湯調益元散以解其熱次服調元生脈散以

補正氣

傷暑發熱亦多得于夏其症身熱自汗作渴昏睡手足冷此由陰室中貪涼太過所致服調元生脈散補其元氣次服四君子湯以防吐泄之病

如夏月汗出當風以致身熱渾身自汗不止者此名暑風四君子湯加麻黃根黃芪以去風次以益元散以去熱

傷食發熱其症手心肚腹尤熱噎氣吐乳大便酸臭或腹疼多啼飽脹喘急不思乳食此因飲食過度