

訂正東醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫忠勤貞亮

聖功臣崇祿大夫陽平君

臣許

奉

教撰

霍亂

霍亂之因

內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰大陰所至為中滿霍亂吐下又曰歲土不及風乃大

有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲食所致此先哲確論也(丹心)○霍亂者揮霍變亂

也凡人內素有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因飲食失節生冷過度以致滯熱內甚中焦失

運不能升降是以以上吐下瀉(八門)○霍亂或因飲冷或失飢或大怒或冒寒或乘舟車傷動胃氣令

人吐瀉併作用藥遲緩須臾不救華佗)○霍亂多積於熱故夏秋為盛(八門)○霍亂之病由風溼

火炎上故嘔吐也泄者脾土也脾溼下流故泄瀉也故玄子曰皆脾熱所生也斯言為正(子和)

霍亂形證霍亂證心腹卒痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先利心腹俱痛吐利

而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節清濁相干陰陽乖隔輕者只曰吐利重者揮霍變亂乃

曰霍亂因邪入脾胃故發為吐利(八門)○霍亂一證夏秋為多寒月亦有之蓋有伏者而作(八門)

胃脾之藏府冷熱不調或飲食不節生冷過多或起居失宜露卧當風使風冷之氣歸於三焦傳於脾

胃脾之藏府冷熱不調或飲食不節生冷過多或起居失宜露卧當風使風冷之氣歸於三焦傳於脾

吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛眩暈而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛而先

者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷煩悶皆塞而欲死者隨證治之(得效)

脈法霍亂脈浮洪可救脈微遲而不語氣少則難差(得效)○脈多伏或絕(丹心)○脈代者霍亂代而亂

者霍亂微滑者生益數止斷(脈訣)○脈微而逆或代而散或隱而伏或大而虛或結或

霍亂有乾有溼

此病有乾霍亂溼霍亂乾霍亂死者多溼霍亂死者少蓋吐利則所傷之物得以泄出雖甚

乾霍亂治法

吐利不得謂之乾霍亂○乾霍亂者忽然心腹脹滿刺痛狀若神靈所附吐利不得頃刻之間

便致悶絕急用鹽湯吐之

續以理中湯(方見寒門)倍加橘紅與之或藿香正氣散(方見寒

門一加官桂赤茯苓枳殼木瓜煎服或吞下蘇合香丸尤妙(得效)○乾霍亂最難治死在須臾升降不通故也當先吐以提其氣之橫格不可用涼藥宜二陳湯(方見痰門)加解散藥川芎蒼朮防風白芷之類兼用薑鹽湯(丹心)○絞腸沙者乃乾霍亂一名也腹痛不可忍或手足厥冷乃腸胃絞縮在腹也急用鹽湯吐之(入門)○乾霍亂者氣痞於中吐利不得所傷之物壅閉正氣關格陰陽煩躁喘脹者必死急用吐法針委中(穴名)出血兼服治中湯(方見寒門)或藿香正氣散必效(入門)

薑鹽湯 治乾霍亂欲死鹽一兩生薑切半兩右同炒色變以童尿二盞同煎至一盞分二次服(直指)

霍亂治法 上吐下瀉謂之霍亂○凡霍亂吐瀉渴為熱不渴為寒(海藏)○熱多欲飲水宜五苓散寒多不飲水宜理中湯(方並見寒門)(仲星)○霍亂乃濕熱兼風木為害治宜散風寒利溼(方見暑門)俱宜合五苓散(方見寒門)以分清上下更合益元散(方見暑門)降火尤妙(入門)○

霍亂吐瀉宜用木萸散二香黃連散加味薑附湯同生散加減正氣散○中暑霍亂宜香薷散桂苓白朮散(二方並見暑門丹心)○吐瀉過多四肢逆冷不省人事南星末三錢棗三枚薑五片煎極熱服一服可效或半夏末薑汁點服或白礬末一大錢沸湯點服亦效(得效)

木萸散 治霍亂吐瀉肢體轉筋逆冷水瓜吳茱萸食鹽各五錢右同炒令焦餅盛百沸水三升入藥同煎至二升冷緩任意服即效○如無前藥枯白礬末一錢沸湯調服如無白礬只用鹽一捻醋一盞同煎服或鹽梅鹹酸等物皆可煮服(入門)

二香黃連散 治伏暑霍亂腹痛躁悶脈沉手足冷霍香厚朴半夏茯苓陳皮白扁豆香薷各一錢黃連澤瀉各八分甘草三分右剉作一貼水煎入薑汁一匙溫服(入門)

加味薑附湯 治霍亂吐瀉過多手足逆冷氣少不語六脈沉伏附子炮乾薑炮人參各一錢半甘草炙七分右剉作一貼水煎服(得效)○一名四順附子湯(直指)

回生散 治霍亂吐瀉過多但一點胃氣存者服之回生(丹心)

加減正氣散 異鄉人初到他方不伏水土遂成霍亂或吐或瀉蒼朮二錢藿香厚朴陳皮縮砂研香附半夏甘草各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚燈心一團水煎服(回春)

香薷散 治中暑霍亂吐瀉腹痛轉筋四肢逆冷急瀉此藥沉冷服之他藥不能救(方見暑門)

益元散 一名六一散治霍亂吐瀉取此藥生薑湯調下妙(方見暑門)(丹心)

霍亂後轉筋 陽明屬胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉津液驟亡宗筋失其所養故輕者兩脚轉筋而已重者

有緩氣者立起急用木炭散(方見上)加茴香甘草紫蘇葉煎服再研大蒜兩兩脚掌心則雖昏危入

腹者亦效(八門)○霍亂吐瀉過多遍體轉筋手足厥冷氣欲絕者急灸臍中又取臍一把煎湯泡洗

海藏○一法理中湯去白朮加生附子一個(活人)○霍亂後轉筋理中湯(方見寒門)加石骨一兩煎服

內傷○木瓜五錢煎服(丹心)○吐瀉脇痛轉筋脈弦者木克土也○胃散(方見)

木瓜湯 治霍亂轉筋木瓜四錢吳茱萸二錢茴香炒一錢甘草炙四分右

一法 治轉筋不止欲死男子以手挽其陰牽之女子則

霍亂後煩渴 吐瀉既多津液暴亡以致煩渴引飲不止宜桂苓白朮散五苓

桂苓白朮散 治中暑霍亂吐瀉煩渴滑石一兩寒水石石膏澤瀉甘草各五錢白朮白茯苓

麥門冬湯 治霍亂後煩渴麥門冬二錢陳皮半夏白朮白茯苓各一錢小麥牛合人參甘草各

椒豆散 治霍亂吐瀉後煩渴不能服藥或水藥不入口者胡椒末二錢甘草各四錢右研為末新汲水

加減藳苓湯 治霍亂熱渴天花粉二錢胡椒湯胡椒一錢猪苓澤瀉香薷乾葛各七

止渴湯 治同上人參麥門冬赤茯苓桔梗瓜蒌根澤瀉各

霍亂後虛煩 霍亂後虛煩不得眠或熱渴宜竹葉石膏湯

參胡三白湯 治霍亂後煩熱口乾脈數或頭身痛柴胡白朮白茯苓白芍藥當歸陳皮麥門冬梔子仁

既濟湯 治霍亂後虛煩不得眠麥門冬二錢人參竹葉半夏附子炮甘

霍亂吐法 治乾霍亂心腹刺痛煩冤吐利不得氣欲絕者極鹹鹽湯熱飲一升刺口令吐不吐則再飲一升

以鹽湯一盞入童便薑汁頓服探吐令
透未透再服吐後續用熨法（入門）

霍亂發法

霍亂吐瀉心腹痛不可忍炒鹽二碗紙包炒護頓其胸前并腹肚上以熨斗火熨之氣透
則越續以炒鹽熨其背則十分無事（得效）○又法鹽炒吳茱萸熨臍下亦效（入門）

霍亂針法

乾霍亂刺委中（穴名）出血或十指頭（諸經井穴）出血皆是良法（正傳）○絞腸痧證手足厥
冷腹痛不可忍者以手蘸溫水於病者脛腕上相打有紫黑點血以針刺去惡處即愈（經驗）○

又法用麻弦卜竹弓蘸香油或熱水刮手足胸背頸項即愈（經驗）○乾霍亂者乃寒淫太甚脾被絆
而不能動氣被鬱而不能行所以卒痛而手足厥冷俗名絞腸痧者蓋言痛之甚也北方刺青筋以出
氣血南方刮胸背手足以行氣血俱能散病然出氣血不如行氣
血之為愈也（丹心）○又治絞腸痧刺血法詳見救急門（入門）

霍亂灸法

霍亂轉筋入腹手足厥冷氣欲絕以鹽填臍中大艾炷灸之不計壯數立效（得效）○霍亂已死
而腹中有暖氣依上法灸之亦甦（醫鑒）○又法灸氣海二七壯妙（得效）○霍亂吐瀉不止垂

死灸天樞氣海中腕立愈（正傳）霍亂諸法不效灸大椎即效
（綱目）○霍亂已死但有暖氣者灸承筋七壯立甦（綱目）

禁忌法

霍亂吐瀉之時切勿與穀食雖未湯一呷下咽立死必待吐瀉止過半日飢甚方可與稀粥以漸而
將息（正傳）○霍亂吐瀉時慎勿與粟米粥湯入胃必死矣（綱目）○霍亂不可遽與未飲粥飯以

助邪氣必使傷物盡後後稀粥漸漸養之（入門）○霍亂時大忌飲食
入腹則死只吃冰水不妨不可飲熱湯切不可飲熱酒燒酒（山居）

不治證

霍亂轉筋腹痛四肢厥冷氣欲絕其脈洪大可治如脈微而囊縮舌卷而不治（綱目）○霍亂喘脹
煩躁者不治（得效）乾霍亂吐瀉不得胸腹脹硬而唇青黑手足冷過肘膝六脈伏絕氣喘急舌短

囊縮者死（回春）○脈微透氣少不語為難治（得效）○
大渴大躁大汗遺尿者死回生散救之（方見上）（入門）

水疾吐瀉

乘船大吐瀉渴飲水者即死飲童尿最好自己尿亦好（丹心）○枯白礬末一錢
百沸湯點服亦好（入門）○船暈嘔吐大半夏湯（方見疾門）煎服效（入門）

單方

一凡二十

鹽

治乾霍亂鹽一大匙熬黃取童尿
一升溫和攪服吐下即愈（本草）

甘爛水

治霍亂入藥煎用
甚妙詳見（水部）

生薑

治霍亂欲死生薑五兩切取牛尿
一升同煎取汁服即差（本草）

鍋底墨

治霍亂取二錢百沸湯一盞投
其中急攪服吐瀉立止（本草）

生熟湯

一名陰陽湯治乾霍亂能吐宿食惡毒之物
和鹽服之尤妙即百沸湯合新汲水也（本草）

天南星

治吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星末
每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸緩神識

便省神妙
本草

皂角

乾霍亂鹽湯一碗入皂角末少許調服探吐即效(本草)

烏梅

治霍亂煩渴水漬和蜜飲之妙(本草)

林藟葉

治霍亂轉筋筋脈大如桃李掣搦不可忍取葉濃煎湯飲之(種杏)

糯米

治霍亂煩渴水研取汁任意飲之(本草)

香薷

治霍亂吐瀉轉筋濃煎飲之即止○治霍亂不可闕也(本草)

牛糞

治霍亂吐瀉四肢逆冷黃牛糞以水煮濃取清汁頓服一升即止(本草)

醋

治霍亂未得吐下飲一二升良○治轉筋取衣絮漬醋煮令溫裏患處冷則易即愈(千金)

嘔吐

嘔吐之因

內經曰諸嘔吐逆衝上皆屬於火○胃膈熱甚則為嘔火氣炎上之象也(河間)○嘔吐噦者俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為異耳嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以橘紅為主噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以半夏為主究其三者之源皆因脾氣虛弱或因寒氣客胃或因乾食所傷而致宜以丁香霍香牛夏茯苓陳皮吐生薑之類主之(東垣)○溼嘔者有物有聲食已則嘔乾嘔者空嘔無物總屬陽明氣血俱病故嘔吐者重也(劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳有痰隔中焦食不得下者有氣逆者有寒氣鬱於胃口者有食滯心脾之分新食不得下而反出者有胃中有火與痰血嘔者(丹心)○嘔家雖有陽明證慎不可下逆之故也(仲景)

脈法

寸口脈數其人即吐○寸口脈細而數數則為熱細則為寒數為嘔吐(脈經)○問曰病人脈數為熱當消穀引食而反吐者何也師曰過發其汗令陽氣微膈氣虛虛脈乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故吐也(仲景)○陽脈緊陰脈數其人食已即吐○寸緊尺濡其人胸滿不能食而吐(脈經)○脈滑為嘔吐(脈訣)○嘔吐無他寸緊滑數微數血虛單浮胃薄孔則有瘵最忌濡弱(回春)○跌陽脈浮而澀浮則為虛澀則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐完穀不化名曰胃反(脈經)○脈緊而澀其病難治○脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐(脈經)○反胃噎膈寸緊尺澀(回春)○噎

蘆花

一把濃煎取汁頓服即差(本草)

木瓜

治霍亂吐瀉轉筋不止煮汁飲之枝葉功同○槁梘與木瓜同功(本草)

林檎

青色者治霍亂吐瀉甚妙煮取汁飲或嚼食之(本草)

粟米

治霍亂煩渴飲數升立差○又研米清水和濃取汁服之主轉筋入腹(本草)

蓼

治霍亂轉筋濃煎乘熱熏洗因取飲一二盞即愈(得效)

小蒜

治霍亂吐瀉煮汁飲之(本草)

煙鹿皮

或煙樟皮熏烟最多黃色者水浸揉取汁頓服治乾霍亂即吐神效(俗方)

牛涎

小兒霍亂牛涎一合灌下立效(得效)

嘔反胃脈浮緩者生沉澁者死脈澁而小血不足脈大而弱氣不足（醫鑒）

嘔吐法治

嘔吐有冷熱二證冷者面青手足厥冷食入乃吐宜加味二陳湯丁香安胃湯加減理中湯○熱者面赤手足熱食已即吐宜保中湯和中桔梗湯黃連竹茹湯清熱二陳湯或葛根竹茹湯加味

橘皮竹茹湯○大病後胃熱虛而嘔者竹葉石膏湯（方見寒門）加薑汁服即止（入門）○時常口吐清水或冷涎自下涌上者脾熱所致也二陳湯加白朮芍藥升麻神麴麥芽乾生薑土炒苓連梔子

或水煎服或蒸餅為丸服（入門）○肝火出胃逆上嘔吐宜抑青丸（方見大門）○久病胃虛嘔吐宜嘔家主藥若胃虛而嘔者宜推揚穀氣四味藿香湯加減四君子湯主之（綱目）○半夏橘皮生薑為

藿香安胃散藿香平胃散比和飲○痰飲嘔吐宜茯苓半夏湯大半夏湯（三方見痰門）○神朮丸治嘔吐清水如神（方見痰門）○停水而嘔者心下怔忡先渴後嘔者宜赤茯苓湯（方見痰門）

先嘔後渴者宜猪苓散水入即吐者宜五苓散（方見寒門）○嘔家聖藥是生薑千金之說信矣然氣逆作嘔生薑散之痰水作嘔半夏逐之生薑於寒證最佳若遇熱嘔不可無烏梅也（醫鑒）○

嘔吐宜服雞白劑○嘔家有癰膿不須治嘔膿盡自愈矣（仲景）

加味二陳湯

治胃冷嘔吐二陳湯（方見痰門）一貼加縮砂一錢丁香五分也（丹心）

丁香安胃湯

治嘔吐噎膈胃寒所致黃芪二錢吳茱萸草豆蔻人參蒼朮各一錢丁香柴胡升麻當歸身陳皮甘草各五分黃柏二分右剉作一貼水煎服（正傳）

加減理中湯

治胃寒冷嘔吐清水冷涎脈沉遲人參白朮赤茯苓乾薑炮陳皮藿香丁香半夏縮砂研桂皮各一錢右剉作一貼入薑三片烏梅一個水煎服（回春）

保中湯

因痰火致嘔吐不下飲食白朮土炒二錢黃芩黃連並土炒藿香梔子薑汁炒各一錢半夏陳皮赤茯苓各八分縮砂三分甘草二分右剉作一貼入薑三片以長流水和黃泥澄清水取煎之去滓稍冷頻服（醫鑒）

和中桔梗湯

治上焦熱食已暴吐脈浮而洪半夏夏翹二錢桔梗白朮各一錢半陳皮厚朴枳實赤茯苓各一錢右剉作一貼薑三片水煎取清調木香檳榔末各一錢空心服三服後吐漸止除木香

檳榔末更加白芍藥二錢

黃耆一錢半煎服（正傳）

黃連竹茹湯

治胃熱嘔吐煩渴脈數黃連薑汁炒梔子炒黑青竹茹各一錢人參七分白朮赤茯苓白芍藥陳皮麥門冬甘草各五分右剉作一貼入薑二枚一水煎服（回春）

清熱二陳湯

治痰火嘔吐出涎沫半夏陳皮赤茯苓甘草人參白朮竹茹砂仁梔子麥門冬各一錢右剉作入薑三棗二枚一水煎服（回春）

葛根竹茹湯

治胃熱嘔吐葛根三錢半夏切薑汁漿水同煮乾二錢甘草一錢右剉作一貼薑三片藥二枚竹茹一彈子大同煎服(丹心)○治酒嘔尤妙(入門)○欲知胃中有熱手足心皆熱

者是胃熱也(入門)

加味橘皮竹茹湯

治胃熱多渴嘔吐不食橘皮竹茹赤茯苓枇杷葉麥門冬半夏各一錢人參甘草各五分右剉作一貼薑三片水煎服○無枇杷葉則以蜜炙桑白皮代之(入門)

四味藿香湯

治胃虛嘔吐痢藥不停藿香人參橘皮半夏各二錢右剉作一貼薑三片煎服(入門)

加減四君子湯

治久病胃弱全不納食聞食氣即嘔四君子湯(方見氣門)去茯苓加人參黃耆香附子各一錢右剉作一貼入薑三片水煎服(入門)

藿香安胃散

治脾胃虛弱嘔吐飲食不待腐熟橘紅五錢人參丁香藿香各二錢右為末每取二錢薑三片同煎溫服(寶鑑)

藿香平胃散

治同上蒼朮二錢藿香厚朴陳皮各一錢半縮砂神麴各一錢甘草炙七分右剉作一貼薑三片水煎服(東垣)

比和飲

治胃虛嘔吐月餘不納水穀聞食氣即嘔聞藥亦嘔人參白朮白茯苓神麴炒各一錢藿香陳皮縮砂甘草各五分陳倉米一合右剉作一貼先以順流水三升泡伏龍肝末澄清取一升半入藥

及薑三棗二同煎至七分去滓稍冷服日二三遂納而不吐別以陳倉米煎湯時時吸之全愈(醫鑒)

茯苓半夏湯

治痰飲停胃嘔吐不止半夏二錢赤茯苓陳皮蒼朮厚朴各一錢藿香八分縮砂乾薑甘草炙各五分右剉作一貼入薑三片水煎服(回春)

猪苓散

治先嘔後渴嘔吐而思水解者急與之猪苓赤茯苓白朮各等分右為末每一二錢水調服○一人每嘔水二三碗諸藥不效但吃并華水一口即止用此藥即愈(仲景)

薤白粥

治嘔最效薤白三莖雞子三碗去黃粟三合同煮作稀粥別用人參一兩細剉水升煎取三合去滓煮以雞薤粥入瓊人參湯相和攪勻頓服即止(得效)

惡心乾嘔

惡心者欲吐不得吐見飲食則便惡之陳湯(方見痰門)加白豆蔻香附子縮砂煎服(入門)○惡心者欲吐不吐也胃口有熱有痰二陳湯加薑炒芩連(丹心)○乾嘔者有聲無物也

乾嘔

或手厥冷者宜生薑橘皮湯(活人)○惡心者無聲無物但心中几几然無奈欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實非心經之病皆在胃口上宜用生薑入口惡心吐清水胃口有痰有熱有虛皆用生薑

生薑半夏湯

(仲景)○乾嘔吐涎沫宜半夏乾薑散(仲景)○胃中素有熱惡心乾嘔不止者宜梔子竹茹湯(醫鑒)

生薑橘皮湯

治乾嘔或手足厥冷橘皮四兩生薑八兩右剉以水七盞煮至三盞逐旋微溫呷服活人○一名陳皮湯治乾嘔最妙下咽即愈(仲景)

生薑半夏湯

治胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微心中憤憤然無奈者半夏五錢水一盞半煎至半盞入薑汁半盞和勻緩緩服之(仲景)○大凡嘔吐藥忌一時頓服宜緩緩服(入門)

半夏乾薑散

治胃乾嘔吐涎沫半夏乾薑各等分粗末每取三錢水煎緩緩服(仲景)

梔子竹茹湯

治胃熱惡心乾嘔不止梔子炒三錢陳皮二錢青竹茹一錢半右剉一貼水煎和薑汁服(醫鑒)

食痹吐食

食痹謂食已心下痛陰陰然不可名也不可忍也吐也吐乃止此為胃氣逆而不下行也(內經)○痛而嘔為寒經云寒氣客於腸胃逆上出故痛而嘔也(綱目)○嘔吐而脈弦者肝勝于脾也

由風痰蠱絆於脾胃之間故惡心欲吐飲食不下當先實其脾土宜茯苓半夏湯

茯苓半夏湯

治風痰蠱絆於脾胃之間惡心欲吐宜實脾土麥芽炒一錢半白朮白茯苓半夏神麴炒各一錢三分橘紅天麻各一錢右剉作一貼為度末薑五水煎服(東垣)

白朮茯苓湯

治同上白朮白茯苓半夏各三錢神麴炒一錢麥芽炒五片水煎服(東垣)

金花丸

治同上半夏製一兩橫柳二錢雄黃水飛一錢半右為末薑汁浸蒸餅和丸梧子大薑湯下三五丸以吐止為度風痰蠱絆于脾故飲食不下用此以治風痰(易老)○一名安脾丸(入門)

水煮金花丸

治風痰蠱絆脾胃飲食不下白麴四兩半夏天南星並湯洗寒水石燒各一兩天麻五錢雄黃一錢半右為末滴水丸梧子大每取百丸先煮漿水沸下藥煮令浮為度漉出生薑湯

吞下食前(易老)○風邪在胃翻翻不定或鬱酸水全不入食宜不換金正氣散方見寒門)或安脾丸不宜輕用參朮惟久病脇痛者本克土也宜六君子湯(方見痰門)加青皮白芍藥柴胡升麻川芎

砂仁神麴煎服(入門)

麥冬湯

治風邪蠱絆脾胃有痰惡心欲吐麥門冬一錢半天麻一錢三分白朮白茯苓半夏神麴陳皮各一錢右剉作一貼薑五水煎服(入門)

吐病有三

氣為上膈屬上焦食已暴吐者今世謂之嘔吐也○食飲入而還出為下膈食晬時乃反出之屬中下二焦○朝食暮吐暮食朝吐今世謂之隔氣反胃也(綱目)○吐有三因乃氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主分而不納○上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪其證食已暴吐渴欲

飲水大便燥結氣上衝胸而發痛其治當降氣和中○中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相侵為精而痛其脈浮而弦其證或先吐而後痛或先痛而後吐治法當以小毒藥去其積水香檳榔和其氣

(宜紫沉丸消積)○下焦吐者皆從於寒地道也其脈沉而遲其證朝食暮食暮食朝吐小便清利大府秘而不通治法宜以毒藥通其閉塞溫其寒寒大便漸通復以中焦藥和之不令大府結閉而自安

府秘而不通治法宜以毒藥通其閉塞溫其寒寒大便漸通復以中焦藥和之不令大府結閉而自安

也(易老)

噎膈反胃病

因不能經曰三陽結謂之噎註曰三陽者大小腸俱熱結也蓋小腸熱結則血脈燥大腸熱結則

以噎食不下縱下復出乃陽大上行而下不降也(八門)○內經曰少陽所至為嘔涌溫食不下此理

明矣(八門)○又曰食不下者胃脘隔也(八門)○血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可

行食物難入間或可入亦不多也名之曰噎其槁在下與胃相近食雖可入難盡入胃良久而復出

須臾吐出食出痛乃止此上焦之噎也或食物可下難盡入胃良久復出其槁在胃下則胃脘當心而痛

噎也其或朝食暮吐暮食朝吐其槁在關門此下焦之噎也(八門)○噎有五五隔者憂患寒熱氣也在心脾之問上下不

通或結於咽喉時覺有所妨碍吐之不出嚥之不下由氣鬱痰結而然五噎者憂食勞氣思也飲食卒

然阻滯而不下反胃也噎也噎也受病皆同(醫鑒)○張雞峯曰噎當是神思間病惟內觀自養可以

治之其言深中病清(丹心)○噎噎之證不屬虛不屬實不屬冷不屬熱乃神氣中一點病耳(醫林)

噎病皆生於血枯血枯則燥矣得病情合經旨者丹溪一人而已(綱目)

噎病反胃治法噎病生於血乾夫血者陰氣也陰主靜內外兩靜則藏府之火不起而金水二氣有養陰血

以解毒竹瀝以清痰乾薑以養血粟米以實胃蜜以潤燥薑以去穢正是此意○噎噎反胃大率屬血

虛氣虛有痰有熱血虛四物湯氣虛四君子湯痰用半夏湯熱用解毒湯(即黃連解毒湯)氣血俱虛

八物湯主之必和以童便炒藥宜薄滋味○飲酒者加砂糖鹽尿入內服以防生虫(丹心)○噎噎宜用

平神九神仙奪命丹丁香透膈湯五噎寬中散素肉平胃散(方見內傷)瓜蒌實丸神奇散當歸養血

湯生津補血湯聖散八仙膏○反胃宜用疏末丸狗米平胃丸九粒糖丸九仙奪命丹順氣和中湯安

中調氣丸回生養胃丹定生丹安胃湯太倉丸奪命丹附子散(諸方)

平神九治噎氣不食大鯽魚一個去腸留鱗以大蒜切片填魚腹內漚紙包黃泥固濟慢

火煨熟去鱗骨入平胃散末杵丸梧子大每三五十九粒空心米飲吞下(八門)

神仙奪命丹治氣鬱嘔吐或噎食不下百草霜研五錢雄黃鵬砂各二錢乳香一錢半萊豆黑豆各四十

茶泡熱餅壓下良久不吐乃藥之效若吐再嚥化一丸服忌油膩鹽醋怒氣(八門)○一名二豆回香丹(回春)

丁香透膈湯 治五噎十噎痞塞不通白朮一錢三分甘草九分人參白茯苓縮砂香附子各七分沈香藿

劉作一貼薑三棗二水煎服(八門) 十
喝者冷風氣伏熱悲憂水食喜也(綱目)

五噎寬中散 治五噎食不下厚朴香附子各一錢半甘草五分五皮陳皮丁香縮砂各

瓜薑實丸 治噎膈胸膈痞滿微喘急妨悶瓜薑實枳殼半夏製桔梗各一

神奇散 治噎膈反胃血虛有火三陽枯竭當歸川芎白芍藥生地黃並酒炒陳皮縮砂半夏白茯苓白朮

天門冬麥門冬甘草各五分
右剉作一貼水煎服(醫鑑)

當歸養血湯 治老人痰結血枯成噎噎當歸白芍藥炒熟地黃白茯苓各一錢黃連以吳茱萸同炒去茱

作一貼薑一棗二水煎入
沉香汁竹瀝調服(回春)

生津補血湯 治年少人噎膈乃胃脫血燥不潤故便閉塞而食不下當歸白芍藥熟地黃生地黃白茯苓

棗二水煎入沉香
汁調服(回春)

聖灰散 治噎食病及回食病(回食者食下即吐也)取初出窯石灰投入鍋中滾水中化開去渣止用清

四十餘壯健者用四分年老氣弱只用二分或三分好燒酒調服一二鍾能飲
者三四鍾或吐出虫或下虫其病即愈如不吐不下遇發再服自痊(回春)

八仙膏 治噎食生藕汁生薑汁生梨汁生蘿蔔汁甘蔗汁(無則砂糖代之)白果

硫汞丹 治反胃吐逆水銀八錢生硫黃末二錢同入鉢內慢火燒柳枝拌炒有焰起以醋

狗米平胃丸 治反胃諸藥不效黃雄犬一口餓數日用生粟米飼之取其糞中米淘淨用韭白煎湯煮

杵糠丸 治五噎杵頭糠牛轉草各半斤糯米一斤為末取黃母牛口中涎和砂糖三

九仙奪命丹

治反胃噎食其效如神枳殼二兩白礬枯一兩半夏厚朴並薑製各五錢木香南星薑製各二錢人參甘草各一錢豆豉研過一兩右為末夜晴露過以人參厚朴煎湯調糊作餅如小錢大浸火焙乾每一餅嚼碎以薑湯調平胃散送下忌生冷酒麪(活心)

順氣和中湯

治嘔吐反胃嘈雜吞酸噎膈吐痰水心腹刺痛陳皮鹽水炒香附子醋炒梔子薑汁炒黑各一錢白朮土炒八分白茯苓七分半夏神麪黃連薑汁浸晒乾猪胆汁拌炒各六分枳實五分縮砂三分甘草炙二分右對作一貼入薑三長流水入黃土泥攪澄清水煎二竹瀝童便薑汁溫服(靈璧)

安中調氣丸

治反胃及痰氣白朮土炒香附子長流水浸三日炒黃各三兩陳皮二兩半夏製油炒白茯苓神枳實神麪炒黃連薑汁浸猪胆汁拌炒各一兩白芍藥八錢蘇子炒蘿蔔子炒各六錢川芎當歸酒洗白豆蔻炒各五錢甘草炙三錢木香一錢右為末以竹瀝薑汁打神麪為糊和丸菜豆大湯下一百丸(醫璧)

回生養胃丹

治脾土虛寒聚成痰涎以致大便燥澀小便赤而多嘔吐酸水漸成反胃結腸之證蒼朮換搜作小餅烘乾南星細切薑汁浸一宿伏龍肝同炒去土半夏湯洗醋浸七日蒸熟橘紅伏龍肝同炒去土果末薑汁浸蒸培各四兩人參白朮白茯苓厚朴蓬朮三枝二味並醋炒薑澄茄縮砂白豆蔻殼

定生丹

治反胃定生苑雄黃朱砂乳香半夏木香肉豆蔻百草霜(為衣)各三錢沉香一錢阿魏硃砂各五分萊菔四十粒烏梅四十個湯泡去核右為末以烏梅肉和搗作丸彈子大百草霜為衣陰乾為末稀麪糊丸梧子大未飲吞下六七十丸(醫鑑)

安胃湯

治反胃參朮白朮白茯苓山藥炒當歸陳皮半夏薑香各一錢黃連薑汁炒蓮肉各八分人參縮砂各五分甘草三分右到皮一貼入薑三棗二烏梅一水煎服(回春)

奪命丹

治反胃有起死回生之功藁一個麝香一分孩兒茶二分金絲黃蘗三分朱砂春二分夏四分秋六分冬八分○裹乃土糖裹即蛇蟻所轉之彈凡糞土之下皆有用彈中有白虫者如指大如蟻

奪命丹

治反胃有起死回生之功藁一個麝香一分孩兒茶二分金絲黃蘗三分朱砂春二分夏四分秋六分冬八分○裹乃土糖裹即蛇蟻所轉之彈凡糞土之下皆有用彈中有白虫者如指大如蟻

冷厚味蔥蒜酒麪氣惱五十以後一二服即效(回春)

附子散

治反胃大附子一個坐於磚上回面著火斬遍淬入生薑汁又炙又淬之可盡汁

嘔吐噎膈反胃宜通大便

謹病人欲吐者切不可下逆之故也(仲景)○陽明之氣下流則順今逆而上行

而利導之(直指)

○陰虛邪氣逆上窒塞嘔噦不足之病也此地道不通當用生地黃當歸桃仁紅花

兼用甘草微加大黃芒硝以通其閉大便利則嘔吐噎膈自止矣(東垣)

嘔吐而大便不秘止者利藥所當忌也若大腸腸熱自止矣(東垣)嘔吐證因生地利藥此言其常只

發泄則嘔吐何由不秘止乎古人用三一承氣湯正是此意(丹心)

通利大便以開食若不利用利藥開通

紫沈丸厚朴丸附子丸人參利膈丸

家多大便秘結虛冷者用蘇感丸溫而利之(方見大便)若大便熱結用蜜導法(方見大便)或猪胆

汁和醋灌入下

部妙(直指)

柴沈丸

治中焦吐食由食積與寒氣相格故吐而疼此主之陳皮五錢半夏麴代赭石縮砂烏梅肉各三

錢丁香檳榔各二錢沈香木香杏仁白朮各一錢白豆蔻巴豆霜各五分右為末醋糊和丸黍米

煎湯下紫沈丸百丸一日二服後大便通不吐則止(易老)

厚朴丸

治同上與萬病紫苑丸同方見積聚每服三九或五九薑湯下(東垣)

附子丸

治下焦吐食朝食暮吐暮食朝吐大便不通附子炮五錢巴豆霜一錢砒霜二錢右研極細焙黃

人參利膈丸

治噎膈大便燥結喘滿壅塞治隔氣之聖藥也人參當歸藿香枳殼大黃厚朴甘

三一承氣湯

治噎膈大便秘三陽結而不上為噎膈反胃(方見寒門)○河間

四子調中湯

治反胃痰盛二便澀半夏二錢桃仁一錢半香附子枳實瓜蒌仁蘇子炒白芥子炒各一錢

空心服

香白丸

治痰涎壅盛嘔吐不止大便澀滯青州白丸子(方見風門)與

大黃湯

治冷涎反胃其候欲發時先流冷涎次則吐食此乃勞證治不早死在朝夕大黃一兩生薑自然

至七分先食蔥白次服藥不十日去根(本事)。○凡嘔噎大便秘結用大黃乃急則治標之法也仍用四物湯加童便非汁竹瀝多服為妙(正傳)

潤腸膏

治嘔噎反胃甚捷新採威靈仙四兩搗取汁生薑四兩取汁真麻油二兩白砂蜜四兩掠去沫右同入銀石器內慢火煎如餛飩時以匙挑食之一料自快效(正傳)

難治不治證

嘔吐脈弱小便自利身微熱而厥者虛極難治(脈經)。○凡吐如清菜汁者死此是乍然嘔吐非反胃比也(入門)。○噎隔反胃證年高者不治(年五十以上者不治)。○費如羊尿者不治

(大腸無血故也)。○不淡飲食不斷房室者不治。○氣血俱虛者則口中多出沫但見沫多出者必死(丹心)。○反胃吐白沫者可治吐黃沫者不可治(種杏)

單方

凡三十種有螺泥丸

黃丹

治反胃黃丹一兩白礬二兩同入罐內火煨故冷為末蒸餅和丸梧子大溫酒下五丸至七丸(綱目)

黑鉛

治吐虫而嘔者黑鉛炒成灰檳榔等分為末空心米飲調下(丹心)

二錢妙(本草)

之

(本草)

(本草)

煎頓服日再(本草)

一升即差(本草)

嘔家用法用半夏以去其水水去則嘔自止(金匱)

竹茹

主嘔噎取青竹茹一升水煎頓服。嘔噎用竹茹者滋胃解煩也(入門)

及並主噎(本草)

服

(本草)

橘皮

治反胃嘔吐橘皮用日照西方壁土末同炒香取皮為末每一錢淡薑湯煎服(直指)

滑石

治反胃積飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和丸時時服之(丹心)。○暴吐逆滑石末溫水服

赤石脂

治痰飲吐水成反胃石脂水飛每一錢空心以水酒任下加至二三錢無則以好赤土代

人參

治反胃垂死者人參末三錢薑汁五合粟米一合煮粥空心食之(入門)。○人參到二兩水

生薑

凡嘔吐皆因氣逆故用生薑之辛以散之。○反胃嘔吐生薑汁煮粟米粥食之。○乾嘔服薑汁

半夏

凡嘔噎用半夏者散結氣也。○反胃嘔吐半夏一兩製生薑二兩剉分二貼水煎服(本草)。○

蘆根

治乾嘔噎及五噎煩悶蘆根五兩水煎頓服一升不過三升即差(本草)

鯽魚

治反胃取大鯽魚去腸留膽入綠蓼滿腹以火炙焦為末每一錢米飲下日三(綱目)。○諸魚

蚌蛤粉

治反胃吐食取爛粉米飲下一二錢。○蜆魚殼灰和酒服亦可煮汁飲(本草)

木瓜

止嘔逆煮汁飲之佳生薑同煎服尤妙。○煨燒灰和酒服亦可煮汁飲(本草)

咳嗽

咳嗽病因

內經曰人感於寒微則為咳甚者為嗽為痛。秋傷於溼冬生咳嗽又曰秋傷於溼上逆而咳發為痰厥（內經）○形寒飲冷則傷肺肺傷則咳嗽（難經）○秋傷於溼冬必咳嗽者蓋秋傷於溼

積於脾也大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必上衝而為咳嗽甚則動脾溼而為痰也是知脾無留溼則雖傷肺氣亦不為痰若有痰而寒少熱多故咳嗽嗽嗽非專主乎肺病以肺主皮毛而司於

外故風寒先能傷之也經曰五臟六腑皆能使人咳嗽固非獨肺也各以其時主之而受病焉非其時則傳以與之也所病不等寒燥溼風火皆能令人咳嗽惟溼病痰飲入胃留之而不行上入於肺則為嗽假

令溼在心經謂之熱痰溼在肝經謂之風痰溼在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰所治不同各隨證用藥（河間）○咳嗽無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾溼動而為痰也咳嗽者有

痰而有聲因傷肺氣動於脾溼故咳而兼嗽也（河間）○咳者聲咳之咳俗謂之嗽者為痰也肺主氣形寒飲冷則傷之使氣上而不下逆而不收衝擊膈咽令喉中淫淫如癢習習如梗是冷嗽甚者續續不

已連連不息坐卧不安言語不竟動引百骸聲聞四隣矣（明理）

脈法

咳嗽所因浮風緊寒數熱細溼房勞瀆難右關濡者飲食傷脾左關弦短疲極肝哀浮短肺傷法當咳嗽五藏之嗽各視本部浮緊虛寒沈數實熱洪滑多痰弦澀少血形盛脈細不足以息沈小伏匿皆是

死脈惟有浮大而嗽者生外證內脈參考秤停（脈訣）○關上脈微為咳○脈弦或緊為寒○脈浮為風○脈細為溼○脈數為熱○脈沈為留飲○沈數為實熱○洪滑為多痰○脈浮軟者生沈小伏匿

者死（正傳）○喘急脈沈肺脹停水氣逆填胸脈必伏取沈而實滑身溫易愈身冷脈浮尺瀋難補（回春）○喘脈滑而浮者生澁而數者死大抵宜浮遲不宜急數（正傳）○喘鳴肩息者脈實大也緩

則生急則死（內經）○喘脈滑而手足溫者生脈瀋而手足寒者死數者亦死為其形損故也（脈經）○咳逆脈浮而緩者易治○弦急而按之不鼓者難治○脈結或促或微皆可治○脈代者危○右關

脈弦者水乘土位難治（正傳）○咳逆上氣脈散者死（散即數脈也）○咳逆脈數為火刑金必死（入門）○咳唾膿血脈數虛為肺痿數實為肺癰（仲景）○肺痿唾血脈緊強者死滑者生（脈經）○寸

數虛遊肺痿之形（脈訣）

咳嗽

雖屬肺亦有臟腑之異內經曰咳嗽上氣厥在胸中過在手湯明（大腸）太陰肺○帝曰肺之令人

手者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從肺系上至於肺則肺寒肺寒內外合邪因而客之則為肺咳五藏各以其時受病非其時則各傳以與之乘秋則肺先受邪乘春則肝先

受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺咳之狀咳而喘息有音甚則唾血心咳之狀咳則心痛喉中啞啞如梗狀甚則咽腫喉痹肝咳之狀咳則兩脇下痛

甚則不可以轉轉則兩脇下滿脾咳之狀咳則右脇下痛陰引肩背甚則不可以動動則咳劇腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳延帝曰六府之咳奈何安所受病岐伯曰五藏之久咳乃移於六府脾咳不已則胃受之胃咳之狀咳而嘔嘔甚則長蟲出肝咳不已則胆受之胆咳之狀咳而嘔嘔汁肺咳不已則大腸受之大腸咳之狀咳而遺失心咳不已則小腸受之小腸咳之狀咳而失氣腎咳不已則膀胱受之膀胱咳之狀咳而遺尿久咳不已則三焦受之三焦咳之狀咳而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多濁唾而面浮腫氣逆也(內經)

臟腑治咳藥

肺咳宜麻黃湯(方見寒門)心咳宜桔梗湯(方見下)肝咳宜小柴胡湯(方見寒門)脾咳宜升麻湯(方見寒門)腎咳宜麻黃附子細辛湯(方見寒門)胃咳宜烏梅丸(方見蟲門)胆咳宜黃芩湯加半夏生薑(方見寒門)小腸咳宜芍藥甘草湯(方見腹門)膀胱咳宜茯苓甘草湯(方見苓桂枝各二錢甘草一錢入薑煎三焦咳宜錢氏異功散(方見小兒)(海藏)

嗽作有四時早晏之異

凡咳嗽春是春升之氣夏是大炎上最重秋是溼熱傷肺冬是風寒外束(丹心)○重宜解表行痰用藥發散之後以半夏等藥逐去其痰庶不再來(入門)○早晨嗽多者胃中有食積至此時火氣流入肺中瀉白散加知母或二母散(五更嗽同)○上半日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降胃火一云上半日嗽多者(午前也)胃中有實火單石膏丸(方見火門)加知母貝母若便閉端渴疾稠者宜涼膈散(方見火門)○午後嗽多屬陰虛四物湯加知母炒黃柏先降其火一云午後嗽(下半日也)多屬陰虛四物合二陳湯加知母黃柏麥門冬如寒熱盜汗遺精宜滋陰降火湯(方見火門)○黃昏嗽多此大氣浮於肺不宜用涼藥五味子五倍子欬而降之(一云黃昏嗽多者(夜嗽也)潤肺丸以欬之(即潤肺散作丸也)通用二陳湯去半夏加貝母瓜蒌青黛梔子黃芩桑白皮○夜嗽用降陰分火(丹心)○風寒鬱熱夜嗽者三柳湯加知母黃芩生薑(正傳)

桔梗湯

除痰止咳嗽又治心咳桔梗半夏製陳皮去白各一兩枳實三錢右為粗末每三錢薑五水煎服(局方)

二母散

治諸般咳嗽兼治痰喘知母貝母各一兩巴豆十粒作霜右為末每服一字與薑三片臨臥細嚼白湯下便合口睡其嗽即定亦治久嗽不愈(入門)

咳嗽諸證

咳嗽寒嗽熱嗽濕嗽鬱嗽勞嗽食積嗽氣嗽痰嗽乾嗽血嗽酒嗽久嗽火嗽夜嗽天行嗽通治咳嗽藥○咳因氣動為聲嗽乃血化為痰肺氣動則咳脾濕動則嗽脾肺二藏俱動則嗽咳俱作

門也(入)

風嗽

風乘肺則鼻塞聲重口乾喉癢語未竟而咳(入門)○傷風咳嗽宜神朮散散冬花散人參荊芥散(方見聲音)金沸草