

瘍醫大全



瘍醫大全卷十八

蘇湖顧世澄練江氏纂輯

增錢之柏東陽全校  
攝雙用和全校

頸項部

自頸項至結喉止凡一切癰疽瘰癧瘰癧馬刀皆彙於此部中以便檢閱參治

頸項痛門主論

邪客三陽則痛寒搏則筋急風搏則筋弛左多屬血右多屬痰丹溪治一人項強痛甚不可以回顧作痰客太陽經治之用二陳湯加酒芩羌活紅花服二劑而愈有挫閃及失枕而項強痛者皆由腎虛不能榮筋也六味地黃湯加秦艽

王肯堂曰夾疽生喉之兩傍屬手少陰心經足太陰脾經足厥陰肝火熱毒上攻而成內潰者難治虛火上升痰壅飲食不進者死

氣 頸



氣頸門主論

汪省之曰氣頸乃七情抑鬱不伸肝脾氣鬱不舒結喉之間氣結如胞隨喜怒消長甚則飲食噎碍治以四海舒鬱丸主之

理例

氣頸門主方

四海舒鬱丸

青木香

錢五陳皮

海蛤粉

銍三海帶

海藻

昆布

海螵蛸

各二兩俱用滾水炮去鹽

共研

細每服三錢不拘酒水日服三次渣沉在碗底內者數氣頸上愈後用黃藥子四兩生酒三大壺煮三炷香審一七去火毒早晚任飲數酒完永除根

頸 癰



頸癰門主論

王肯堂曰頸癰屬手少陽三焦經鬱火積憤驚惶所致初覺即隔蒜灸若潰後不斂煩躁脹滿小便如淋嘔吐者死

準繩

靈樞云發於頸者名曰天疽其癰大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋前傷任脈內熏肝肺熏肝肺十餘日而死矣

中斗垣曰頸左發為癰右發為疽皆由臟腑熱毒風氣伏結風府之間故毒發于頸之上下但內近咽喉飲食氣道呼吸所關其見證也寒熱往來喉嚨疼痛飲食妨碍亦惡候也啓玄

環項發

環項發門主論



王肯堂曰環項發發於項之周圍故名又名落頭癰先看何處腫起如從後天柱穴起是足太陽兼督脈症門穴下作寒熱拘攣悶亂恐怖不食如連前項俱腫乃毒流入足少陽連耳腫是流入陽明當分經絡治之不應者死準繩

頸蝗

頸蝗門主論



汪省之曰頸蝗其毒不紅其形堅硬無膿一年半載長久如此不能穿潰兩尖鎖頸嗜人脂血食血



一飽病人即將危矣毒發之初先服益氣養榮湯十餘劑即將兩患頭上用三棱針針佳以艾炷針灸七壯或九壯次服神效瓜蔓散


方見乳自消理例

### 風熱鎖喉毒門主論

竇漢卿曰頸項間忽痛如失枕之狀名曰風熱鎖喉毒久則紅色繞於肩背堅硬難治

全書

無辜疳傷瘡



### 無辜疳傷瘡門主論

申斗垣曰無辜疳傷瘡乃因小兒衣物洗濯晒晾誤被雌鳥糞及羽毛落於上有蟲入於皮毛間致令小兒腦後項邊有核如彈丸在肉內推之則動軟而不痛久則蟲化入於臟腑令兒羸瘦壯熱便膿血頭骨開縫肢體生瘡治宜消疳驚甲丸主之

啓玄

馮魯瞻曰無辜疳者因浣衣夜露被無辜落羽所污小兒服之令身體發熱日漸黃瘦便痢膿血是也心鑑曰腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不硬其間有蟲如米粉如不速破而去之即蟲隨熱氣流散遍體生瘡一入臟腑便痢膿血須以銀針刺破貼以膏藥可也 又曰更有疳蟲或如髮絲或如馬尾出於頭項腹背之間黃白及赤者生紫黑青者死

### 無辜疳傷瘡門主方

蟹甲丸

夜明砂

煅微 蟹甲

醋煮令 枳殼

黃連

各二 雄金

蝎尾

詞子

生一 枚

共為末

入麝香少

許蜜為丸如菜豆大每服五丸食後用米飲送下

# 瘰癧



## 瘰癧門主論

陳實功曰瘰癧非陰陽正氣結腫乃五臟瘀血濁氣痰滯而成也瘰者陽也色紅而高突或蒂小而

下垂瘤者陰也色白而漫腫亦無癢痛人所不覺

証 又曰筋骨呈露曰筋瘰屬肝赤脈交結曰血

瘰屬心皮色不變曰肉瘰屬脾憂喜消長曰氣瘰屬肺堅硬不移曰石瘰屬腎治宜消散自然縮小

切不可輕用刀針掘破出血不止多致危亡久則膿血崩潰滲漏不已終致傷人

証 又曰筋瘰堅

而色紫纍纍青筋盤曲甚則結若蚯蚓此乃肝統筋怒動肝火血燥筋攣而成也治當清肝解鬱養

血舒筋為主清肝蘆薈丸主之

又曰血瘰微紫微紅軟硬間雜皮膚隱隱纏若絲縷色紅擦破血

流禁之不住此乃心主血暴急太甚火旺逼血沸騰復被外邪所搏而成也治當養血涼血抑火滋

陰安斂心神調和血脈為主芩連二母丸主之

又曰肉瘰軟若綿硬似餛飩皮色不變不緊不寬終年

只似覆肝此乃脾主肌肉鬱結傷脾肌肉消薄土氣不行逆於肉裏而為腫也治當理脾寬中疏通

戊土開鬱行痰調理飲食為主加味歸脾湯主之

又曰氣瘰軟而帶堅皮色如故或消或長無熱

無寒此乃肺主氣勞傷元氣腠理不密外寒傳而為腫也治當清肺氣調經脈理勞傷和榮衛為主

通氣散堅丸主之 又曰骨瘤形色紫黑堅硬如石疔瘡高起推之不移昂昂堅貼於骨此乃腎主骨恣慾傷腎腎火鬱遏骨無榮養而為腫也治當滋補腎氣養血行瘀散腫破堅利竅為主調元腎氣丸主之 又曰粉瘤紅粉色多生耳項前後亦有生於下體者全是痰氣凝結而成宜用披針破去脂粉以三品一條鎗插入數次化盡內膜自愈 又曰黑砂瘤多生臀腿腫突大小不一以手撮起內有黑色是也亦用披針刺內出黑砂有聲軟硬不一 又曰髮瘤多生耳後髮下寸許軟小高突按之不痛針之粉髮齊出 又曰蛔蟲瘤生於脇下 又曰蛆瘤生於肩膊 又曰虱瘤破之虱出但諸瘤形狀之異皆由五臟濕熱邪火濁氣瘀血各感而成非正病耳 又曰小兒胎瘤初生頭上胸乳間腫起大者如鰕小似梅李此乃胎中瘀血凝滯而成須候小兒滿月之後方可用針刺破內如赤豆汁則安內服五福化毒丹即愈 又曰治癭之法初起元氣實者海藻玉壺湯六軍丸久而元氣虛者琥珀黑龍丹十全流氣飲選而治之 薛立齋曰癭瘤諸證祇宜服藥消磨切不可輕用刀針掘破血出不止多致立危醫家病家均當慎之萬勿孟浪

馮魯瞻曰癭則著於肩項瘤則隨氣凝結戒食厚味忌妄破抉五癭皆不可妄抉破惟胎癭破而去其脂粉則愈 錦囊

李東垣辨瘤法若發腫都輒而不痛者血瘤也發腫日漸增長而大不熱時時牽痛者氣瘤也氣結微腫久而不消後亦成膿此是寒熱所為也留積經久極陰生陽寒化為熱以此潰必多成癭宜早服內塞散以排之諸癰瘤疣贅等至年長皆自內潰理於壯年可無後憂 十書 百效全書曰夫癭瘤皆因氣血凝滯結而成之癭則喜怒所生多著於肩項皮寬不急垂垂而重者

是也瘤則隨留所住初如梅李之狀皮嫩而光漸如杯卵者是也瘰雖有五瘤則類多不痛不癢切不可挾破恐膿血崩潰滲漏無已必致殺人惟肉瘤更不可攻療如脂瘤氣瘤體氣充實者如海藻散堅丸東垣散腫潰堅湯多服亦可消散如虛弱者又宜斟酌不可純用化痰行氣破堅之藥

靈樞云虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留而內著寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨內傷骨為骨蝕有所疾前筋

疾前二字衍文也筋當作結

筋結不得伸邪氣居其間而不及發為

筋瘤有所結氣歸之衛氣留之不得反津液久留合為腸瘤久者數歲乃成以手按之柔已有所結氣居為昔瘤以手按之堅有所結日以易甚兼以聚歸之津液留之邪氣中之凝結深中骨氣因於骨骨與氣併日以益大則為骨疽有所結中於肉宗氣居之邪留而不去有熱則化而為膿無熱則為肉疽凡此數氣者其發無常處而有常名也

刺節真邪篇○此皆虛邪中人為病弗去而久留著故積歲累月而成疽瘤也

三因云瘰多著肩項瘤則隨氣凝結

岐天師曰瘰瘤不同瘰者連肉而生根大而身亦大瘤者根小而身亦大也即瘤之中又各不同有粉瘤有肉瘤有筋瘤有物瘤筋瘤不可治亦不必治終身十載不過大如核桃粉瘤則三年之後彼自然而破出粉如線香末出盡自愈亦不必治也肉瘤最易治用水銀礪砂各一錢血竭兒茶各三錢黃柏五錢冰片麝香各三分共為細末將此藥擦於瘤之根處隨擦隨落根小者無不落也物瘤則根大最難治不時而動無故而鳴或如蟲鳴或如鳥啼必須用刀破其中孔則物自難居必然突圍而出後用生肌神藥則瘤化為水平復如故矣

錄

又曰物瘤乃不敬神鬼觸犯歲君而得病不

可測非理可談故內經不言然世未嘗無此病也又曰瘰固不同形亦各異然皆濕熱之病也由小而大由大而破由破而死矣初起之時即宜用小刀割破略出白水以生肌散敷之立愈倘若失治



漸漸大來用藥一點點其陷處半日作疼出水其色白者易愈如黃者紅者皆難愈

張仲景曰人有手臂生瘡變成大塊更有肚上生瘡結成頑塊終年不去者或如拳頭大者必須用刀割去人必暈絕不可學也止用小刀略破其皮一分後以化毒丹敷之即化為水此方神奇不可輕視如足上生瘤如斗大者不必破碎治之止用針輕輕刺一小針眼以化毒丹敷之必流水不止急用煎方治之方用人參黃芪各三兩生甘草薏苡仁各五兩白芥子三錢水煎服二劑即消盡其水而人絕無遺憾此內外雙治之法然此方之妙乃補其本源之氣又利水而不走其氣刺其孔而出水未免大損元氣今補其氣又何懼水之盡出哉此方之所以奇也妙也

岐天師曰人有喉患大腫又非癭瘤忽痛忽不痛外現五色之紋中按之半空半實此乃痰病結成似瘤非瘤似癭非癭也宜消痰湯主之此方乃消上焦之痰聖藥也又有海藻昆布以去癭瘤之外象消其五色之奇紋妙在消痰而仍不損氣則胃氣健而痰易化也一劑知二劑消大半三劑則全消四劑永不再發此方兼可治癭證神效

秘錄

### 癭瘤門主方

清肝蘆薈丸

正宗

治惱怒傷肝肝氣鬱結而為癭堅硬色紫囊囊青筋結若蚯蚓遇喜則安遇怒則

痛者服之

生地黃

酒煮

當歸

白芍藥

川芎

各二兩

甘草節

昆布

川黃連

青皮

海蛤

粉 牙皂

蘆薈

各五錢

共為細末神麴糊丸桐子大每服八十丸白湯量病上下食前後服之無

不有效

通氣散堅丸

治憂鬱傷肺致氣濁而不清聚結為瘤色白不赤軟而不堅由陰陽失度隨喜怒消

長者宜服

黃芩

酒炒

石菖蒲

當歸

製半夏

陳皮

香附米

川芎

天花粉

海藻

白

茯苓 甘草 陳枳殼 桔梗 川貝母 人參 膽南星各等 研細薄荷煎湯疊丸豌豆大

每服一錢食遠服燈心二十根薑三片泡湯送下

琥珀黑龍丹 治五癭六瘤不論新久但未穿破者並效 天南星薑汁炒 五靈脂炒 海帶

海藻銹五 血竭兩 琥珀兩 廣木香銹麝香錢 各研細和勻煉蜜丸一錢重金箔為衣曬乾密貯

每服一丸熱酒一杯量病上下食前後化服如患在下部服後用美物壓之

破結散錦 治五癭極佳丹溪曰癭氣先須斷厚味 麥麵四 松蘿 半夏 貝母 海藻洗 龍

膽草 海蛤 通草 昆布 枯礬各三 研末酒服一錢日三忌鯽魚猪肉五辛生菜蠶物二

十日愈 一方加青皮

點瘤贅神驗方 凡瘤有六骨瘤脂瘤肉瘤膿瘤血粉瘤膿瘤即膠瘤也惟粉瘤與膿瘤可決餘瘤

皆不可決潰肉瘤尤不治治則殺人 桑柴灰 棗木灰 黃荊灰 蕎麥灰 桐殼灰各二升

以沸湯淋汁三碗澄清入斑貓四十個穿山甲五片乳香冰片不拘多少煎作二碗以磁器盛

之臨用時入新石灰調成膏敷瘤上乾則以清水潤之其效如神

枯瘤方 治瘤初起成形未崩者及根蒂小而不散者用之 斑貓二十 輕粉 白砒 礞砂 礪

砂 雄黃 黃丹 沒藥法去油各 大田螺三個去殼 共研極細糯米粥調勻捏作小基

子樣曬乾先灸瘤頂三壯以藥餅貼之上用黃柏末水調敷蓋藥餅候十日外其瘤自然枯落次

用斂口藥斂之

秘傳斂瘤膏 癭瘤枯藥枯落後用此搽貼自然生肌收口 血竭 海螵蛸 象皮 乳香法去油輕

粉 龍骨各一錢 研極細用雞蛋十五枚煮熟去白將黃熬油一小杯將藥和勻每日早晚用甘

草湯洗淨患上雞翎塗之膏藥蓋貼

灸法 先將瘤上用麪包好然後照其大小用杏核或桃核半個內填極乾人糞合瘤上以艾圓灸之知痛即止

秘方 用竹刺將瘤頂略略撥損油皮勿令見血入銅綠細末少許膏蓋自消 又方 極細生鐵屑醋拌放銅杓內煨乾再拌再煨如此三度研極細再以醋調敷上便覺瘤上不甚適意過一宿剝去再敷以平為度

瘤生面上初起 鮮蒲公英摘斷以白漿點瘤上乾了又點數日全消

丹瘤 朱丹溪 草麻子去殼研入麪一匙水調搽之甚效

生肌神散 岐天 治物瘤割破以此搽之 石灰 千年 三七根 麒麟竭 銘 三人參 象皮 乳香

油去沒藥 油去木香 銘 一兒茶 錢 輕粉 五 各為絕細末研至無聲為度修合時須用端午日不可使

一人見之

點瘰法 岐天 用此點在瘰之陷處半日作疼必然出水 水銀 鷹糞 綠礬 鵲糞 皂礬

輕粉 硼砂 銘 一潮腦 冰片 各五 麝香 分 研為絕細末用針刺一小孔然後乘其出血之時

將藥點上即粘連矣約用一分以人乳調之點上如雞頭子大一日點三次第二日必然流水流水之時不可再點點則過疼轉難收口矣三日後必水流盡而皮寬如袋後用煎方自然平復如

故

煎方 黃耆 薏苡仁 各一兩 人參 山藥 銘 三白芍 白茯苓 銘 五澤瀉 錢 猪苓 生甘草 陳皮

錢 一水煎服十劑全消如故但忌房事一月餘無所忌若犯房事必破不能收口終身成漏

消痰湯師岐天

白茯苓錢 鈹海藻

半夏

貝母

白芥子

天南星

人參

桔梗錢

昆布

生

甘草錢

附子分

水煎服

化毒丹景仲

人參錢

甘草錢

礪砂

冰片各一分

輕粉五釐

各為細末

和勻

搽上即化為水矣

灰漿膏胡公

消瘤神散

天南星

半夏各一兩

草烏煨存性

三味煎濃汁

去渣入木蓮蓬蒂上

白漿一二兩採時以蛤蜊殼攪勻再用石灰片以竹片烘成炭為度

徐徐投下調成不稀不厚膏子入

磁瓶收貯黃蠟封口用時如乾以唾津潤開敷瘤上或木蓮蓬漿潤敷尤妙二三日即愈

消瘤門

銀爐上飛灰一斗入水煎數十沸用棉布濾去渣取清汁入川大黃八兩煎好濾去大

黃不用

又用礪石灰一觔放鉢頭內將灰汁傾入鉢內再入蟾蜍生南星各三兩研為細末和

入汁內收貯看瘤大小用羊毛筆蘸汁掃瘤上一日掃十二三次三日自枯其瘤落下如去皮石

榴將白靈藥搽之三日消盡又用紅升藥搽上生肌長皮再上鉛白霜自然全愈

消瘤法

俟人家入殮時釘棺斧聲敲一下以手按瘤一下斧聲敲亦止其瘤自消

頸上瘰癧不疼不痛俱是痰結

川黃柏

海藻各一兩

研細收貯每用五分放手心上以舌舐之

一日三五次即消

消瘤

礪砂

阿魏各等

麝香少

研細末以大蒜搗爛看瘤大小敷之自消

禁瘤法

每年行此法一次其瘤即不長大凡遇死屍將死人手在瘤上一摸可保一年不長次年

又行此法又保得一年不長終身行之則其瘤皆如初起時也若空一年不用死人手摸其瘤即

大



癰 癰



癰疽門主論

寒熱篇帝曰寒熱癰癰在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣也留於脈而不去者也鼠瘻之本皆在於臍其末上出於頸腋之間其浮於脈中而未內著於肌肉而外為膿血者易去也帝曰去之奈何岐伯曰請從其本引其末可使衰去而絕其寒熱按其道以予之徐往徐來以去之其小如麥者一刺知三刺而已帝曰決其死生奈何岐伯曰反其目視之其中有赤脈上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死見赤脈不下貫瞳子可治也

外臺祕要曰肝腎虛熱則生癰癰

病機云癰癰不係膏粱丹毒火熱之變總因虛勞氣鬱所致止宜以益氣養榮之藥調而治之其瘡自消不待汗之下之而已也

朱丹溪曰癰癰必起於足少陽一經不守禁忌延及足陽明經食味之厚鬱氣之久曰毒曰風曰熱此三端拓引變換須分虛實實者易治虛者可慮此經主決斷有相火且氣多血少婦人見此若月

水不調寒熱變生稍久轉為潮熱自非斷慾食淡神醫不能療也 又曰灸瘰癧法取肩大肘大骨

縫交接處各一穴即手陽明經肩各灸七壯在左灸左在右灸右左右俱病者俱灸之余常用之甚

效薛氏以曲池云附勝似未的也

薛立齋曰凡男子婦人若因恚怒傷肝氣血壅遏而不愈者宜灸此穴以疎通經絡如取此穴當以

指甲掐兩肘兩肩四所患處覺有痠麻方是其穴此治瘰癧之秘法也

戴復庵曰瘰癧之病皆氣血壅結根在臟腑多結於頸項之間纒纒大小無定發作寒熱膿血潰爛

此沒而彼起

王肯堂曰單窠癰者生一個也發於頸項最難治或發於顙骨亦難治用毒藥療之勿令浸漬日久

準

又曰蓮子瘰一胞裹十數枚生於項之左右以手觸則能轉動尚可用藥治療如堅硬挨不

動者乃不可生憎寒發熱躁渴凡遇此證至難治雖神聖亦無如之何也已 又曰重臺癰生於頸

項或左或右初則單窠結在上或在下重疊見之是名重臺癰此證藥不可療不可針灸若是盡行

其腫痛發渴生疾百死一生害人極速初覺有之急用小犀角丸粉金散治之 又曰燕窠癰形似

燕窠不可治

陳遠公曰有生疾塊於項堅硬如石久則變成瘰癧流膿流血一塊未消一塊復長未幾又潰或耳

下或缺盆或肩上脇下有串走之狀故名鼠瘻又名串瘻言如鼠之穿也人謂食鼠竊餘以成此證

而不盡然也蓋此證多起於痰疾塊之生多起於鬱未有鬱而生疾無疾而成瘰癧者也故治法

必以開鬱為主然鬱久氣血必耗況流膿血則氣血更虧消痰而不解鬱解鬱而不化疾皆虛其虛

也消串丹白芍兩白朮兩柴胡錢蒲公英錢茯苓錢陳皮錢附子片甘草錢天花粉錢紫貝錢天葵錢

水煎服八劑痰塊漸消又十劑盡化又一月全愈愈後服六君子湯為善後計不再發也此方妙在蒲英天葵為消串神品然非佐以柴芍則肝木不平非助以苓朮則脾胃土不健又何能攻痰破塊哉惟其有攻有補又得附子之力引各味直擣中堅所以能除夙痰於旦夕耳水鑑又曰有久生瘰癧頸間盡爛且及於胸膈無非痰塊以至身體發熱發寒肌肉消瘦不思飲食自汗盜汗驚悸恍惚此證原難醫治然治得法亦在可救也夫此證初起宜解鬱為先佐之補虛以消其毒倘執尋常治法以祛痰敗毒為事鮮不速之亡矣用轉敗丹人參二柴胡錢三白芍錢三金銀花三當歸二半夏錢五白朮一生甘草錢水煎服四劑痰塊在胸者盡消又四劑頸上潰爛亦愈將方減半再服十劑瘡口盡平不再發也此方補多於消而開鬱寓於中化痰存於內人從未有知此治法但一味攻毒所以愈壞也殺運無窮神方難信人見此方無不訕笑者誰知乃祛病之仙丹奪命之異藥哉余不勝掩卷嘆息也

陳實功曰夫瘰癧者有風毒熱毒氣毒之異瘰癧痰癧筋癧之殊當察而治之風毒者乃外受風寒搏於經絡先寒後熱結核浮腫治當散其風除其濕熱毒者乃天時亢熱暑中三陽或內食膏粱厚味釀結而成色紅微熱結核堅硬治當清其脾瀉其熱氣毒者乃感冒四時殺厲之氣而成其患耳項胸腋驟成腫塊令人寒熱頭眩項強作痛治當調其血和其氣瘰癧者纍纍如貫珠連接三五枚其患先小後大不作寒熱初不覺疼日久漸痛堅硬如碁子大小如梅李繞頸延腋得之於誤食蟲蟻鼠殘之物又或汗液宿水陳茶混入而殮乃食毒鬱結之久病也最難消散治當散其堅和其血痰癧者初起如梅如李生及遍身久則微紅後必潰破易於收斂此乃飲食冷熱不調饑飽喜怒不常多致脾氣不能傳運遂成痰核治當豁其痰行其氣筋癧者生於項側筋間形如碁子堅硬大小

不一或陷或突久則虛羸多生寒熱勞怒則甚此乃憂愁思慮暴怒傷肝故令筋縮結蓄成核治當清其肝解其鬱宗正又曰如寡婦尼僧鰥夫庶妾志不得發思不得遂積想在心過傷精力此勞中

所得者最難調治有此先養心血次開鬱結益腎安神疎肝快膈如歸脾湯益氣養榮湯俱加香附青皮山梔貝母木香之類是也又曰男子不宜太陽青筋潮熱咳嗽自汗盜汗女人忌眼內紅絲

經閉骨蒸煩熱後必變為癆瘵忌用巴霜牽牛斑貓大黃追蝕等藥往往剋伐太過致其危亡者多矣切宜戒之慎之又曰蛇蟠癰繞項起核者是又曰耳項胸腋驟成腫核色紅微熱寒熱頭痛

此乃風寒暑熱之暴病也此證易於消散宜用荊防敗毒散加貝母夏枯草不應再加軟堅開鬱之品又曰瓜藤癰自頸項延及胸腋者是

馮魯瞻曰凡頸項眉頰結核久凝皆為氣血太虛切勿攻剋錦囊又曰瘰癧者先賢名曰九漏是由

其人陰虛火盛衝擊關津管束之處而又過食煇炙風痰熱毒相搏而結成頑核鬱滯不散久則內

潰而為瘰癧治宜養陰和肝理脾舒鬱化痰清利切勿徒事剋伐以損真元若夫嬰兒產下因胎毒而即患者此稟母之肝膽二經火鬱氣滯亦宜平肝滋腎化毒為主蓋瘰癧之源雖由於肝實根於

腎夫肝火之有餘乃腎陰之不足也故其本在臟其末上出頸腋之間若浮於脈中未著於肌肉而為膿血者易去也若反其目而視之赤脈貫於瞳人如見一脈即一歲死見一脈半即歲半死二脈

三脈亦如之若赤脈不見庶可治也其始必發一枚次必連生大小十數纏繞項下先腫作膿穿破難乾故名漏項若在胸傍或兩脇者此名馬刀至若其口深黑內潰蝕爛穿透咽喉飲食不進目腫

舌出耳出黃膿者不治更有無故寒熱身體頸項結核如瘰及心胸腹背皆有堅核而不痛者此名為結風氣腫也審其是風是火或虛或實治之又曰瘰癧者手足少陽蘊熱結滯而致也二經多

氣少血所以結核堅而不潰延蔓串通若陽明經則氣血多而潰矣即俗名爛癰惟少陽起者當從本治俗醫不知槩以毒藥攻之如負薪救火為害更甚元氣弱者反成癆瘵矣 又曰夏枯草能散結氣而有補養血脈之功能退寒熱虛者儘可用之若實者佐以行散之藥外施艾灸亦漸取效 又曰凡結核或在項或在臂或在身或在耳後或在頂門如腫毒不紅不痛不作膿者皆是痰注氣滯不散不外乎曰痰曰氣曰熱三者久而不已則成癰癰宜早治之大抵因七情之氣鬱結或因飲食之時觸犯腦怒遂成此疾婦人女子患此最多治宜開鬱順氣利膈化痰清肺然未有不由陰虛火旺而有癆瘵根脚者更宜兼乎補陰乃其治也

周文采曰癰生於頭項上交接名蛇蟠癰宜早治之

啓玄

李東垣曰癰癰結核寒熱發渴經久不消者其人面色痿黃潮熱上蒸已成膿也

十書

申斗垣曰九漏癰名曰狼漏其根在肝因所欲不遂蓄怒而得曰鼠漏其根在胃因食鼠食之物胃受毒而播於肝曰膿漏其根在膽因志不遂而得之曰螻蛄漏其根在大腸因食螻蛄及蝎虎所傷之物誤食之而得曰蜂漏其根在脾因食蜜物及蜂毒得之曰蜈蚣漏其根在肺因食蜈蚣所遊之物而得之曰蟻螬漏其根在心因喜之太過而得之曰癰癰漏其根在腎因食血髮及諸腎得之曰轉脈漏其根在小腸因驚恐失枕而得之故癰癰古人稱為九漏此之謂也

竇漢卿曰獨形者為結核續連接結者為癰癰此證原非膏粱之變乃虛勞氣鬱所致宜服益氣養榮之劑忌用金石暴悍之法徒傷氣血 又曰潰後宜十全大補湯加貝母香附遠志

汪省之曰癰癰初起者用四稜鐵環按定針一孔以紙捻紐之勿令合口以絕其源功效甚速

理例

胡公弼曰夫癰癰者乃頸項堅結之核也或在耳前或在耳後或在耳下皆屬手足少陽經多氣少