

遊之死證五有餘者謂身熱如炭煩躁如格人迎
 躁盛喘息而氣逆此五病氣之有餘二不足者病
 雖一日數十溲太陰脈微細如髮亦病氣之不足
 陽明主表外得五有餘不能行氣於表之三陽太
 陰主裏內得二不足不能行氣於裏之三陰此其
 身之表裏陰陽皆為動搖其死明矣

厥論

太陰之厥則腹滿脹腹後不利
 足太陰少陰入腹屬脾故厥則腹滿脹腹食飲
 入胃脾為轉輸逆氣在脾故後便不利
 少陰之厥則口乾溺赤
 足少陰腎脈厥逆則肺金不能通調於下故溺
 赤

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹泄瀉不利
 足厥陰之脈內抵小腹候胃屬肝諸臟故厥則
 少腹腫痛而腹脹其下陷陰股入毛中環陰器抵
 少腹是以泄瀉不利
 厥陰厥逆掌腫痛盛滿前閉

厥者肝之表也盛滿者食氣不能散精於肝也
 前閉者肝主疎泄也
 二陰俱逆不得前後使人手足寒二日死
 三陰俱逆自陰與陽別矣不得前後者陰別於
 下也諸陽之氣皆生於陰三陰俱逆則生氣絕滅
 是以手足寒而二日死

霍亂病論

三焦者決瀉之官水道出焉
 三焦下俞出於委陽附太陽之正入絡膀胱約

下焦實則閉塞虛則遺瀉三焦主氣氣化則水行
 故為決瀉之官也
 膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣
 膀胱為水腑乃水液都會之處故為州都之官
 水穀入胃消滯泌別汁而下焦而滲入膀胱故為津
 液之所藏氣化則水液運行而下出矣

五臟別論
 魄門亦為五臟使水穀不得久藏
 魄門肛門也上合於肺故名魄門五臟之薄使
 此而出故亦為五臟之下竅腸胃之腐穢從此而
 瀉出故曰水穀不得久藏

氣厥論
 黃帝問曰五臟六腑寒熱相移者何岐伯曰胞絡熱
 於膀胱則遺溺血
 膀胱者胞之至也衝任起於胞中為經血之源
 胞絡熱於膀胱走經血之邪投於膀胱故溺血熱
 則水道燥溺尿澀閉也

五常政大論
 瀉流之紀其病發因邪得腎也
 腎開精傷其官而腎氣不化也
 五氣所勝五氣者
 五氣所勝則不利為腎不封其門遺溺
 腎氣甚曰二焦下陷出於委陽附太陽之正入
 絡膀胱約下焦實則閉塞虛則遺瀉通調補之
 陽明司天之政初之氣小便黃赤

陰疑於外則陽鬱於內故民病便赤
 調經論
 形有餘則腹脹泄瀉不利
 形不足則便溲小便也
 至要要大論

太陰司天濕淫所勝大便難
 少陰司天熱淫所勝民病溺色變
 少陰之脈小便黃赤
 厥陰之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤

少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤

少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤

少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤

少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤
 少陽之脈小便黃赤

註木淫而生火也

少陽之勝耳聾流赤

熱淫於下則爲溺赤

少陰在泉客勝則泄便黃

漫便變黃水火相火注於下也

太陰在泉客勝則便黃不時

此在泉之濕氣客於太陰之經下及於內也

諸病水液流注清冷皆屬於寒諸病及以水液渾濁皆屬於熱

以反泄了尿也

利熱篇

肝熱病者小便先黃

肝主疏泄故小便黃赤

當櫻

邪氣滅精病形篇

肝主謀慮肝氣盛而熱故遺溺也

肝脈微滑爲遺溺

脾脈微滑爲遺精

脾爲陰也少土其熱則爲喘病爲小便閉難

腎爲生氣之源開竅於二陰氣虛不化故不得

前後有熱則小便閉澀爲等九應者

皆傷生有篇

故帝曰願聞下焦之所出岐伯答曰下焦者別迴腸

注於膀胱而滲入焉故水液者常注於胃中或精

粕而俱下於人腸而俱下焦寒而俱下泄逆則汁滯

下焦而滲入膀胱也

註下焦之部者在胃之下口別毛氣迴腸注於膀胱而滲入焉故水液者常注於胃中或精粕而俱下於人腸就下焦之氣亦逆則汁滯下焦之經而滲入膀胱氣化則出矣

新氣篇

神乎太陰之脈矣主肺所生病者氣虛有餘則肩背

痛風寒汗出中風小便數而人氣虛則肩背痛寒少

氣不足以息溺色變

氣之盛虛者謂太陰之氣也溺色變者氣虛而

不化也

胃足陽明之脈有餘於胃則消穀善饑溺色黃

氣盛於內也

肝足厥陰之脈是主肝所生病者胃滿噎逆泄狐

疝遺溺閉瘕

肝氣虛則筋泄遺溺實則閉瘕

五癰津液別篇

天寒則腠理閉三焦之氣因遏而不行津水下

流於膀胱則爲溺與氣氣化而出者爲溺藏於膀胱者化生太陽之氣也

五味篇

酸走筋多食之令人癯酸入於胃其氣源以收土之

酸走筋能出入也不出則留於胃中胃中溫則下

注膀胱膀胱之脈薄以候得酸則筋絡約而不通水

道不行故酸澀者損筋之所終也故酸入而走筋

酸氣收澀故能能出於土之兩焦不出則留於

門而滯於下焦注於膀胱矣膀胱爲肝之室貯尿於中故膀胱之體質薄弱以得得酸則易於縮澀

縮則約而不通水道不行故爲癰閉除者前陰積

前者宗動也宗筋者筋之主也酸入於宗筋故走

筋也

九鍼篇

膀胱不約爲遺溺下焦泄爲水

膀胱不約而爲遺溺下焦如漚水通出焉病則

反泄而爲水病矣

漢張機金匱要略

大便難

五臟篇曰脾而閉者厚朴三物湯主之

浮滿相搏大便則堅其脈爲約麻子仁丸主之

消渴篇曰太陽陽脈數胃中有熱即消穀引食大便必

堅小便即數

小便數

消渴篇曰太陽陽脈浮而數浮即爲氣數即消穀而大

堅氣盛則數數數即堅數相搏即爲消渴

小便不利

濕熱篇曰太陽而關節疼痛而煩躁沉而細者此名

濕痺之候小便不利大便反快也當利其小便

血虛篇曰男子脈虛沉按無氣熱短氣寒者小便不

利面色白時目眩寒者少腹滿此爲勞使之然

虛勞篇曰小腹拘急小便不利八味散丸主之

治渴篇曰小便不利者有水氣其人若渴苦憂憂

九注之

小便不利滿腹散主之滑石白朮散茯苓澤瀉散

主之
小便不利滿腹散主之滑石白朮散茯苓澤瀉散

水氣留而水者身面四肢腫其脈沉小便不利
故令癰水假如小便利此亡津液故令渴也越婢
加木湯主之

跌陽脈沉伏反數本自汗出滑數小便數今反不
利此試水

寸口脈浮而渴浮脈則熱渴則熱熱滑相搏名曰
沉厥陽脈浮而渴浮脈則熱數脈即止熱止相搏名
曰伏伏相搏名曰水沉則絡脈虛伏則小便難虛

難相搏水走皮膚即為水矣
少陰脈沉而沉脈則為沉沉則為水小便即難脈得

諸沉實者有水身體重水病脈出者死
水病人目下有黃目下黃者水在脾水在脾則

水腫大小便不利其脈沉者有水可下之
問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿問者何也

答曰此法當飲水若小便利及汗出者當自愈
辨水者其脈大四肢苦重津液不生但苦小氣小便

難
辨水者其脈大四肢苦重津液不生但苦小氣小便

難水者其脈大四肢苦重津液不生但苦小氣小便

難水者其脈大四肢苦重津液不生但苦小氣小便

難水者其脈大四肢苦重津液不生但苦小氣小便

難水者其脈大四肢苦重津液不生但苦小氣小便

問曰病者苦水而面身體四肢皆腫小便不利脈之
不言水反言胃中氣上衝咽狀如痰肉當微欲嘔

當如師言其脈何類師曰寸口脈沉而緊沉為水緊
為寒沉緊相搏結在關元始時當微年盛不覺渴

之後年節相干陽損於盛衰微動腎氣上衝喉咽
塞噎咽下急痛腎氣為重而天下之氣擊不方其

病不除後重吐之胃未虛煩咽燥飲水小便不利
水穀不化面目手足浮腫又與厚脈九下水當得

小差其飲過度應復如前胃苦痛案若每死其水
揚溢則浮狀喘逆當先攻擊氣令止乃治飲止

其喘白差先治新病病當在後
黃疸醫曰臥陽脈緊而數數則為熱熱則消穀緊則

為寒食即為滿凡脈浮為傷風臥陽脈緊為傷脾風
寒相搏食穀即吐穀氣不消胃中苦渴渴裏下注小

便不通言被其寒熱流膀胱身微重其名曰穀也
陽明病脈遲者食難用飽飽則煩煩則小便必難

此飲什穀迫難下之腹滿如鼓所以然者脈遲之故
也

大病過黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其
證也

脈近渴飲飲水小便不利者皆發黃
黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為求和裏實當

下之宜大黃硝石湯
晉王叔和脈訣

大小便頻數
肺脈軟曰肺脈浮實黃門燥又得大便難且黃身

內乏脈香

浮脈軟曰肺部見之氣入肺大腸乾澀故難通

難病軟曰胃氣敗痛滿急心下牢強乾嘔頻手足
煩熱脈細小便澀先多驚

實脈軟曰下部如繩按指來脈軟小便澀不禁
洪脈軟曰洪向尺中沉若足小使赤濁脚膝疼

沉脈軟曰沉在尺中沉脚重小便稠數如甘
尿色難辨生死候軟曰體重溺出時不止肉緩六日

便高熱
唐孫思邈千金方

閉塞
人因因時寒後得閉塞不通遂致天命大不可輕

之所以指遲遲非死病若不明藥何者拱手待斃深
可痛哉服藥諸方以虛谷罕耳凡大便不通皆因滑

膩之物及冷水若通也凡用黃者即知大便難
宋朱肱活人書

大便
問手足逆冷而大便秘小便赤或大便黑名脈沉而

滑曰此名陽毒假冷也重陽必陰重陰必陽寒暑之
變也假令手足逆冷而大便秘小便赤或大便黑名

其脈沉而滑者皆陽毒也輕者白皮赤身者水氣湯
傷寒下血氣不通四肢逆冷此是伏熱深故厥

熱深連用大承氣加分劑下之汗出之差
熱厥與陰厥自不同熱者微熱即發熱陰厥即

不發熱四逆逆冷惡寒脈沉而細大小便滑者
問有數日不大便有久難解有大便秘有燥屎有

大便滑曰傷寒數日不大大便大便便及有燥屎者知有
用大柴胡大承氣小承氣之然仲景論大便不通

亦有數種不可攻者

仲景又有陽結陰結之論不可不別也其脈浮而數能食不大便此為實名曰陽結宜用小柴胡湯所謂和其營衛以通津液殺不了得屎而解也其脈沉而遲不能食身體重大便反艱名曰陰結宜用金液丹所謂得陽盛則陰除陰盛則結促結同也

又問大便澀者何也古人云或火不及寒乃大行其痢蓋澀大率病入時中有寒即大便澀蓋澀者胃中冷水數不別故也華佗云寒即清熱即結仲景說初難後滑有一証小便不利小便少者水數不分耳

小便

問小便不利小便澀曰傷寒發汗後小便多亡津液胃中極乾故小便不利發見小便不利在往利之誤矣類編云胃中乾則無小便澀不可利故仲景云下之後復發汗小便不利者亡津液耳若傷寒引飲下焦有熱小便不通澀者主發散厥者傷寒者湯也表不解心下水發熱而飲小腹滿小便不利者小青龍湯去麻黃加茯苓也傷寒無汗者發熱頭項強痛小便不利者桂枝湯去桂加茯苓白朮也噎而發熱胃弱心下怔忡小便不利者小柴胡湯去黃芩加茯苓少陰滿小便不利者四逆湯加茯苓也大抵中濕與發黃以利小便為先陽明汗多以利小便為戒

又問小便澀何也曰陰虛故也陰虛者陽必溼之為陽溼也故小便黃者中有熱也重濕鬱滯石之類瀉之太陽病發汗遂滿不止其人惡風小便難四肢微重難以屈伸者桂枝加附子湯主之陽明中風脈

並浮大短氣腹滿下及心痛身乾不得汗嗜臥身黃小便澀難熱而瘕者小柴胡加茯苓主之

問小便自利小便數曰太陽證下焦有熱小腹必滿臍下小便不利而小便反利者下血證也抵當湯主之陽明證自汗出小便不利者自利者津液內竭也屎雖硬不可攻也常用蜜煎導之少陰證四逆而小便自利者虛寒證也四逆湯加茯苓主之

又問小便數者何也曰腎與膀胱俱虛而有客熱乘之二經既虛致受於客熱盛則不能制水故令數小便熱則水行澀澀則小便不快故令數起於其熱陽脈數胃中熱即消飲引飲大便必硬小便即數太陽病自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡寒腳攣急者小便數者機不可行桂枝湯與甘草芍藥湯芍藥甘草湯大抵澀數則大便難而滑甘草祛風汗而滿浮則胃氣強滿則小便數浮滿相搏大便難其理為灼麻子仁丸主之太陽病若汗若吐若下後微煩小便數大便固難者小承氣湯和之愈

又云傷寒脈浮口汁小便數者胃中不和譫語者少與調胃承氣湯

問一身盡痛發熱身黃小便不利大便反快者曰此名中濕也張南陽發虛山澤氣人多云濕濕重關節痛身身體痛並其狀說為中濕一身盡痛發熱身黃小便不利者木陽湯若小便不利大便反快當利其小便宜甘草附子湯五苓散主之

遺尿

問尿澀身重難以轉側口中不仁面垢遺精遺尿曰此三陽合病也白虎湯主之不可發汗汗之則譫語

下之則額上生汗手足逆冷若自汗者白虎加人參金剛完素膏

大小便澀

問俗作秘大便澀澀也熱耗其液則熱結而大腸燥澀致微也謂之熱結者謂火甚則金不能平木則肝木自旺故也故大便澀而面黃燥熱在於腸胃之外而濕熱在內故也裏同利則後重之義

大腸小腸發熱名虛熱津液耗散不能滑利乾結而大腸澀燥極而主之

小腹痛不得大小便邪氣入客於而不行故氣氣不得通也枳實丸主之

小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便上滿清澀太陽直行從臍入傷於臍氣下澀於臍時出清澀不止腎著湯主之

食已如飢腹熱能消穀腸鳴腹結心火上行心煩煩而黃小便赤澀也

元李果十書

結燥論

金匱真言論云北方無色入通於腎開竅於二陰藏精於腎又云腎主大便大便澀者取足少陰夫腎主五液津液潤則大便如常若便澀者取足少陰夫腎主傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散而陰津液虧少故大便結燥然結燥之病不一有熱燥有陰燥有陽結有陰結又有年老氣虛津液不足而結者有治法云腎虛急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦泄之陽結者散之陰結者瀉之仲景云小便利而大

人風人津液少而硬者宜以藥而滑之用胡麻仁可膠等是也如家以峻利藥達之則津液走氣血耗雖暫通而即秘矣必更生他病且少府患此決有人以獻藥利之者累矣後為肺痿咯血卒至不通而死

小便不禁

小便不禁者屬陽虛感熱者五苓散加附子虛者五苓散加四物
小便不禁有虛熱虛寒之分內虛寒自汗者祇九母三因甚子丸
內虛熱者六味丸或八味丸加杜仲骨脂五味老人宜八味丸減澤瀉為妙

因有虛寒腎虛以此一藥數分而回惟利砂用伏火者及治病有差所治者小便數而不禁怔忡多忘驚悸不已不同耳見其不同蓋而詳之乃得此治法不若且泛論之經云腎主小便便閉主小便淋瀝經云小便溺者亦是血虛及便溺皆皆皆出心與心腸南方赤色顯於外也經云下焦如瀉者且謂人小便便也大便為陰者有形氣化乃下焦之下者也謂腎主大便不言人賜者明子行父通為腎臟病小便為陽為無形氣化乃下焦之上者也謂腎主小便便通亦是子行父通為陽凡諸無形氣化者皆屬病所主謂有形氣化者皆屬病所主此二說俱在下焦則同但有形無形及在病在臟有味無味因胃敗不言心火者以其前火代行其政分故也細分之則膀胱主水盛有大小溺者不傳入陰故為淋瀝血利不禁者有實者目不傳陰則陰不病何為有邪

此為為陰之體也為陽之用也大地陰陽互為體用以斯可見是明五臟為六腑所用六腑為五臟所用明矣是有形者為陰陰大小便不禁是膀胱不禁為遺溺此不傳陰是丹田經絡受寒動土時此大便清濁皆兼有形有病者宜在膀胱其所兼在臟也

小便不通

小便不通有氣虛血虛有痰風閉實熱氣閉用參芪升麻等先服後吐或參芪桑中探吐之血虛四物湯先服後吐或為歸海湯中探吐亦可痰多二陳湯先服後吐已皆用探吐若痰氣閉塞二陳湯加木通香附探吐之以提其氣氣閉則小便自降蓋氣承載其水也有實熱者當利之砂淋瀝調車牛六一分或山梗之類有熱有濕有氣結於下宜清宜燥宜升腎主水膀胱為之腑水瀦於膀胱而滲於小腸腎相通也然小腸獨居於心者何哉蓋陰不可以無陽水不可以無火水火既濟上下相交此案南所以流行而水實關固所以不失其可止性火心腎不交陰陽不調故內外閉格而水道壅滯送夫度而小便清熱則不通冷則不禁其熱者小便閉而絕無其熱者小便難而僅白腎與膀胱俱虛寒者之故不能利水水按然而行蓋是以數起而溺有餘詳腎與膀胱

就但令內氣不充故胞中自滑所出多而色白是以遇夜陰夢多矣小便遺滑又當調出其氣

秘結論

內經曰北方色入通於腎開竅於一陰秘精於腎夫腎主五液故腎實則津液充而大便滋潤腎虛則津液竭而大便燥結其所由者勞過度飲食失節或飲酒過飽過食辛辣飲食之失起於脾胃濕熱之火起於命門以故火盛水虧津液不生故傳遺失常漸成結燥之證是故有風燥有燥有陽結有陰結有氣滯結又有年高血少津液枯涸或因有所脫血津液基竭種種不同因證一側而推為詳公詳秘燥之入法治燥者潤之以大黃當歸桃仁麻子仁柳李仁之類風燥者加以防風羌活秦艽白朮之類九以煉蜜取其潤燥以助傳導之勢故其散而疎通矣仍多服桃仁生津之劑助其真陰攻下雖暫得通快必致再結愈甚及服成劑根固卒難調治或有血虛脈大如鼓宮絞熱而大便結燥者其不可發汗汗之則害亡津液閉結而死此醫殺之耳活人書有聖約證謂因強解約約未津液不得固但但輸勝此故小便便數而不禁利約約九以下之結燥使勝潤結化津注入便而愈

小便赤澀

汗多而小便赤澀者月多有此悉感腎所飲既多小便便及澀少而赤澀上停為候外停於津津澀不通小便

將瀉閉則水不運下五苓散一名導瀉內有木桂收
汗痞者善導狀各分水道收其在外面使之內又從
而利導為發者敏之導者通之義取於此然有虛勞
汗多而小便赤澀者是內五淋枯澀既去不能
生津故瀉而亦不宜過用通小便之劑調其腎水
性溫潤肺肺十全大補湯養榮湯之類選用
汗者心液心主血養血則心得所養汗止津生不待
通瀉而自清矣諸失痢血及患癰毒人忽有小便赤
澀之證此亦是枯竭不潤之故

戴思恭治要訣

大便秘

有風秘冷風秘熱秘又有老人津液乾燥是名虛
證婦人分產亡血及發汗利小便病後血氣未復皆
能作秘俱宜麻仁丸風秘之病由風燥肺燥傳於大
腸故傳化難或其人素有風病者亦多有秘宜小續
命湯去附子倍芍藥入竹瀝兩般微許實者各脾約
麻仁丸虛者各養正升命湯由冷氣橫於腸胃疑陰
固結津液不通胃道秘塞其人腸內氣攻喜熱惡寒
宜養正氣散加枳殼黃桂各半錢吞半碗九熱藥
多秘雖確實錢而通藥多泄性實通肥腸而止泄
氣秘由氣不升降降氣不行其人多噎宜蘇子降氣
湯加枳殼各養正升命丸來復升未效佐以木
香檳榔丸欲其腸胃開暢時欲得冷或口舌生瘡此
熱秘也赤身熱腸胃脹悶時欲得冷或口舌生瘡此
由大腸熱結宜四順清導飲香願婦人成木香檳榔
丸有氣作疼大腸結用通劑而便愈不通又有秘
氣既飲通之雖通復閉或迫之便通因時下血者此

惜當順氣順便自通順氣之法又當求通機之劑
曾有下巴豆藥不通過丹陷却通不可不知

老人虛秘反出汗利小便過多一切病後血氣未復
而秘者宜蘇子降氣湯倍加結霜威靈仙丸或肉黃
飲菴蘇順腸丸九宜
宿食留滯結而不通腹脹氣急胃中痞滿宜威靈丸
加巴豆
凡諸秘服藥不遇或兼他證不受藥者用蜜皂角導
冷秘生藥導亦佳

閉塞

古名曰癰者秘也不通為輕不約為瀉小便清澀澀
痛者謂之淋小便急急不通者謂之閉五苓散燈
心湯調服者多有此患止宜本藥閉而不通證下
服為難則以燈心湯調五苓散或溫熱湯調獨味或
珀末仍令其以鹽調下更通之以此水
若服涼藥不效者是冷秘宜炒鹽煎其小腹或洗熱
湯澀沉有微感而小便不通急用通劑急其宜以鹽
黃鹽中就鹽上炒其十末壯

頻數遺尿

小便多者乃下元虛冷腎不攝水以致滲泄宜芡絲
子丸八片九元元月生利鹿茸丸
有人每日從早至午前定尿四次一日之間又自無
事此腎虛所致亦係精氣早泄而尿愈多日又復
然者也
若小便常急頻數數多而所出常少放了復急不瀉
痛如非淋證亦有小便頻少頃忽再出此少者多因
自忍尿或忍尿行房而然生精玉散散澀薄為

之舉如阿膠一錢吞八味丸此丸須用五味子者
腫腎遺尿者此亦下元冷小便無禁而然宜大菟絲
子丸附地黃碎而湯下

有夢者致小便多日夜無度乃尋傷心火與小腸
為表裏宜分清飲四七湯各半貼和煎以辰砂妙
香散吞小菟絲子丸或元陽丹
小便不禁出而不覺赤者有熱白者氣虛也
王翰明醫雜著

不禁溺數

小便不禁或頻數數多方多以為寒而用溫瀉之藥殊
不知屬熱者蓋膀胱大邪妄動水不得寧故不能禁
而溺數來也故平老人多頻數者是膀胱血少陽火
偏旺也治法當補膀胱陰血火邪為主而佐以收
澀之劑如牡蠣山茱萸五味子之類不可用溫藥也
病本屬熱故宜傷火因水不足故火動而致小便多
小便既多水益虛矣故宜補血瀉火治其本也收之
道之治其標也
推英醫學綱目

閉塞

閉塞合而言之病也分而言之有暴久之殊蓋閉
者暴病為溺閉點滴不出俗名小便不通是也蓋者
久病為溺淋淋瀝點滴而出一日數十次或百次各
淋非是也
小便不通腹下痛狀如覆絞痛悶悶忍若乃腸胃乾
澀而氣不下故經所謂膀胱者州都之官津液藏
焉氣化則能出失故腹中者臣使之官三焦相火腎
為氣海也王註曰膀胱津液之腑胞內居之虛少腹

聞毛內若得氣海之氣施化則速便注下氣海之氣
不及則體靈不通故不得便利也先用木香沉香各
三錢酒調下或八正散皆則宜上湧之令氣通達使
自通利經絡所謂病在下上取之正計曰熱攻於上不
利於下氣盛於上則辛溫散之苦以熱之
小腹痛脹如覆杯者實其法有二氣蓬塞於下者用
吐法以提之血瘀於下者用桃仁之類以破之
不利

經云腎主膀胱膀胱者津液之類也水液出焉是屬
連肺故將兩臟三焦者中瀆之腑也水液出焉是屬
肺則腎之類也又云膀胱者州都之官津液藏焉水
氣化則腎之類也是言之膀胱藏水三焦出水治小
便不利故制灸法但取三焦穴不取膀胱也小腸屬
腎膀胱東垣用清肺飲子滋腎丸利小便便是也

大便燥結
燥有風燥熱燥火燥氣血虛燥許燥門結有能食脈實數者爲陽結不能食脈弦微者爲陰結亦有年高氣血虛結者

燥屬少陰津液不辛以潤之結屬太陰有燥甚苦以瀉之凡結後仍服瀉血生津之劑免其再結再遇愈傷元氣

濕熱燒心心腹脹滿有蟲積者檳榔九凡燥結有時者爲實無時者爲虛有藥石毒者大小便閉氣厥如鼓者三和散合三黃湯飲食毒者香連丸胃火者白

津少因發汗利小便過多及產後失血等症血枯液耗

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

者五仁丸腎氣丸大補陰丸或導滯通幽湯加檳榔
條芩陳皮氣虛者參仁丸補中益氣湯按七情者古

卷之四

服藥見黃清熱等則血中有凝滯始覺結滯者古牛
疏丸古蘇附湯五積散冰冷與之其病雖宜服陽藥
若大便不通者常暫與潤劑以發通之不令閉結
七情氣閉後重窘迫者三和散六磨湯脈浮甚便難
者陳皮杏干等分蜜丸服脈沉夜便難者換桃仁

痰滯不

傷熱物。

備急丸

榮廷

山
卷

證胃強脾弱約束津液不能四布但輪膀胱故小便數而大便難此脾約丸之由制也但脾屬陰虛火熾金耗則肺失傳化尤宜滋陰養血在西北壯實者以脾約丸開結可也東南氣血虛者潤燥爲主
遇月冷熱脫法淹難法麻油導法

小

經曰勝

主水畜

大盛則

更月同

但聞而

下版者

下或擣

行後而

者導赤

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

物理量

實少許血脈失和。初因四散合全三黃湯加五味子山藥
丸大梔枳子丸。平九遇夜陰虛愈多。自慮自汗者。
祀元丹內蘊蒸熱。胃氣丸八味丸蓮瀉湯附子加
絲子丸杜仲試服。由來黃虛寒冷者。古桂湯大芩
勞心不寧者。妙香養榮續命膏後傷脾者。補中益
氣湯。

下虛內損則膀胱約不便溺自遺或尿後微溼皆火
盛水不得事互反。若膀胱熱盛血渴火邪為主而佐以
山藥黃柏龜膠五味之類不可過藥。古方除陰丸最
妙。婦人產後傷胞。兒小解頻數。經脈散主之。

李中樞言：必煩

大便不通

玩內經之言則知大便艱結事實之少陰一極惡狀

小便不禁

上熱者尋赤尿。下虛者滋腎丸上盛下
虛者清心蓮子飲

小便不禁

寒濕阻滯不通者。導痰湯加升麻
欬逆氣閉不通者。二陳湯加水吞香附木通俱
先服。連服幾劑探吐以提其氣。氣升則水自降矣
實熱禁澀調承平末一二錢探吐

1. *Introduction*

實地考察

實業入國

莫少晴

虛乃腎虛

丸大龍絲

秘元丹由

五味子

糸子丸加

雖殊總之津液枯乾一言以蔽之也分而言之則有胃實胃虛熱秘冷秘風秘氣秘之分胃實而秘者善飲食小便赤脈仁九十卓九之類胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯熱秘者面赤身熱六脈數實腸胃閉結得冷或口舌生瘡四順清涼飲瀉瀉丸木香檳榔丸實者水氣滯於秘者面白或黑六脈沉澀小便清白喜熱惡冷霍香正氣散加官桂相殼吞半硫丸氣秘者氣不升降氣不行其人多噎氣子降氣湯加枳殼香薷正丹末效佐以木香檳榔丸風秘者風搏肺臟傳於大腸小續命湯去附子倍芍藥加竹葉香薷湯丸或活血瀉腸丸更有老年津液枯結婦人產後血及發汗利小便病後血氣未復皆能凝結法當補養氣血並津液生則自通瀉用蒴黃利藥多致不救而巴豆牽牛其害更速八珍湯加蘇子橘紅杏仁茯苓倍用當歸若病體虛弱陰寒而脈實欲微緩宜溫燥藥中略加苦寒以去熱滋陰且勿加如陰躁欲坐井中者兩尺按之必虛或沉細而運但腹理中湯將棧冷方服或服藥不應不敢用峻猛之藥者宜漸而導之用鹽五分見角末五分入煎服中其功更捷冷秘者得生薑湯之或於蜜煎中加草烏頭末有熱者猪膽汁導之入虛者如常飲合法虎骨血脈湯加酥食之血仍瀉血脈仍瀉此妙法也每見江湖方士輕用硝黃者十傷四五用巴豆者十傷七八不可不諱也或久而急結或變為痔瘡吐膿血或飲食不進而死

小便閉澀

閉與澀二證也新病為閉閉蓋難通也久病為

溺者名屢出而短少也閉澀之病內經分肝脾腎三經肝脾腎既閉然太陽膀胱主藏溺其主出溺者督腎經及膀胱及三焦也又考膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣夫主氣化者太陽膀胱經也若膀胱不能生水法當滋健胃腎木白木茯苓半夏之類如腎水燥熱膀胱不利法當滋腎瀉熱黃芩知母茯苓澤瀉通腎之類夫滋腎瀉熱名為三治之治又有水瀉只瀉大腸小腸因而燥竭宜以淡滲之品茯苓豬苓通草澤瀉一頓分利而已或有氣滯不能通溺水道下輸膀胱者假氣為急枳殼木通橘紅之類有實熱者非與純陰之劑則陽無以化上焦熱者梔子黃芩中焦熱者黃連芍藥下焦熱者黃芩知母有大虛者非與溫補之劑則水不能行如金匱腎氣丸及神中益氣湯是也丹溪謂曰吾以吐法通小便譬如滴水之器上蓋閉則下竅無以自通必上竅開而下竅之水出焉氣虛者補中益氣湯先服後吐氣閉者香附木通探吐更有參茸而小便閉者牛膝桃仁為要藥別錄云小便不利者是氣虛濁多渴如神由是觀之則受納之源自非一途若不從聖問切察之明審之當而浪投藥劑幾何不以人命為戲耶

小便不禁

世俗之治小便不禁者但知補澀而已不知內經論

肝腎膀胱之病不指為何邪所干則知七情六氣皆能為病也又言手太陰虛者為子母相瀆之類則知所生所勝所不勝之五邪皆足以為病也總其大要而言肺者主氣以下降生小便下輸膀胱者津液藏焉氣化則能出水泉不虛者膀胱不藏也此兩經者實為總司膀胱虛者為上虛當補氣補中益氣湯不愈當以黃蘗生地麥門冬情其熱膀胱虛者為下虛當溫脫藥蟄蟲蛇蛻肝經之類挾寒者牡蠣丸挾熱者白朮散散或難辨散更有睡則遺尿皆黃之虛所以嬰兒得氣未固老人下元不足多有此症在嬰兒挾熱者十居七八在老人挾寒者十居七八此又不可不辨也宜大黃絲子丸豬脾炙研碎煎湯送下更須審寒熱而為之治法

傷寒小便數

已汗後下小便不利心煩小柴胡湯太陽汗後腹滿小便不利微熱而渴五苓散身黃小便不利腹微滿者茵陳蒿湯小便不利大便乍難作難微熱有燥屎也承氣湯瀉熱大便澀小便不利茯苓湯風濕自汗身重小便不利甘遂附子湯熱無不通出煩渴少加麻黃上寒者不通少陽變證下

小便澀治

小便澀難來而短少也太陽汗吐後小便澀澀諸謂胃氣滿太陽自汗四肢拘急心煩微惡寒小便數甘草乾薑湯芍藥甘草湯

經曰膀胱不約爲遺溺小便不禁常常出而不覺也人之遺溺賴心腎二氣之所傳送蓋心與小腸爲表裏腎與膀胱爲表裏若心腎氣虧虧送失道故有此證治宜溫經下元清心養慾又有連有連不願致傷膀胱者內虛寒者雖元升並下九之類若內虛而熱者六味地黃丸或加五味杜仲補腎胎年老者八味丸產育收生不瀉損破尿胞者參木佛照湯加豬羊胞煎之補脾肝主小便若肝經血虛用四物山梔若小便便澀或室中作痛易則提過禁服用能醫馬肝湯若小便頻數或勞而無益屬用氣虛用補中益氣湯加山藥五味若小便無度或淋瀝不禁乃陰挺痿痹也用六味地黃丸若小便澀滯或痛而益甚乃膀胱熱結也用五淋散其辨肺痿不能化生者黃本清肺飲膀胱陰虛陽無所生者滋腎丸膀胱陽虛陰無所化者六味丸若陰痿思色精不出遺泄瀉痛如淋或加減八味丸料加車前牛膝若老人精竭復耗大小便牽痛如淋亦用前藥不應急加附子多有生者肝火不能約制而小便自遺或不利證若服燥劑而頻數或不利用四物麥門五味甘草而黃用四物加山藥黃蘗知母五味麥門若脾虛而短少用補中益氣加山藥麥門若陰挺痿痹而頻數用地黃丸若熱結膀胱而不利用五苓散若脾燥不能化生用黃本清肺飲若膀胱陰虛陽無以生而淋瀝用滋腎丸若膀胱陽虛陰無以化而淋瀝用六味丸若轉筋小便不通或喘急欲死不問男女孕婦急用八味丸緩則不救若老人陰痿思色精不出而內取小便遺泄瀉痛如淋用加減八味丸料加車前牛膝若老

人精已竭而復耗之大小便遺泄痛愈痛愈欲便愈便則愈痛亦治以前藥不應急加附子若喘嗽吐痰腥足冷腰膝骨大痛面目浮腫太陽作痛亦治以前藥若痛愈而小便仍澀常用加減八味以緩治之

結或氣用有可通而通之也至於不通之虛乃虛勢汗多五內枯燥腸既去不能生津膀胱中煎無水瀰而欲通之如何乞人而求食已窮而益窮矣故東垣分在氣在血而治之以渴與不渴辨之如渴而小便不利此屬上焦氣分水主生於金肺熱則是清化之源起矣當於肺之分助其狀令水主生焉如天令至秋白露降須用清金之藥如生脈散之類為當又有肺虛者蓋因飲食失節傷其胃氣陷於下焦經所謂脾虛一虛令人九夜不通用補中益氣湯以參芪甘溫之品先調其胃氣以升氣從九原之下而提之則清升而濁自降矣清肺者隔三之治也補脾者隔三之治也東垣虛則補母之妙用類如此此皆從後天之化源者如不渴而小便不利此屬下焦血分下焦者腎與膀胱也乃陰中之陰陰受熱閉塞其下流經日無陽則陰無以生無陰則陽無以化若淺涉之藥乃陽中之陰非提陰之劑陽何以化須用滋腎丸此氣味俱陰乃陰中之陰也東垣先生治一人目睛突出腹脹如鼓脹已上堅硬皮膚欲裂飲食不下使視危者特思半夜而得之投之即愈此是陰虛陽無以化也蓋至於真陽真陰虛者東垣未之論如有真陰虛者惟六味地黃丸以補腎水滋腎丸又而當禁黃連知母起其苦寒泄水又忌淡味滲瀉之藥有真陽虛者須八味丸補其元陽已萎而思色以降其精則虛而不內收小便通瀉如渴已耗而復瀉之則大小便通漸愈而後則愈便愈則愈痛載凡云有似淋非淋泄中有如鼻涕之狀此乃精滑俱出精寒滑通欲出而不能而痛宜大芩歸于丸鹿茸丸

載氏亦得補腎之注也若至於轉瞬惡欲死不問男女孕婦產後急用八味丸料煎飲服則不救或疑桂附辛熱不致取用豈知腎氣虛寒水寒冰凍之義得熱則流通合此更有何物能直達膀胱而使清滑水來耶

并淡治一老人患小便不利因服分利之藥太過遂致秘塞點滴不出予以其胃氣下陷用補中益氣湯一服而通因先多用利藥損其腎氣遂致通後復尿一夜不止急補其腎後已凡腎之治是證者未有不用滋利之劑誰能固其腎氣之虛哉乎特表之為世戒後若有善法丹藥者已明知其虛矣乃以補中益氣湯送腎氣丸豈不下下相須于母相益耶蓋極言手太陰之別名已列於其病虛則大味小便遺數肺為上焦通調水道下輸膀胱腎又上通肺故將兩臟是子母也母虛子亦虛自然之理東垣云小便遺失肺全虛也宜安臥養氣於勞役以黃芪人參之類大補之不愈者責之腎經日膀胱不約為遺溺仲景云下焦竭則遺溺失便又云下焦不歸則遺溺蓋下焦在膀胱上口主分別清濁使便下焦不歸其部不能約制漫漶故遺溺大抵天賦皮厚則多汗天冷衣薄則多溺多溺者樂也至於不禁虛寒之甚非八味丸不效古方如芩歸于丸鹿茸丸二氣丹俱可選用戴氏云睡著遺尿者此亦下元冷小使無熱而然宜大芩歸于丸猪胞多碎前渴下元遺尿皆屬虛劉河間謂熱甚於腎部于於足厥陰之經延孔腎結其而氣血不能宣通則癰癰神無所用故津液滲入膀胱而漫溺遺失不能收禁也即內經淳氣遺溺滑

聚在腎此係熱證不可不知考之薛按有因熱發熱作渴小便自遺或時閉澀余作肝火虛盛陰經不能約制午商補中益氣湯加山藥山藥黃于後六味丸月餘愈

大抵不寒之病虛火多而實熱少倘以虛證候投以大劑剋剋始懷之

景岳全書

難辨證

小便不通最為難辨此最危最急證也水瀰不通則上便難閉而為脹外侵肌肉而為腫泛及中焦則為嘔再攻上焦則為嘔數日不通則迫迫難堪必致危殆今人一見此證但知利水或用田螺壺解之法而不辨其所攻之本無性其多不治也

凡癰閉之証其因有四最當辨其虛實有因大邪聚小腸膀胱者此以水泉乾涸而氣閉熱閉不通也有因熱居肝腎者則或以敗精或以積血阻塞水道而不通也若此者非無水之證不過癰閉而然病因有餘可清可利或用法以通之是皆癰閉之輕證也惟是氣閉之證則尤為危險陰氣閉之義有二焉有氣實而閉者有氣虛而閉者夫膀胱為藏水之器而水之入也由氣以化水故有氣斯有水水之出也由水以達氣故有水始有溺經日氣化則能出矣蓋有化而入而後有化而出無化而出必其無化而入是以出入皆由氣化此即本經氣化之義非單以水為言氣化也然則水中無氣即水也氣中有水即氣也今凡病氣虛而閉者必以真陽下竭元海無根水火不交陰陽否隔所以氣自氣而氣不化水

自水而水蓄不行氣不化水則水澀枯竭者有之
舊不行則浸漬腐敗者有之氣既不能化而欲強爲
通利果能行乎除中已無陽而再用苦寒之劑能無
害乎理本甚明也至若氣實而閉者不通肝強氣逆
移傷膀胱或破其氣或逆其津或提其陷而變者自
無不去此治實者無難而始治虛者必得其化爲不易
也故凡降此證不可不詳辨其虛實

論治

火在下焦而膀胱熱閉不通者必有火證火脈及溺
管疼痛等證宜大分清飲抽薪飲金元散玉泉散及
萊菔飲之類以化之若肝腎實火不消或遺濁或見
血者大都清去其火水必自通前法俱可通用
氣閉證當分虛實寒熱而治之凡氣實者氣結於小
腸膀胱之間而壅閉不通多屬肝強氣逆之證惟暴
惡鬱結者多有之宜以破氣行血爲主如香附枳殼
馬兜鈴香薷等之屬兼四苓散而用之若氣陷於下
藥力不能舉及者當即以此藥多服探吐以提其氣
使氣升則水自降也有痰氣逆滯不通者即以一二陳
湯六安煎之類探吐之有熱閉氣逆者即以大清
飲探吐之有氣實血盛而閉者用四物湯探吐之凡
氣實者虛無如吐之爲妙譬之滴水之器閉其上較
則下較不通則其上較則下較必利蓋有升則有降
此理勢之使然也凡氣虛而小便閉者必以柔多漸
然或年衰氣竭方有此證正以氣不足化爲危候
然凡病此者必其有新起覺小便短少或便時無力
便當細心速治若待其閉絕無及也但治此者亦當
辨其虛氣之寒熱若寒無內熱之氣者是必屬虛無

經或病未至者須常用左歸右歸六味八味等湯丸
或壯水以分消或益火以化氣隨宜用之自可漸杜
其弊若病已至者則必用火味丸料或加減金匱腎
氣湯大劑氣動則可挽回或歸桂附辛熱不敢輕用
豈知下元陽氣動其得寒則凝得熱則行舍此二者
更有何物可以通達膀胱而使水因氣化也若氣虛
下陷升降不利者宜補中益氣湯主之蓋即用此湯
探吐之較妙若素患陽虛內熱不堪溫補而小便閉
經者此必氣陰敗絕無陰則陽無以化水虧證也治
宜補陰降陽以化陰經之類主之或偏於陽亢而水
不制火者東垣滋陰丸亦可但此即火證之屬耳大
小便俱不通者必先通其大便則小便自通矣宜八
正散之類主之

久服桂枝之屬以致水虧薄充而小便不通者宜解
毒壯水以化陰經之類主之甚者以黃連解毒湯加
分利證陰等藥亦可惟養豆飲爲解毒之神劑其有
因久服陽藥作用過多火本不盛單由水虧者非六
味地黃湯大劑證之不可也
服分利既多而小便愈不通者此必下竭之證察其
水虧者必須大劑陰經火虛者必須峻補陽氣逆
水行其便自通不可見其假虛者意施通此與榨乾
汁淨枯者何異投令竭者愈竭則不免矣
膀胱無水等證有因遺溺水腫大腸而小便不通者
此當但治遺溺泄水而水自利也又有因大汗多汗
氣虛汗泄而小便不利者此當調治營衛表氣收而
小便自利也有虛勞亡血傷精水應液去五內枯燥
而小便不利者此當調補陰血氣漸充而小便漸

利也凡此數者皆膀胱無水枯涸之證不可再加分
利惟泄瀉證亦有可分利者亦不過通之之耳諸證
皆非有水不通而爲難閉當於各門求治
懷妊之婦每有小便不通者此以胎氣下陷溺孔被
壓而然多由氣虛不能舉胎所致宜八珍湯補中益
氣湯之類主之
若陰虛之降胎舉胎而小便不通者宜以手拈托
起其胎則小便自出

遺溺不禁論

遺溺一證有自遺者有睡中而遺失也有不禁者以
氣門不固而頻數不能禁也又有氣脫於上則下焦
不約而遺失不覺者此虛寒之候也總之三者皆屬
虛證但有輕重之辨耳若夢中自遺者惟幼稚多有
水泉不止膀胱不藏者必以氣虛而然蓋氣爲水母
水不能蓄以氣始能固也此失守之兆大非所宜養
至氣脫而遺無所覺則尤甚此惟非風證及
年衰氣弱之人或大病之後多有之仲景曰下焦竭
則遺溺失禁此之謂也
古方書論小便不禁有屬虛屬虛之辨不知不禁乃
以小便不利者皆屬虛寒何有熱證若因熱而小便
頻數其證則淋瀝澀滿不能禁止而小便必不利且
或多痛澀方是熱證自有淋瀝瀉治法非遺失也倘
以虛寒誤認爲熱而妄投瀉火之藥無不殆矣
論治
凡治小便不禁者古方多用固澀此固宜然然固澀
之劑不過固其門戶此亦治標之應而非標澀之道

也蓋小水雖係於腎而腎上連肺肺氣無權則腎水終不能攝故治水者必須治氣治腎者必須治肺宜以參芪歸木桂附乾薑之屬爲之主然後相機加以固澀之劑爲之佐庶得治本之道而源流如度否則徒陣狂瀾終無益也余創有提履丸方治無心腎肺腎之屬皆宜以此爲主治

中上一焦宜補中益氣湯理中湯溫胃飲歸脾湯或四味回陽飲之類如固澀等劑主之不見效當薄之腎若肝腎陽氣虧缺則脾統不藏而水泉不止此其咎在命門宜右歸飲大補元煎六味回陽飲甚若以四逆散之類主之或加固澀為佐亦可或用集聖四逆丸或八味地黃丸去澤瀉亦可

凡陽中不潔者必虛下元虛寒所以不固宜大補腎
子九家韭子丸五子丸縮泉丸之類主之小兒
從逆不加檢束而縱肆常遺者此價而無憚志意之
病也當寬其神非暴擊及或因疑以致不固者亦當
治之如前宜用猪羊澁腎炙腰陽湯下前藥更妙
凡因恐懼擾逆者此心氣不足下連肝腎而然宜大
補元煎歸脾湯五君子煎之類主之

古方壯陽固痿等劑如茴香益腎丸二氣丹固腎丸
秘元丹牡蠣丸濟生菟絲子丸固真散皆可隨宜擇
用

大便燥結

大便燥結

乾燥火熾大腸陰盡遂至真如羊屎名爲腸結不治之證也然而陰盡則宜死今不死而腸結是陰猶未

盡也。眞陰一日不死一線不絕則一線可生。吾有奇方專補其陰使陰生而火忌陰旺則陽

寬也方月生陰開結湯熟地二兩元參當歸各一兩
土地牛膝麥冬山茱萸肉茯苓酒洗煖各五錢山藥
三錢水煎服一連數劑腸結可開糞即不如羊屎矣
可望再生然必須日日一劑三月終改用六味地黃

大便閉結者，以氣不能下，腸胃而腎經之水，僅居足燥則清肅之氣，不能大行於大腸，而腎經之水，僅居足自被，又何能旁流以潤腸哉？方用熟地、水、參各三兩，火煎子。錢升麻、錢牛乳、一兩水、二鍾，煎六分，將牛乳同調一椀，服之一劑，不解二劑，必大便秘。此方之妙，全在不調大腸而稍計尤妙，不補腎而便

最難得治必須從腎經以潤之使肺得以清之氣既下行沉於海底非用升提之法則水注閉塞而不通啓其上孔則下孔自然流動此下病治上法亦肺癆癰肺治之法也其餘治癰之法可卽以此悟

凡久病之後或大便一月不通不必性急止補其氣陰使精足以生血血足以潤腸大便自出方用熟地元參當歸各一兩川芎五錢火麻仁一錢蜜半甌大黃一錢桃仁十箇紅花三分水煎服此方妙在用熟地也元參當歸以生血血足則大便自出也

此未治法雖閉結而不亟亟以通之也
大便不通亦多實證此方治實證者實有奇效方用
大黃五錢當歸尾一兩升麻五分蜜半瓠水煎服大
黃黃利用當歸濃之仍以爲君雖澀而不十分過猛

不至有亡陰之弊况有升麻以提之則泄中有留又何必過慮哉

小便不通

日久病復小便澀澹不出乃腎氣不能行於膀胱也
補腎氣則小便自出方用熟地一兩山茱萸四錢茯
苓一錢車前子澤瀉肉桂丹皮山藥各一錢水煎服

火而勝脫之氣化自行不逆小便而小便自通矣
此方妙在不去通小便而專治腎水虧火蓋腎中有
小便勝脫之氣化自行不逆小便而小便自通矣
火而不逆乃勝脫之氣化不行治勝脫之經而已矣
然而治法全不在治勝脫而已用人參蓮子茯苓車
前子王不留行各三錢白果二十箇甘草一錢肉桂
三分水煎服一劑即如注此方之奇妙全在用人參
其本則用肉桂三分蓋勝脫必得氣化而始出氣化

水路始能出尤妙用白果二十箇人多不識此意白果翅任督之脈又走膀胱引參桂之氣貫奔於膀胱之中而車前王不留行盡是洩走之物各隨之趨出於陰器之口此肅治之妙法也

牛膝奇奴惜其迅速之氣導其下行而不使上藥此
腎氣通水亦順也

方一

麻仁丸

治腸胃熱燥大便乾結

厚朴去皮薑炙炒 芍藥 枳實熟地各半斤

大黃蒸一斤 麻仁五兩 杏仁去皮尖炒五兩半

右為末煉蜜和丸如梧子大每服二十九臨臥用

溫水下大便通利則止

麻仁丸

順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱結津液

耗少令人大便秘澀或閉塞不通若年高氣弱及

有風入大便秘澀尤宜服之

枳殼去瓢炒 白檀榔煨半生 山藥 山黃

蘗綠酒浸研 防風 肉桂 車前子各一兩半

木香 羌活各一兩 麻仁研 榔杏仁去皮研

大黃半各半生各四兩

右為細末入研藥和勻煉蜜丸如梧子大每服

十五丸至二十丸溫湯下臨臥時服

專治有風人風濕秘澀大便

痞牙兒同 枳殼去瓢 羌活 桑白皮 檳榔

杏仁研 味仁研 防風 白芷 橘紅各等分

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十五丸白湯

送下藥治亦可一方只皂角枳殼一味等分

煉散

治風毒乾結

枳殼半兩 防風 羌活 獨活 檳榔 白芷

威靈仙 羌活炒赤去刺 大麻仁炒另研

杏仁湯泡去皮尖炒另研 甘草炙各一兩

右剉散每服二錢半生薑五片蜜一匙水一盞半

煎服

枳殼丸

治胃氣浮風虛大便秘實

皂角去尖炒子炙 枳殼炒 生大黃 羌活

去各 橘紅 桑白皮 香白芷各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十九空心米

飲下又方只用枳實皂角等分飲飲丸亦妙

二仁丸

專治虛人風濕不可服大黃者

杏仁去皮尖炒黃色 枳殼去瓢炒赤

麻仁另研 河子慢火炒起去長各等分

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九溫湯下

半碗九

治年高冷虛秘及產後冷氣

製半夏為糯米 明礬黃研細用柳木槌殺過

右以生油自然汁同熬入乾蒸餅末攪勻入臼內

枳殼百下丸如梧子大每服十五丸至二十九無

寒溫酒或生薑湯任下婦人酢湯下俱空心

六磨湯

治急瀉腹急大便秘澀

沉香 木香 檳榔 烏藥 枳殼 大黃各等分

右各件熱湯磨服

活血潤腸丸

治大便秘澀血氣常結燥

歸梢一錢 防風二錢 羌活 大黃煨各一兩

麻子仁二兩半 皂角仁炮存性去皮研一兩

桃仁二兩研如泥

右除桃仁麻仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸

如梧子大每服五十九丸白湯下二服後須以

蘇子麻子粥每日早晚食之大便日久再不結燥

餘藥以磁器盛之紙密封勿使見風

枳殼丸

治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅取末 杏仁湯浸去皮尖另研各等分

右和勻煉蜜丸如梧子大每服七十九空心米

飲湯送下

蘇麻粥

順氣滑大便秘

紫蘇子 麻子仁不拘多少

右二味研細水瀝取汁煮粥食之

小通氣散

治虛人憂鬱傷脾脾氣大腸為導致令秘澀服

燥藥太過大便澀亦可