

欽定四庫全書

子部
仁齋直指卷三



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

仁齋直指

仁齋直指

楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

諸風

風論

血痰水受病於內者也風寒暑濕致冠于外者也人

食居處嗜慾無節衝風

地調護不加以是經絡空疏腠理開徹風邪乘其虛

仁齋直指

仁齋直指

一

而入之中風諸風皆是物耳風之為病善行數變其中人也卒其眩人也暈激人之涎浮昏人之神亂挾熱則痿愴緩弛挾寒則急痛拘攣自其邪氣之入人也邪氣反緩正氣反急正氣引邪為喎僻為竄視為掣縱為搐搦為癱瘓為反張在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急緩則四肢不能收急則一身不能仰皆隨其邪氣所至表裏淺深而有證也種類雖多大要有四血氣偏虛半身不遂肌肉枯瘦骨間疼痛謂之偏枯神智不亂身體

無痛四肢不舉一臂不隨謂之風痺

能言則可治

忽然迷仆

舌彊不語喉中窒塞噫噫有聲謂之風瘕

身軟有汗則生

風寒

濕三氣合而為痺其人肉厚身頑不知痛癢風多則走

注寒多則疼痛濕多則重着在筋則筋屈而不伸在脉

則血凝而不流在肉則不仁在骨則癰重夫是之謂風

痺傷風一證發熱煩燥頭疼面光惡風自汗蓋風能散

氣故有汗也風家脈浮者病在表脈實者病在裏脈虛

者病在臟脈促者病在上浮則發散實則疎導虛則溫

之促於上而病人壯盛胃喉澎湃者瓜蒂散少少吐之
俗謂熱則生風大綱然爾多有胃虛氣虛血虛虛極而
生風者若諸虛證候天雄附子官桂川烏又不可闕治
法大要盡以消痰順氣為先順氣用南木香蘇合香圓
輩消痰用南星半夏細辛僵蠶輩如石綠鐵錠水銀輕
粉鉛霜朴消等劑謹勿妄施寒毒入胃則血脈凝澁真
氣消鑠不旋踵而廢人治風良劑小續命湯為上排風
湯次之然二藥主風不主氣須以人後順氣散烏藥順

氣散佐助其間氣一流行則風亦疎散矣至若口開手散瀉血遺尿眼合不開汗出不流吐沫氣簾聲如鼾睡面緋面黑髮直頭搖手足口鼻清冷口噤而脈急數皆為不治之證其餘諸風種類余於嬰兒驚風指要備論之

諸風證治

心中風

心風偃卧熱而瘡

脣赤其身有汗生

白黑青黃脣上見

停停時悚扁醫驚

心中風偃卧不能顛倒發熱失音其舌焦赤汗流脣
赤者可治灸心俞若脣上白黑青黃乃心壞為水面
目停停時時悚動者並不治心俞二穴在第五椎骨
下兩傍各一寸半五臟俞穴千金翼所載與六十七
難注同取分寸法男左手女右手以中指第一節為
一寸

肝中風

肝家踞怒不低頭

左脇偏疼筋急攣

額目脣青為可療

目黃目白使人愁

肝中風踞坐不能低頭上視多怒左脇偏疼諸筋攣
急頭目睜動其目青遶兩目連額微青面黃者可治
灸肝俞若大勢青黑其目一黃一白者不治肝俞二
穴在第九椎骨下兩傍各一寸半

腎中風

腎中踞而腰脊疼

面浮耳黑賊風生

脇無黃迹能全愈

直髮泥容旦暮傾

腎中風踞坐腰脊痛引小腹面上浮腫其耳黑視左
右脇未有點點黃色者可治灸腎俞若脇上黃點面
如土色鬚髮直齒黃赤者不治腎俞二穴在第十四
椎骨下兩傍各一寸半

肺中風

肺風喘促滿胃堂

偃卧熱熱燥異常

口鼻之間須要白

尋衣肺壞色憂黃

肺中風偃卧胃滿氣短喘息時嗽燥悶汗出其鼻白
目下及鼻四圍以至於口色白者可治灸肺俞若色
黃乃肺壞為血其與尋衣摸空者並不治肺俞二穴
在第三推骨下兩傍各一寸半

脾中風

脾中風兮肌肉潤

踞而腹滿吐鹹酸

脣并肢體通黃瘥

手足眸青療已難

脾中風踞坐腹滿皮肉潤動四肢放縱其脣黃身通

黃吐鹹汁者可治灸脾俞若手足青且冷或目下青
並不治脾俞二穴在第十一椎骨下兩傍各一寸半

胃中風

胃病根源飲食來

擡肩喘息氣難開

口張額汗腹中滿

浮診雙關脈大哉

胃中風腹滿填脹隔塞不通張口喘息額上多汗孫
地仙所謂新食竟取風為胃風是也或曰風中諸臟
不關諸府是亦一說然胃為水穀之海五臟皆取氣

於胃故並存之三因云胃俞二穴在第十二椎骨下
兩傍各一寸半

中風惡證

中風惡證細推求

口噤須遲脈數憂

眼合不開并竄瞪

面緋面黑手難收

口開吐沫氣麤大

髮直搖頭汗不流

鼾齁喉鳴兼鼻冷

遺尿瀉血並皆休

中風多是惡風自汗心風脈浮洪肝風脈浮弦腎風

脈浮滑肺風脈浮濇脾風脈浮緩或以三部候之或以本臟取之不可一槩論也醫者當明辨之

治卒中法

圓白天南星

濕紙裏煨

南木香

蒼朮

生

白羊眼半夏

用百沸湯就跳釀少頃各一錢半

辣細辛

甘草

生

石昌蒲

細切各一錢

右件剉散分作二服水一盞半生薑七厚片煎取其半乘熱調蘇合香圓三圓灌下痰盛者加全蝎二枚

灸治一切卒中不論中風中寒中暑中濕中氣及痰厥飲厥之類初作皆可用此先以阜角去弦皮細辛或生南星半夏為末揭以管子吹入鼻中俟其噴嚏即進前藥牙噤者中指點南星細辛末并烏梅肉頻擦自開

又法

南木香

細剉
貳錢

生南星

七片

生薑

七片

石菖蒲

二寸
槌碎

右煎取清汁乘熱調南木香末壹錢蘇合香圓三圓與之

小續命湯治中風諸風迷仆涎潮舌彊語蹇或昏潰痿弛或厥冷拘攣不論表裏淺深服之皆驗

麻黃去節

人後

防己

官桂

黃芩

杏仁去皮尖焙

白芍藥

芍藥

甘草炒各壹兩

防風壹兩半

附子炮去皮臍只用半兩

石劉散每服三錢薑五厚片棗二枚水盞半煎一盞
溫服恍惚加白伏苓骨節煩疼素有熱去附子倍芍
藥煩燥大便秘去附子倍芍藥加竹瀝大便利素有
寒去黃芩加白朮附子骨肉冷疼加辣桂附子嘔逆
腹脹加人葠半夏自汗去麻黃加芍藥大便秘結熱去
附子加枳殼大黃痰多加南星炮切數片風虛加當
歸渴加枯薑根身疼加秦艽喘急加炒桑白皮
排風湯治五臟風諸風亦治風毒腳氣腫痛