

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷一百七



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

證道錄

外科

福

九

經上臟者下部伏見

明王肯堂撰

腓二

腓者腓也
即足肚

背

此五部有癰疽者死

歌人

證治準繩

王海藏云 腦鬚鬚頤 亦為癰疽必死之處

鬼遺方不可患癰疽者七處 眼後虛處 頤接骨處

陰根上毛間胯與尻骨接處 耳門前後車骨接處

諸因小腹風水所成癰疽 領骨下近耳後虛處

鼻骨中 並能害人但以諸法療之或有得瘥唯眼後虛處最險

背上九處不可病癰 第一入髮際為玉枕亦為舌本

第二頸項節 第三椎為崇骨 第四大椎為五藏

第五脊骨兩邊肺俞穴 第六夾脊兩邊脾俞及肝

俞 第七脊骨兩邊腎俞二穴 第八後心鳩尾 第

九鳩尾骨穴

正面五處不可患癰 第一喉骨為垂膺 第二當胸

為神舍 第三心鳩尾 第四當兩乳穴 第五臍下

一寸三分之間

側面三處不可患癰 耳下近耳後牙車尖夾陷中為

喉脉一穴 當膊下一穴為肩骨 承山上三寸一穴
臑腸

上焦發癰為陽是壅塞實候宜解利溫涼湯藥去其積
熱上攻外即貼消腫通逼毒藥如已結定即發穴藥候
穴破出其膿毒腫平方貼生肉等藥然後斂合瘡口亦
慮外傷風水勿食發風熱醬麵毒物等忌房事

中焦發癰至腰上一節前後心不定所在皆是澁滯候
亦乘虛而作不拘大小前起心鳩尾者最要緊近兩腋

是虛處兩脇肋下至臍上及臍下兩傍一二寸發癰填
氣伏硬難潰膿為此等處偏難發穴穴後難合瘡口並
須先用煖內藥服後用熱藥貼令軟如慢慢破穴不得
急破急破即朝夕出膿不住緩慢破穴即一頓出膿易
為將息後心者唯有十一推脾俞下十四椎上為腎俞
腎俞下為腰俞兩處起癰者防毒氣內攻為此處皆是
至虛處凡有癰起先須補內氣令實方可放破內氣實
則不內攻且易得潰唯腰腿兩處多成漏疾預防節慾

則先矣

下焦發為流注虛損候前陰股兩處起如雞卵大長橫
摺內初起腫核結塊後四畔浮腫相併伏硬色青黑先
用和平藥內服三五日後用發軟散及罨藥罨令軟即
穴穴後其瘡口即隨摺子內作長瘡瘡口破宜急用抽
毒膏出膿膿盡便貼合瘡口藥為此處無肉可壞更不
須長肉也

右靈樞鬼遺諸書所言部分甚悉今已散采入各條

矣其經絡所屬及引經之藥已見首卷分經絡篇其
初中後內消外治之法及表裏虛實之別則當於腫
瘍潰瘍門求之今世專科方士所詫以為秘傳之書
圖寫形像分別名目以立治法者多不足憑此中亦
有蒐采者如或問之類姑以廣聞見耳不必泥也

頭部一

百會疽

或問百會穴生疽何如曰此名玉頂發初如麥米頓增

痛楚寒熱大作由虛陽浮泛宜以鹽湯下八味丸引火
歸源甚則黑錫丹或元氣素薄六陽經受風邪風火相
扇臟腑熱毒上攻而然者宜黃連消毒飲兼玉樞丹勝
金丹更以附子切片置湧泉穴灸五壯以泄其毒七日
無膿者死

頂門癰

或問頂門生癰何如曰此屬太陽經風熱所致一名佛
頂疽穴名上星由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成宜服

活命飲加芩連梔子藁本清熱之臍及紫金丹烏金散
奪命丹汗之虛者十全大補湯加羌活稍遲潰爛黑陷
惡證多脉大神昏二便閉結者不治

額疽

鬼遺方云左額右額發赤疽不拘大小狀如桃李急宜
藥貼破見膿無害右額角一處發毒疽及惡癰為近太
陽穴如腫滿太陽即成虛損為近穴而難消不可破如
破後傷外風水即能害人亦宜用藥潰膿後速斂合瘡

口如經冬月即成冷瘡緣此處近太陽穴上至額角都為險處宜或問當額生疽何如曰此屬陽明胃積熱宜服活命飲加升麻桔梗羌活水酒煎服壯實者一粒金丹下之老弱者十全六補湯或十宣散黃芪內托散托之過時潰爛腦髓出者死

太陽疽

鬼遺云左右太陽穴或發疽癰及癰五七日不潰毒氣流入眼眶攻眼眼合不開用藥貼破破後慎外風水所

入即損其睛症損眼臉而成大疔 或問兩太陽生疽
何如曰此名勇疽亦名腦發疽屬足陽明胃經狀如伏
鼠寒熱併作面目浮腫宜活命飲加升麻桔梗烏金散
十一日刺得黃白膿者生清稀黑血者及潰爛透腦者
死

鬚疽

鬚疽屬手少陽三焦相火是經少血多氣尤忌見膿若
妄加針灸必至不起余見之屢矣 薛新甫以為屬肝

膽二經怒火或風熱血虛所致若發熱作渴者用柴胡
清肝散腫突痛甚者用仙方活命飲若大勢已退餘毒
未散用參芪歸朮為主佐以川芎白芷金銀花以速其
膿膿成仍用參芪之類托而潰之若欲其生肌收斂脾
虛者六味丸血虛者四物加參芪或血燥或水不能生
木者用四物湯六味地黃丸氣虛者用補中益氣湯皆
當滋其化源為善

一老腫痛發熱膿清作渴脉軟而濇此氣血俱虛也欲

補之彼見作渴發熱乃服降火之劑果作嘔少食復求治投六君子湯四劑嘔止食進仍用補藥月餘而愈

以上

補

一人患此炊痛作腫發熱以小柴胡湯加連翹金

銀花天花粉四劑而消 一人因怒後鬢際腫痛發熱

以小柴胡湯加連翹金銀花天花粉四劑根畔俱消惟

瘡口作痛以仙方活命飲二劑痛止膿熟針之更以托

裏消毒藥而愈 一人腫痛寒熱拘急脉浮數以荆防

敗毒散二劑表證悉退更以托裏消毒散潰之而安

一人焮腫痛甚發寒熱服十宣散愈熾診之脉數而實
此表裏俱有邪也以荆防敗毒散加芩連大黃二劑少
愈更以荆防敗毒散四劑而消 俞黃門年踰三十冬
患鬢毒腫焮煩躁便秘脉實此膽經風熱壅上也馬氏
曰瘡瘍熱實不利者大黃湯下之一劑便通瘡退更以
荆防敗毒散二劑十宣散去桂加天花粉金銀花數劑
而愈 一人頭面焮腫作痛時仲冬脉弦緊以托裏溫
經湯汗之而消 趙宜人年踰七十鬢疽已潰焮腫痛

甚喜冷脉實便秘東垣云煩躁飲冷身熱脉大精神昏悶者臟腑實也以清涼飲二劑腫痛悉退更以托裏藥二十餘劑而平

注前疽雖出少陽血少之分然證與脉皆屬於實故年壯者用瀉劑之重年老者用瀉劑之輕若拘以年老或守其經禁而投補劑實實之禍難免矣

以上瀉例

侍御朱南阜患前證腫痛發熱日晡尤甚此肝膽二經血虛火燥也用四物湯加玄參柴胡桔梗炙草治之而