

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷六十二



欽定四庫全書

證治準繩卷六十二

文淵閣

女科

雜證門

積聚癥瘕

方有五積六聚之氣

五藏之氣積名曰積

故積有五六府之氣聚名曰聚故聚有六雜病準繩言

明 王肯堂 撰

之詳矣若夫七癥八瘕則婦人居多七者火數屬心蓋血生於心八者木數屬肝蓋血歸於肝雖曰強分理似不混夫癥者堅也堅則難破瘕者假也假物成形古人將婦人病為瘕疾以蛟龍等為生瘕然亦不必如此執泥婦人癥瘕並屬血病龍蛇魚鼈肉髮蟲瘕等事皆出偶然但飲食間誤中之留聚腹臟假血而成自有活性亦猶永徽中僧病噎者腹中有一物其狀如魚即生瘕也與夫宿血停凝結為痞塊雖內外所感之不同治法

當以類相從所為醫者意也如以散梳治蟲瘕銅屑治龍瘕麴蘖治米瘕石灰治酒瘕如此等類學者可以理解也 大全良方分瘕癖諸氣疝瘕八瘕腹中瘀血瘕

痞食瘕血瘕凡七門瘕者在腹內近臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀故名曰瘕癖者僻在兩肋之間有時而痛故名曰癖疝者痛也瘕者假也其結聚浮假而痛推移乃動也八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血瘕脂瘕狐瘕蛇瘕鼈瘕積在腹內或

腸胃之間與臟氣結搏堅牢雖推之不移名曰癥言其
病形可徵驗也氣壅塞為痞言其氣痞塞不宣暢也傷
食成塊堅而不移名曰食癥瘀血成塊堅而不移名曰
血癥若夫腹中疼血則積而未堅未至于成塊者也大
抵以推之不動為癥推之動為瘕也至夫疝與瘕癖則
與痛俱痛即現不痛即隱在臍左右為瘕在兩肋之間
為癖在小腹而牽引腰脇為疝恐學者一時難了未免
淆濫故總叙而條析之 張戴人過譙遇一卒說出妻

事戴人問其故答曰吾婦為室女時心下有冷積如覆
杯按之如水聲以熱手熨之如水娶來已十五年矣恐
斷我嗣是故棄之戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除
孕可得卒從之戴人診其脈沈而遲尺脈洪大而有力
非無子之候也可不踰年而孕其良人笑曰試之先以
三聖散吐涎一斗心下平軟次服白朮調中湯五苓散
後以四物湯和之不再月氣血合度數月而娠二子戴
人嘗曰用吾此法無不子之婦此言不誣

三聖散用防
風瓜蒂各三

兩藜蘆一兩為粗末以蘆汁煎服製煎法詳見儒門事親 白朮調中湯用白朮茯苓澤瀉橘紅各半兩甘草一兩乾薑官桂砂仁藿香各二錢半為末白湯化蜜調服二錢無時 五苓散見傷寒渴門 陽夏

張主簿之妻病肥氣初如酒杯大發寒熱十五餘年後因性急悲感病益甚惟心下三指許無病滿腹如石片不能坐卧鍼灸匝矣徒勞人耳乃邀戴人診之曰此肥氣也得之季夏戊巳日在左脇下如覆杯久不瘳令人發痰癰以瓜蒂散吐之魚腥黃涎約一二缶至夜繼用舟車丸通經散投之五更黃涎膿水相半五六行凡有

積處皆覺痛後用白朮散當歸散和血流經之藥如斯

涌泄凡三四次方愈

瓜蒂散舟車丸方見雜病傷食痰飲二門通經散用橘紅當歸甘

遂以麵包不令透水煮百餘沸用冷水浸過去麵晒乾三味各等分為細末每服三錢臨卧溫淡酒調下白

朮散白朮黃芩當歸各等分為末每服二三錢水煎食前服當歸散當歸杜蒺藜等分為末米飲調服食前

此吐下兼施且甘遂等逐水太峻用者審之

薛新甫云婦人疰瘕癥瘕大

抵因飲食起居七情失宜虧損臟腑氣血乖違陰絡受

傷循行失度所致 羅兼甫云養正積自除必先調養

使榮衛充實若不消散方可議下但除之不以漸則必

有顛覆之害若不守禁忌縱情嗜慾其有不喪身者鮮

矣一婦人內熱作渴飲食少思腹內初如雞卵漸大

四寸許經水三月一至肢體消瘦齒頰似瘡脈洪數而

虛左關尤甚此肝脾鬱結之證外貼阿魏膏午前用補

中益氣湯

雜病傷勞倦

午後用加味歸脾湯

即歸脾加山梔丹皮

兩月

許肝火稍退脾土少健午前補中益氣下六味丸

雜病虛勞

午後逍遙散

調經

下歸脾丸又月餘日用蘆薈丸

本門之末

二

服空心以逍遙散下日晡以歸脾湯下喜其謹疾調理

年餘而愈 一婦人腹內一塊不時上攻或作痛有聲
或吞酸痞悶月經不調小便不利二年餘矣面色青黃
余以為肝脾氣滯以六君加芍歸柴胡炒連木香吳茱
各少許二劑却與歸脾湯送下蘆薈丸三月餘肝脾和
而諸證退又與補中益氣湯加茯苓牡丹皮中氣健而
經自調 一婦人性多鬱善怒勤於女工小腹內結一
塊或作痛或痞悶月經不調却服伐肝之劑內熱寒熱
胸膈不利飲食不甘形體日瘦牙齒蝕爛此脾土不能

生肺金肺金不能生腎水腎水不能生肝木當滋化源
用補中益氣湯六味丸至仲春而愈 一婦人經候過
期發熱倦怠或用四物黃連之類反兩月一度且少而
成塊又用峻藥通之兩目如帛所蔽余曰脾為諸陰之
首目為血脈之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸於目
也遂用補中益氣濟生歸脾二湯專主脾胃年餘而愈
松江太守何恭人性善怒腹結一塊年餘上齧食透
血氣虛極時季冬肝脈洪數按之弦緊或用伐肝木清

胃火之藥余曰真氣虛而邪氣實也恐伐肝木至春不能發生耳用八珍湯以生氣血用地黃丸以滋腎水肝脈頓退因大怒耳內出血肝脈仍大煩熱作渴此無根之火也仍以前藥加肉桂一劑脈斂熱退復因大怒果卒於季冬辛巳日乃金尅木故也

通治諸精順氣丸

簡易

治三十六種風七十二般氣去上

熱下冷腰脚疼痛四肢困倦減食羸瘦顏色赤黃惡瘡下疳口苦無味憎寒毛聳癢痺氣塊男子世事斷

絕女子久無子息久患瘧痢發成勞疾百節痠疼自

嬰孩至百歲老人皆可服疏風順氣補精駐顏

錦紋大黃

五兩一半生用
一半濕紙裹煨

車前子

三兩

白檳榔

二兩

火麻子仁

微炒赤退殼取
二兩淨另研入

川牛膝

酒浸
三夕

郁李仁

泡
去

皮另研山藥

兔絲子

酒蒸研焙
各二兩

山茱萸肉

防風

枳殼

麩炒
獨活
各一兩

右為細末煉蜜丸如梧子大茶清粥飲下二十九百

無所忌空心臨卧服一月消食二月去腸內宿滯三

月無倦少睡四月精神強盛五月耳目聰明六月腰
脚輕健一年消百病如服藥臟腑微動以羊肚肺羹
補之

勝紅丸簡易治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水

丈夫酒積女人脾血積氣小兒食積

陳皮 青皮 京三稜 莪茂二味同醋煮 乾薑炮良

薑炒各一兩 香附子淨炒各二兩 一方加神麴麥芽

右為末醋糊丸如梧子大每服三十丸薑湯下 虛

者宜以補藥下之

香稜丸

生濟

治一切積聚破痰癖消癥塊

木香

丁香

各半兩

三稜

酒浸一夕

枳殼

麩炒

莪朮

細剉每兩用

巴豆三十粒去殼同炒待已豆黃色去巴豆不用

青皮

製

川棟子肉

炒懷

香

炒各等分

右末之醋煮麵糊丸如梧子大朱砂為衣每三十丸

薑鹽湯或溫酒下無時

太硝石丸

治七癥八瘕聚結杯塊及婦人帶下絕產

腹中有癥瘕者當先下此藥但去癥瘕令人不困

硝石三兩 大黃四兩 人參 甘草各一兩

右為末以三年苦酒三升置銅石器中先內大黃微火熬微沸常攪不息至七分內餘藥復熬成膏至可丸即丸如梧桐子大每服三十丸米飲下三日一服婦人服之或下如雞肝或如米泔赤黑等物二三升後忌風冷

阿魏膏 治一切痞塊

羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥 穿山甲

生地黄 兩頭尖 大黃 白芷 天麻 錢各五

槐柳桃枝 錢各三 紅花 錢四 木鼈子 十枚 亂髮 一團如雞子大

右用香油二斤四兩煎黑去粗入髮煎髮化仍去粗
徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒
藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣攤貼患處黃丹
須用真正者方效凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪平
半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之