

醫宗金鑑



上海傳書局出版

醫宗金鑑卷三

內科

訂正仲景全書金匱要略註(下)

痰飲欬嗽病脈證并治第十三

夫病人飲水多必暴喘滿。凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也。皆大下後裏虛脈偏弦者飲便利者爲消渴病小便不利者爲留飲病留飲者卽今之停水飲病也。若水停上焦胸中則壅肺氣不得降故暴喘滿也。若水停中焦心下甚者則凌心故病悸動不安微者則礙肺故病呼吸短氣。若水停下焦少腹則不輸膀胱故必苦裏急也。仲景于此但言上中二焦不及下焦者非略之也。謂已詳於傷寒論中也。【集註】程林曰飲水多則水氣停泛於胸膈必暴喘滿也。凡人食少飲多則胃土不能游溢精氣甚者必停於心下而爲悸微者則阻於胸膈而爲短氣也。

先渴後嘔爲水停心下此屬飲家小半夏茯苓湯主之。【註】水停心下中焦部也。中焦屬胃故不止病悸短氣而亦病嘔也。病悸短氣者是水停胃外從膈下而上干於胸也。病嘔者是水停胃內從胃中而上越於口也。然必先渴飲水多而後作嘔者方屬飲家嘔病也。主小半夏湯者以止嘔也。加茯苓者以飲水多而嘔病故兼利水也。【集註】魏荔彤曰水停心下阻隔正氣不化生津液上於胸咽故渴也。渴必飲水水得水而愈恣其衝逆所以先渴而後必

嘔也此屬飲家當治其飲不可以爲渴家治其渴也渴飲則用辛燥治渴必用寒潤大相逕庭可不明其屬於何家而妄治之乎尤怡曰先渴後嘔者本無嘔病因渴飲水水多不下而反上逆也故曰此屬飲家小半夏止嘔降逆加茯苓去其停水

〔小半夏加茯苓湯方〕 半夏升 生薑射 茯苓三兩 以上三味以水七升煮取一升五合分溫再服

嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之【註】飲家渴者是水停氣不化生津液而渴也嘔吐者是嘔吐胃乾燥傷津液而渴也故曰嘔家本應渴也先嘔後渴者當少少與飲之以和胃生津爲欲解也若嘔吐後反不渴者是必心下素有支飲故也惟主小半夏湯止嘔而不加茯苓者以不渴並無新飲且嘔後已傷津液不可再行利水重竭津液也

【集註】李彥曰此專以治嘔言嘔家渴者爲欲解以胃氣復而津液生也若心

下素有支飲則不燥自當不渴泛溢而嘔也半夏生薑溫能和胃氣辛能散逆氣爲嘔家聖藥

〔小半夏湯方〕 半夏升 生薑射 以上二味以水七升煮取一升半分溫再服

【集解】沈明宗曰此支飲上溢而嘔之方也凡作嘔必傷津液應當作渴故爲嘔家本渴渴則病從嘔去謂之欲解若心下有支飲停蓄胸膈致燥故嘔而不渴則當治飲所以生薑散邪半夏滌飲嘔自止矣

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之【註】卒然嘔吐雖然不渴而心下痞塞是膈間有水凝結也眩者是水阻陽氣不升也悸者是水氣上干於心也卽不渴無新飲而平日飲咸可知則不必顧及津液亦必加茯苓以利水斯結可開而阻可通也【集註】趙良曰心下痞膈間有水眩悸者陽氣必不宣散也經云以辛散之半夏生薑皆味辛本草半夏可治膈上痰心下堅嘔逆眩者亦上焦陽氣虛不能升發所以半夏生薑並治之悸則心受水凌非半夏可獨治必加茯苓去水下腎逆以安神神安則悸愈也尤怡曰飲氣逆於胃則嘔吐滯於氣則心下痞凌於心則悸蔽於陽則眩半夏生薑止嘔降逆加茯苓去其水也

〔半夏加茯苓湯方〕 見前

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散主之〔按〕瘦人之瘦字當是病字癲眩之癲字當是顛字顛者頭也文義相屬此傳寫之譌〔註〕悸者篤篤然跳動病也上條心下有悸是水停心下爲病也此條臍下有悸是水停臍下爲病也若欲作奔豚則爲陽虛當以茯苓桂枝甘草大棗湯主之今吐涎沫水逆胃也癲眩水阻陽也則爲水盛故以五苓散主之也

〔五苓散方〕 澤瀉一兩 猪苓去皮三分 茯苓三分 白朮三分 桂去皮二分 以上五味共爲末白飲服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈

夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之〔註〕水停心下甚者病悸已明其治矣微者短氣其治有二氣虛短氣是氣少不能長息而短也微飲短氣是水停阻礙呼吸而短也若呼之氣短是心肺之陽有礙也用苓桂朮甘湯以通其陽陽氣通則膀胱之竅利矣吸之氣短是肝腎之陰有礙也用腎氣丸以通其陰陰氣通則小便之關開矣故曰苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之也

〔茯苓桂枝白朮甘草湯方〕 茯苓四兩 桂枝二兩 白朮各三分 甘草二兩 以上四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

〔腎氣丸方〕 見婦人雜病中

〔棗解〕尤怡曰飲水病也治水必自小便去之苓桂朮甘益土氣以行水腎氣丸溫陽氣以行水雖所主不同而利小便則一也

夫心下有留飲其人背寒冷如掌大留飲者脇下痛引缺盆欬嗽則轉甚胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛脈沉者有留飲〔按〕此條古本內於四肢歷節痛之下有脈沉者有留飲一句當另爲一條始合論脈之義短氣而

渴之渴字當是喘字四肢上當有缺文皆傳寫之謬。〔註〕停飲初病即以小半夏湯加茯苓五苓散腎氣丸等藥治之而愈者微邪也。若邪甚而不去者留於心上則阻心陽必背寒冷留於脇下則礙肝氣必脇下痛引缺盆欬嗽轉甚留於胸中則壅肺氣必短氣而喘留於身體則塞經絡必四肢歷節痛也由此推之留於脾則腹腫身重留於腎則囊足脛腫理必然也。

膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振振身瞶劇必有伏飲。〔註〕傷飲之病留而不去謂之留飲伏而難攻謂之伏飲伏飲者乃留飲膈上伏而不出發作有時者也即今之或值秋寒或感春風發則必喘滿欬吐痰盛寒熱背痛腰疼欬劇則目泣自出欬甚則振振身動世俗所謂吼喘病也。〔集註〕程林曰痰飲留於膈則令人喘欬吐發於外則令人寒熱背痛腰疼欬甚則肺葉舉而目泣出喘甚則息搖肩而振振身瞶如此劇者必有伏飲。

脈浮而細滑傷飲〔註〕凡飲病得脈浮而細滑者爲痰飲初病水邪未深之診也。〔集註〕李彥曰飲脈當沉今脈浮者水在肺也。

〔集註〕程林曰脈得諸沉者當責有水故脈沉者爲水飲。李彥曰經云沉潛水蓄是也。

病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之。〔按〕此爲留飲欲去故也句當在利反快之下必傳寫之謬。〔註〕凡飲病得脈伏者爲伏飲水邪已深之診也。凡病飲之人欲自下利利後通快此爲所留之飲欲自去而愈故也若雖利利反不快心下續有堅滿乃所留之飲盤結不欲去也宜攻之以甘遂半夏湯方中反佐甘草以激之意在所向無前即潛伏難攻水結未有不破者因自下利故又佐芍藥以約束之防勝後窮追不止也。

〔甘遂半夏湯方〕 甘遂大者三枚 半夏十二枚以水一升煮取半升去滓 茯苓五錢 甘草一枚如指大炙 以上四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之。

【集解】程林曰：留者行之用甘遂以決水飲，結者散之用半夏以散痰。飲甘遂之性直達，恐其過於行水緩以甘草白蜜之甘收以芍藥之酸。雖甘草甘遂相反而實有以相使此酸收甘緩約之之法也。靈樞經曰：約方猶約囊，其斯之謂歟。尤怡曰：甘草與甘遂相反而同用之者，蓋欲其一戰而留飲盡去，因相激而相成也。芍藥白蜜不特安中亦緩藥毒耳。

問曰：夫飲有四何謂也？師曰：有痰飲、有懸飲、有溢飲、有支飲。問曰：四飲何以爲異？師曰：其人素感今瘦，水走腸間瀝瀝有聲，謂之痰飲。飲後水流在脇下，欬吐引痛，謂之懸飲。飲水流行歸於四肢，當汗出而不汗出，身體疼重，謂之溢飲。欬逆倚息氣短不得臥，其形如腫，謂之支飲。【註】設問曰：夫飲不止於留飲伏飲也，而世謂飲有四者，何也？師曰：留飲伏飲言飲病新久深淺之理也。今世所謂四者，有痰飲、懸飲、溢飲、支飲，言飲病之情狀也。四飲亦不外乎留飲伏飲之理，但因其水流之處，特分之爲四耳。由其狀而命之名，故有四也。痰飲者，水飲走腸間不瀉，水精留膈間不輸，得陽煎熬成痰，得陰凝聚爲飲。凡所在處有聲，故在上則喉中有漉漉之聲，在下則腸間有瀝瀝之聲。即今之遇秋冬則發，至春夏則止，久咳嗽痰喘病也。懸飲者，飲後水流在脇下，不上不下，懸結不散，欬唾引痛，即今之脇下有水氣停飲，脇痛病也。溢飲者，飲後水流行歸於四肢，當汗出而不汗出，壅塞經表，身體疼重，即今之風水水腫病也。支飲者，飲後水停於胸，欬逆礙息，短氣不得臥，其形如水腫狀，即今之停飲喘滿不得臥之病也。【集註】趙良曰：水行走下，而高原之水流入於川，川入於海，塞其川則洪水泛溢，而人之飲水亦若是。內經曰：飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經并行。今所飲之水或因脾氣而不上散，或因肺氣而不下通，以致流溢隨處停積而爲病也。程林曰：內經云：土鬱之發飲，發於中，以其性流行不常，治法亦有

汗下溫利之異。李氏曰：夫飲有四，而此獨以痰飲名，總之水積陰或爲飲，飲凝陽或爲痰，則分而言之，飲有四合而言之，總爲痰飲而已。尤怡曰：素感今瘦，知其津液盡化痰飲，故不復外充形體，而反下走腸間也。飲水流溢者，水多氣逆也。其流於脇下者，則爲懸飲。其歸於四肢者，則爲溢飲。懸者，懸於一處；溢者，溢於四旁。其偏結而上附心肺者，則爲支飲。支飲者，如水之有派，木之有枝，附近於臟而不正中也。欬逆倚息不得臥者，上迫肺也。

水在心，心下堅築，短氣惡水，不欲飲水。水在脾，少氣身重，水在肝，脇下支滿，噫而痛。水在腎，心中然不能盡水之爲病也。故又發明水之在心者，心下堅，短氣而悸，不欲飲水也；水之在肺者，吐涎沫渴，欲飲水也；水之在脾者，少氣身重也；水之在肝者，脇下支滿，噫而痛也；水之在腎者，腰下悸也。醫者以此觸類而通之，則之病自無遁情矣。

支飲胸滿者，厚朴大黃湯主之。【按】支飲胸滿之胸字，當是腹字。若是胸字，無用承氣湯之理。是傳寫之謬。【註】支飲胸滿邪，在肺也。宜用木防己湯。葶苈大棗湯，支飲腹滿邪，在胃也。故用厚朴大黃湯，卽小承氣湯也。【集註】尤怡曰：胸滿疑作腹滿，支飲多胸滿，此何以獨用下法？厚朴大黃與小承氣湯同，設非腹中痛而閉者，未可以此輕試也。

〔厚朴大黃湯方〕 厚朴一尺 大黃六兩 枳實一枚 以上三味，以水五升，煮取二升，分溫再服。

心下有痰飲，胸脇支滿，目眩。苓桂朮甘湯主之。【註】此承上條詳出其證，以明其治也。心下有痰飲，謂痰飲之水流在膈間，故胸脇支滿，支滿則阻礙陽氣，不得上通於頭目，故目眩也。主以苓桂朮甘湯者，利水而通陽氣也。【集註】李氏曰：胸脇支滿痰飲停滯於中也。目眩，阻遏陽氣不上升也。茯苓淡滲以利水飲，桂枝宣導以行陽氣，白朮去濕健脾，甘草和中益氣，同爲補土制水之劑。

〔苓桂朮甘湯方〕 見上

腹滿口舌乾燥。此腸間有水氣。己椒苈黃圓主之。〔註〕此又承上條互詳其證。以別其治也。心下有痰飲。喉間有漉漉聲。腸間有水氣。腸中有瀝瀝聲者。用苓桂朮甘湯。卽溫藥和之之法也。若更腹滿。則水結實矣。口舌乾燥。則水不化矣。故以防己椒目。葶苈大黃。前後分攻水結。水結開豁。則腹滿可除。水化津生。則口燥可滋。小服而頻。示緩治之意。稍增者。稍稍增服之。口中有津液渴者。乃飲渴也。加芒硝者。以峻藥力耳。〔集註〕李氏曰。腹滿水聚於胃也。腸間有水氣。則濕漬中焦。津液不爲灌既。故口舌乾燥。前云水走腸間。瀝澤有聲爲痰飲。此腸間有水氣卽痰飲也。

〔防己目葶苈大黃圓方〕 防己 椒目 葶苈 熟 大黃各一兩 以上四味末之。蜜丸如梧子大。先食飲服一丸。日三服。稍增。口中有津液渴者。加芒硝半兩。

〔集解〕程林曰。防己椒目導飲於前清者。從小便而出。大黃葶苈推飲於後濁者。得從大便而下也。此前後分消。則腹滿減而水飲行。脾氣轉而津液生矣。若渴則甚於口舌乾燥。加芒硝佐諸藥以下。腹滿而救脾土派沉而弦者。懸飲內痛。〔註〕沉主裏。弦主飲。懸飲之病。屬飲停裏。故主懸飲內痛也。

病懸飲者。十棗湯主之。〔註〕此承上條以明其治也。主以十棗湯。亦形氣實者宜之。若形氣稍虛。又當臨證斟酌也。〔集解〕趙良曰。脈沉病在裏也。凡弦者。爲痛爲飲爲癖。懸飲結積在內作痛。故脈見沉弦。

〔十棗湯方〕 芫花熬 甘遂 大戟各等分 以上三味。搗篩以水一升五合。先煮肥大棗十枚。取八合。去滓。內藥末。強人服一錢。匕羸人服半錢。平旦溫服之。不下者。明日更服半錢。得快利後。糜粥日養。

〔集解〕李氏曰。三物皆味苦。苦以泄之。能直達水飲窠囊之處。但恐峻利泄人真元。故加大棗以緩之。且棗爲脾果。補土。所以制水也。

病溢飲者。當發其汗。大青龍湯主之。小青龍湯亦主之。〔註〕溢飲病屬經表。雖當發汗。然不無寒熱之別也。熱者以

訂正仲景全書金匱要略註下 痘飲欬嗽病脈證并治第十三

八

辛涼發其汗大青龍湯寒者以辛溫發其汗小青龍湯故曰大青龍湯主之小青龍湯亦主之也水氣流行歸於四肢當汗出而不汗出身體重痛謂之溢飲夫四肢陽也水在陰者宜利在陽者宜汗

〔大青龍湯方〕

麻黃去節六兩

桂枝二兩

甘草二兩

杏仁四十個去皮尖

生薑三兩

大棗十二枚

石膏如雞子大以上

七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗多者溫粉撲之

〔小青龍湯方〕

麻黃去節三兩

芍藥三兩

五味子半升

乾薑三兩

甘草三兩

細辛三兩

桂枝二兩

半夏半升湯洗

以上八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

也

〔集解〕尤怡曰大青龍合桂麻而去芍藥加石膏則水氣不甚而挾熱者宜之倘飲多而寒伏則必以小青龍爲當

肺飲不弦但苦喘短氣〔註〕弦爲諸飲之診然專主者肝也水在肝部則病懸飲故脈沉弦也水在肺部則病支飲

故脈不弦也喘欬短氣肺飲證也脇下引痛肝飲證也今亦不見脇下引痛之肝證但見苦喘短氣之肺證故曰肺

飲不弦也〔集註〕李少曰弦爲肝脈故肺飲不弦苦喘短氣肺邪迫塞也前云欬逆倚息短氣爲支飲是也

支飲亦喘而不能臥加短氣其脈平也〔註〕支飲水在肺之病故亦喘而不能臥短氣也其脈平謂見肺之平脈或浮或濶或短此詳申上條不弦之義也

支飲不得息葶藶大棗湯主之〔註〕此承上條以明其治也喘欬不能臥短氣不得息皆水在肺之急證也故以葶藶大棗湯直瀉肺水也〔集註〕沈明宗曰此支飲偏溢於肺也支飲貯於胸膈上干於肺氣逆則呼吸難以通徹故不得息然急則治標所以佐大棗之甘以保脾葶藶之苦以泄肺俾肺氣通調脾得轉輸爲峻攻支飲在肺之方也尤怡曰不得息肺滿而氣閉也葶藶入肺通閉泄滿用大棗者不使傷正氣也

〔葶藶大棗湯方〕

見肺癰中

〔集註〕尤怡曰

〔集註〕尤怡曰

膈間支飲。其人喘滿心下痞堅。面色黧黑。其脈沉緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防己湯主之。虛者卽愈。實者三日復發。復與不愈者。宜木防己湯去石膏。加茯苓。芒硝湯主之。【註】支飲則喘滿不得息。水在胸肺也。更兼心下痞堅。則水盤結連引膈間。故曰膈間支飲也。面色黧黑。水邪深結之色也。其脈沉緊。水邪深結之脈也。水邪深結。故有喘滿痞堅之證也。得之數十日。醫或吐之不愈者。是水邪不單結在上。故越之而不愈也。或下之不愈者。是水邪不單結在下。雖竭之亦不愈也。心下痞堅。飲結在中可知。故以木防己湯開三焦水結。通上中下之氣。方中用人身以吐下後傷正也。故水邪虛結者。服之卽愈。若水邪實結者。雖愈亦復發也。卽復與前方亦不能愈。當以前方減石膏之寒凝。加芒硝峻開堅結。加茯苓直輸水道。未有不愈者也。【集註】李少川曰。喘滿痞堅。膈間支飲逆上也。面黑者。飲屬北方水色也。脈沉爲飲。緊爲寒。皆陰脈。以水飲稟陰寒之氣也。吐下俱行不愈。則陰陽之氣俱虛。木防己湯補虛散飲。虛者受補卽愈。實者飲邪固結不解。故復發不愈。乃寒氣凝聚未解。故去石膏。恐寒胃也。加茯苓淡以滲飲。芒硝鹹以軟堅。

〔木防己湯方〕 木防己兩 石膏十二枚
雞子大 桂枝兩 人參四
兩 以上四味。以水六升。煮取二升。分溫再服。
〔木防己加茯苓芒硝湯方〕 木防己 桂枝各二
兩 人參 茯苓各四
兩 芒硝三 以上四味。以水六升。煮取二升。去滓。內芒硝。再微煎。分溫再服。微利則愈。

心下有支飲。其人苦冒眩。澤瀉湯主之。【註】心下膈下也。水在膈上。則喘滿。水在膈下。則惟苦眩暉。以澤瀉湯之平和。小劑主之。治支飲之輕者可也。若陽虛水盛。又當從事乎苓桂尤甘湯。五苓散矣。【集註】尤怡曰。水飲之邪。上乘清陽之位。則爲冒眩。冒者昏冒而神不清。如有物冒蔽之也。眩者目眩轉而乍見眩黑也。澤瀉泄水氣。白朮補土氣。以勝水也。

〔澤瀉湯方〕 澤瀉五
兩 白朮二
兩

以上二味。以水二升。煮取一升。分溫再服。

病痰飲者當以溫藥和之。【註】稠濁爲痰陽之盛也。稀清爲飲陰之盛也。有痰無飲當以涼藥治之。有飲無痰當以溫藥和之可也。

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死。至一百日或一歲宜十棗湯。【註】支飲水在膈之上下也。水乘肺則欬水乘心則煩水結胸則痛。其人形氣俱實以十棗湯攻之可也。然病此不卒死或至百日或延至一年者以飲陰邪陰性遲故不卒死也。

〔十棗湯方〕見上

欬家其脈弦爲有水。十棗湯主之。【註】此承上條以出其脈也。欬家謂久欬之家也。欬家未可攻也。若脈弦其欬則爲有水也。有水可攻故以十棗湯攻之。【集註】魏荔彤曰：欬嗽者有飲冷而欬嗽者有因外感風寒而欬嗽者所謂形寒飲冷則傷肺也。此外感風寒之欬嗽也有因傷倦而欬嗽者所謂陰虛內熱火刑肺金此內傷虛勞之欬嗽也於此俱無涉也。仲景命之曰：欬家專爲痰飲在內逆氣上衝之欬嗽言也。故其脈必弦無外感家之浮無內虛家之數但見弦者知有水飲在中爲患也。主之以十棗湯使水邪有所制斯下注而免於上厥也。

脈雙弦者寒也皆大下後裏虛脈偏弦者飲也。【按】此條係在首條微者短氣之下今分在此。【註】脈雙弦者兩手左右脈皆弦也。偏弦者或左或右脈單弦也。偏弦者飲也故當下之雙弦者寒也不當下也即偏弦當下亦不可大下若大下之則虛其裏單弦變而爲雙弦矣。弦爲陰脈重陰則寒故曰雙弦者寒也此又示人不可以弦脈專主飲也。

脈弦數有寒飲冬夏難治。【按】脈弦數之數字當是遲字始與寒飲之理合是傳寫之謬。【註】單弦主飲固當下也若單弦兼遲而有寒飲不可下也。寒飲之欬冬夏難治者以夏陰極於內冬陰極於外故也。此承上二條詳申弦脈飲病可下不可下之義也。

久歟數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家【註】久歟數歲卽今之年年舉發痰飲歟嗽水喘之病也若其脈弱者知邪不進則爲可治若實大數者知邪日進故死也若脈虛者知正氣虛必苦冒也審其人素本有支飲則不必治其歟宜於痰飲家求治法也【集註】尤怡曰久歟數歲不已者支飲潰肺而歟飲久不已則歟久不愈也歟久者其氣必虛而脈反實大數者則其邪猶盛以猶盛之邪而臨已虛之氣其能久持乎故死若脈虛者正氣固虛而飲氣亦衰故可治然飲雖衰而正不能禦亦足以上蔽清陽之氣故其人必苦冒也此病爲支飲所致去其飲則病自愈故曰治屬飲家

歟逆倚息不得臥小青龍湯主之青龍湯下已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣從少腹上衝胸咽手足冷其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣衝衝氣卽低而反更歟胸滿者用苓桂五味甘草湯去桂加乾薑細辛以治其歟滿歟滿卽止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱藥也服之當遂渴而渴反正者爲支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水茯苓桂枝五味甘草湯去甘草桂枝加細辛乾薑半夏湯主之水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痹故不內之若逆而內之者必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也若面熱如醉此爲胃熱上衝薰其面加大黃以利之【按】小小青龍湯下已之下字當是汗字大小青龍湯皆汗劑必是傳寫之誤【註】歟逆古歟嗽名也倚息今呼吸促也歟嗽呼吸氣促不得臥久病多屬痰飲新病每兼形寒故宜以小青龍湯汗之以散內飲外寒也小青龍湯辛溫大散惟有餘之人宜之若誤施之於不足之人辛熱則傷陰故多唾口燥也大散則傷陽故手足厥逆也面熱如醉陽外浮也小便難氣上衝陰內竭也脈沉微裏氣弱也手足痹表氣虛也時復冒虛之甚也雖陰陽表裏俱虛然屬誤汗寒熱錯雜之壞病故與茯苓桂枝五味甘草湯先通陽和陰俟上衝氣平再議他法也今氣衝雖下而反更歟嗽胸滿者則知寒飲貯胸故嫌桂枝偏於走表加乾薑細辛獨勝中之寒飲也服之歟滿卽止而更復渴衝氣復發則知陰

火上逆爲乾薑細辛熱藥所動故也。若服之時遂渴稍時而渴反止者則爲其人素有支飲也。支飲者法當冒冒者是因飲逆胸中作嘔而冒非陽虛爲飲所阻不升之冒也。故仍以本方復加半夏者以去水也。更去甘草者恐甘助嘔也。水去嘔止其人面形腫者加杏仁降嘔欬上逆之餘邪。若不因嘔欬面腫則爲風邪所襲應加麻黃今其人血虛手足痹陽虛手足厥且因嘔欬後而腫故不加也。若兼有面熱如醉此爲胃熱上衝熏其面更加大黃以利胃熱可也。

〔苓桂五味甘草湯方〕 茯苓四兩 桂枝四兩 甘草三兩 五味子半升 以上四味以水八升煮取三升去滓分溫三服。

〔苓甘五味薑辛湯方〕 茯苓四兩 甘草 乾薑 細辛各二分 五味子半升 以上五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三服。

〔苓桂五味甘草去桂加乾薑細辛半夏湯方〕 茯苓四兩 甘草 乾薑細辛各二分 五味子 半夏各半升以上五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三服。

〔苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯方〕 茯苓四兩 甘草三分 五味子半升 乾薑三分 細辛三分 半夏半升杏仁半升去皮尖以上七味以水一斗煮取三升去滓溫服半升服三日。

〔苓甘五味加薑辛半杏大黃湯方〕 茯苓四兩 半夏半升 甘草三分 五味子半升 乾薑三分 細辛三分杏仁半升去皮尖以上八味以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三服。

消渴小便利淋病脈證并治第十四

厥陰之爲病消渴消渴氣上衝心心中疼熱飢而不欲食卽食吐衄下之利不止【按】此條是傷寒論厥陽經正病與雜病消渴之義不同必是錯簡。

寸口脈浮而遲浮卽爲虛遲卽爲勞虛則衛氣不足勞則榮氣竭。【按】此條當在虛勞篇中錯簡在此。【註】寸口通指左右三部而言也。浮而有力爲風浮而無力爲虛。按之兼遲卽爲虛勞之證。故主衛外榮內虛竭也。

趺陽脈浮而數浮卽爲氣數卽消穀而大堅氣盛則溲數溲數卽堅堅數相搏卽爲消渴。【按】而大堅句不成文。大字之下當有便字必是傳寫之誤。【註】趺陽胃脈也。胃脈浮盛按之而數爲胃氣熱故善消穀也。火盛消穀則大便必堅氣盛消水則小便必數故溲數卽堅也。堅數相搏卽爲消穀消渴之病。

趺陽脈數胃中有熱卽消穀引食大便必堅小便卽數。【註】此復申上條大便堅小便數之義也。

男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸主之。【註】飲水多而小便少者水消於上故名上消也。食穀多而大便堅者食消於中故名中消也。飲水多而小便反多者水消於下故名下消也。上中二消屬熱惟下消寒熱兼之以腎爲水火之藏也飲一溲一其中無熱消耗可知矣故與腎氣丸從陰中溫養其陽使腎陰攝水則不直趨下源腎氣上蒸則能化生津液何消渴之有耶。【集註】程林曰小便多則消渴經曰飲一溲二者不治今飲一溲一故與腎氣丸治之。腎中之動氣卽水中之命火下焦腎中之火蒸其水之精氣達於上焦若肺金清肅如雲升而雨降則水精四布五經并行自無消渴之患今其人必攝養失宜腎水衰竭龍雷之火不安於下但炎於上而刑肺金肺熱葉焦則消渴引飲其飲入於胃遊溢滲出下無火化直入膀胱則飲一斗溺亦一斗也故用桂附腎氣丸助真火蒸化上升津液何消渴之有哉沈明宗曰男子二字是指房勞傷腎火旺水虧而成消渴者。

〔腎氣丸方〕見婦人雜病中

脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗五苓散主之。【註】脈浮病生於外也脈浮微熱熱在表也小便不利水停中也水停則不化津液故消渴也發表利水止渴生津之劑惟五苓散能之故以五苓散主之也於此推之曰脈浮可知上條脈沉也曰微熱可知上條無熱也且可知凡脈沉無熱之消渴皆當用腎氣丸方也。

〔五苓散方〕 見痰飲中

脈浮發熱渴欲飲水小便不利者。豬苓湯主之。〔註〕此與上條文同義異。文同者脈浮小便不利。發熱微熱渴欲飲水消渴也。而義異者。一以五苓散利水發汗。一以豬苓湯利水滋乾也。審其所以義異之意。必在有汗無汗之間也。何以知之。一以發汗爲主。其因無汗可知。一以滋乾爲主。其因有汗可知。故文同而義異。病同而治別也。仲景之書言外寓意處甚多。在學者以意會之自識也。

〔豬苓湯方〕 豬苓去皮

茯苓 阿膠 滑石 澤瀉各一兩

以上五味以水四升先煮四味取二升去滓內

烊消溫服七合日三服

渴欲飲水口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。〔註〕消渴則渴欲飲水。水入卽消。而仍口乾舌燥者。是熱邪盛也。故以白虎加人參湯清熱生津也。

〔白虎加人參湯方〕 見中喝中

渴欲飲水水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。〔註〕渴欲飲水水入卽吐。名水逆者。是裏熱微而水邪盛也。故以五苓散利水止吐也。〔襄註〕李少曰。內有積水。故水入則拒格而上吐。名水逆也。五苓散利水故主之。渴欲飲水不止者。文蛤散主之。〔註〕渴欲飲水水入則吐。小便不利者。五苓散證也。渴欲飲水水入則消。口乾舌燥者。白虎人參湯證也。渴欲飲水而不吐水。非水邪盛也。不口乾舌燥。非熱邪盛也。惟引飲不止。故以文蛤一味。不寒不溫。不清不利。專意於生津止渴也。或云文蛤卽今吳人所食花蛤。性寒味鹹。利水勝熱。然屢試而不效。嘗考五倍子亦名文蛤。按法製之名百藥煎。大能生津止渴。故嘗用之屢試屢驗也。

〔文蛤散方〕 文蛤兩 以上一味杵爲散。以沸湯五合和服方寸匕。

小便不利者。有水氣。其人苦渴。栝蒌瞿麥圓主之。〔註〕小便不利。水蓄於膀胱也。其人苦渴。水不化生津液也。以薯

蘋花粉之潤燥生津而苦渴自止以茯苓瞿麥之滲泄利水而小便自利更加炮附宣通陽氣上蒸津液下行水氣亦腎氣丸之變制也然其人必脈沉無熱始合法也

〔桔梗瞿麥丸方〕

桔梗根(二兩) 郡
茯苓(三兩)

薯蕷(三兩)

附子炮(一枚)

瞿麥(一兩)

以上五味末之煉蜜丸梧子

大飲服三丸日三服不知增至七八丸以小便利腹中溫爲知

〔集解〕李氏曰此方與五苓散同爲利水生津之劑此用薯蕷卽五苓用白朮之義也但五苓兼外有微熱故用桂枝走表此內惟水氣故用附子溫下也尤怡曰此下焦陽弱氣冷而水氣不行之證故以附子益陽氣茯苓瞿麥行水氣觀方後云腹中溫爲知可以推矣其人苦渴則是水氣偏結於下而燥火獨聚於上夫上浮之燄非滋不熄下積之陰非煖不消而寒潤辛溫並行不悖此方爲良法也求變通者於此三復焉

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之〔註〕無表裏他證小便不利而渴者消渴水邪病也小便不利不渴者小便癃閉病也主蒲灰散滑石白魚散者蒲灰亂髮血分藥也滑石白魚利水藥也然必是水鬱於血分故并主是方也觀東垣以通關丸治熱鬱血分之小便不利則可知在血分多不渴也主茯苓戎鹽湯者茯苓淡滲白朮燥濕戎鹽潤下亦必是水濕鬱於下也鹽爲渴者之大戒觀用戎鹽則不渴可知也〔集註〕魏荔彤曰小便不利者所因有不同治法亦不一仲師併列三方以俟主治者擇其善而從之

〔蒲灰散方〕 蒲灰(七分)

滑石(三分)

以上二味杵爲散飲服方寸七日三服

〔滑石白魚散方〕 滑石(二分)

亂髮(三分)

白魚(二分)

以上三味杵爲散飲服半錢七日三服

〔茯苓戎鹽湯方〕 茯苓(半斤)

白朮(二兩)

戎鹽(一枝) 滴丸(九分)

以上三味以水五升煮取三升分溫三服

淋之爲病小便如粟狀少腹弦急痛引臍中〔註〕小便不利及淋病者或有少腹弦急痛引臍中之證然小便不利者水道澀少而不痛淋則溲數水道澀少而痛有不同也小便溺出狀如粟米者卽今之所謂石淋也

淋家不可發汗。發汗必便血。〔註〕淋家濕熱蓄於膀胱之病也。若發其汗，濕從汗去，熱則獨留水府，告匱，熱迫陰血從小便出。卽今之所謂血淋也。【集註】高世栻曰：淋家之膀胱津液先虛，故不可發汗。若發汗更奪其津液，則膀胱氣竭，胞中併虛，故必便血，便血溺血也。

水氣病脈證并治第十五

少陰脈緊而沉，緊則爲痛，沉則爲水。小便卽難，脈得諸沉者，當責有水。身體腫重。〔按〕脈得諸沉者一條，乃始論水氣病之脈，當列於篇首。但古本脈得諸沉之上，有少陰脈緊而沉四句，文義不屬，并有脫簡不釋。【註】欬喘而不腫，謂之痰飲。腫重而不欬喘，謂之水氣。沉脈得於諸部，身體不腫重者，當責爲氣也。腫重者，當責有水也。以水畜於裏，故脈沉，水溢於表，故腫重也。

水病脈出者死。〔註〕水病肉腫，脈當不見。今脈出者，是氣外散也，故死。【集註】沈明宗曰：脈得諸沉，沉爲氣鬱，不行於表，則絡脈虛，虛卽水泛皮膚肌肉，故身體腫重，當責有水。但沉爲正水，而正水乃陰感陽鬱，脈必沉極。若疎見浮起，是真氣離根之象，故曰水病脈出者死。若風皮二水脈浮洪，不在此例。

問曰：病下利後渴飲水，小便不利，腹滿，陰腫者何也？答曰：此法當病水。若小便自利及汗出者，自當愈。〔註〕病下利則虛，其土傷其津也。土虛則水易妄行。津傷則必欲飲水。若小便自利及汗出者，則水精輸布，何水病之有。惟小便不利，則水無所從出，故必病水。病水者，脾必虛，不能制水，故腹滿也。腎必虛，不能主水，故陰腫也。於此推之，凡病後傷津渴欲飲水，小便不利者，皆當防病水也。【集註】程林曰：病下利，則脾主衰而津液竭，故渴引飲。而土又不能制水，故小便不利。脾惡濕，故腹滿。腎主水，故陰腫。此爲病水無疑。若小便利，則水行，汗出，則水散，雖不藥而亦自愈矣。

夫水病人，目下有臥蠶而目鮮澤，脈伏，其人消渴，病水腹大，小便不利，其脈沉絕者，有水可下之。〔按〕其人消渴之