

欽定四庫全書

子部

絳雪園古方選註卷

六

三至



南京中医药大学图书馆版权所有

終雪園古方選註

文

甘
生
薑
一
斤
切
八
片
一
合
去
滓
分
溫
再
服

蘇州王子接撰

枚生用去

切八片

一合去滓 分溫再服

終雪園古方選註

四逆者四肢逆冷因證以名方也凡三陰一陽證中有厥者皆用之故少陰用以救元海之陽太陰用以溫臟中之寒厥陰薄厥陽欲立亡非此不救至於太陽誤汗亡陽亦用之者以太少為水火之主非交通中土之氣不能內復真陽故以生附子生乾薑徹上徹下開闢羣陰迎陽歸舍交接於十二經反複以炙草監之者亡陽不至於大汗則陽未必盡亡故可緩制留中而為外召陽氣之良法

通脈四逆湯

甘草

炙 二兩

附子

大者一枚生用 去皮破八片

乾薑

三兩強人 可用四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓 分溫再服

其脈即出者愈後加減

通脈四逆少陰格陽面赤陽越欲亡急用乾薑生附奪
門而入驅散陰霾甘草監制薑附烈性留頓中宮扶持
太和元氣藉葱白入營通脈庶可迎陽內返推仲景之
心只取其脈通陽返了無餘義矣至於腹痛加芍藥嘔

加生薑咽痛加桔梗利不止加人葠或涉太陰或干陽明或陰火僭上或穀氣不得非格陽證中所必有者也故仲景不列藥品於主方之內學者所當詳審

人參四逆湯

人參一兩甘草二兩炙乾薑一兩五錢附子一枚生去皮切八片

右四味以水三升煮取一升二合去滓分溫再

服

四逆加人葠治亡陰利止之方蓋陰亡則陽氣亦與之

俱去故不當獨治其陰而以乾薑附子溫經助陽人參
甘草生津和陰

茯苓四逆湯

茯苓

六兩

乾薑

一兩五錢

附子

一枚生

甘草

二兩炙

人參

一兩

右五味㕮咀

以水五升煮取一升二合去滓

分

溫再服

茯苓四逆湯即真武湯之變方太陽篇中汗出煩躁禁
用大青龍即以真武湯救之何況煩躁生於先汗後下

陽由誤下而欲亡能不救下元之真陽乎故重用茯苓
六兩滲泄人復甘草下行以安欲失之真陽生用乾薑
附子以祛未盡之寒邪陽和躁寧不使其手足厥逆故
亦名四逆

通脈四逆加猪胆汁湯

乾薑

三兩強
人四兩

甘草

二兩
炙

附子

大者一
枚生用

猪胆汁

四合

右三味以水三升煮取一升二合去滓 内猪胆汁

分温再服

四逆加胆汁為陽虛陰甚從治之方津液內竭脈微欲絕是亡陰亡陽由於吐已下後用四逆必當通脈固中焦胃陽啓下焦元陽但陰甚格拒恐陽藥入中強梁不伏故以猪胆汁苦寒從陰之性引領陽藥從心通脈先和陰而後復陽

白通湯

葱白

四莖

乾薑

一兩

附子

一枚

生用

去皮

臍破

八片

去

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

白通者薑附性燥腎之所苦須藉葱白之潤以通於腎故名若夫金匱云面赤者加葱白則是葱白通上焦之陽下交於腎附子啓下焦之陽上承於心乾薑溫中土之陽以通上下上下交水火濟利自止矣按脈之生原下起於腎由腎而中歸於胃由胃而上出於心由心而大會於肺外出於經脈三者能變通於上下亦由是也白通加猪胆汁湯

人尿

五合

猪胆汁

一合

葱白

四莖

乾薑

一兩

附子

一枚

生用

去皮破八

片

已上三味以水三升煮取一升去滓 內胆汁人尿
和令相得 分溫再服 若無胆亦可用

白通湯陽藥也少陰下利寒氣太甚內為格拒陽氣逆
亂當用監制之法人尿之鹹勝猪胆之苦猪胆之苦勝薑蔥附
之辛辛受制於鹹苦則鹹苦為之向導便能下入少陰
俾冷性消而熱性發其功乃成此又為外護法也

附子湯

附子

二枚生用去皮

茯苓

三兩

白芍

三兩

人葠

二兩

白朮

四兩

右五味以水八升煮取三升去滓 溫服一升 日

三服

附子湯少陰固本禦邪之劑功在倍用生附力肩少陰之重任故以名方其佐以太厥之藥者扶少陰之陽而不調太厥之開闔則少陰之樞紐終不得和故用白朮以培太陰之開白芍以收厥陰之闔茯苓以利少陰之樞紐獨是少陰之邪其出者從陰內注於骨苟非生附

焉能直入少陰注於骨間散寒救陽尤必人後佐生附
方能下鼓水中之元陽上資君火之熱化全賴元陽一
起而少陰之病霍然矣再論藥品與真武相同唯生熟
分兩各異其補陽鎮陰之分岐只在一味轉旋學者所
當深心體會

朮附湯

白朮

四兩

附子

三枚炮去皮破八片

甘草

二兩炙

生薑

二兩切

大棗

十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓 分溫三服 初服其人覺身如痺半日許復服之三服盡 其人如冒狀勿怪此以附子與朮並走皮中逐水氣未得除故使之耳

濕勝於風者用朮附湯以濕之中人也太陰受之白朮健脾去濕熟附溫經去濕佐以薑棗和表裏不必治風但使濕去則風無所戀而自解矣

桂枝附子湯

桂枝

四兩 去皮

熟附子

三枚 炮 去皮 臍破 八片

甘草

二兩 炙

生薑

三兩

切大棗

十二枚 擘

右五味以水六升煮取二升去滓 分溫三服

桂枝附子湯兩見篇中一治亡陽一治風濕治風濕者以風為天之陽邪桂枝甘草辛甘可以化風濕為地之陰邪熟附可以溫經去濕治亡陽者心陽虛而汗脫桂枝能固心經漏泄之汗太陽虛而津液不藏熟附能固亡陽之汗佐以薑棗者凡表裏有邪皆用之此風勝於

濕之主方

甘草附子湯

甘草

炙二兩

附子

二枚炮去皮破八片

白朮

二兩

桂枝

四兩去皮

右四味以水六升煮取三升去滓 溫服一升 日

三服

甘草附子湯兩表兩裏之偶方風淫於表濕流關節陽衰陰勝治宜兩顧白朮附子顧裏勝濕桂枝甘草顧表化風獨以甘草冠其名者病深關節義在緩而行之徐

徐救解也

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝

三兩 去皮

甘草

二兩 炙

生薑

三兩 切

大棗

十二枚 擘

附子

一枚

炮去皮 破八片

右五味㕮咀 以水七升煮取三升去滓 溫服一

升 惡寒止停後服

桂枝湯去芍藥加附子者下後微惡寒顯然陽氣渙散於中下矣當急救其陽毋暇顧戀陰氣以附子直從下

焦溫經助陽臣以桂枝甘草載還中焦陽氣以杜亡陽之機為禦後之策

甘草乾薑湯

甘草四兩乾薑二兩

右二味㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分

溫再服

甘草乾薑湯桂枝甘草湯同為辛甘化陽而有分頭異治之道桂枝走表治太陽表虛乾薑守中治少陰裏虛