

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百五十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

華濟才卷一百五十八

產後諸疾

崩中漏下

產後崩中漏下者蓋由產時傷耗經脉未得平復而

周王朱櫛 撰

傷耗經脉未得平復而

或因醎酸不節傷露榮

七氣所傷臟氣不平

或崩漏下血不止或崩漏下血不止或崩漏下血不止

欽定四庫全書

普濟方

一

方

側柏丸 治產後崩中久下血不止或赤或黑臍下疼

痛

側柏炙微黃 白芍藥 黃耆剉 熟乾地黄 續斷各一

兩半 代赭一兩半 牛角鰓灰 禹餘糧燒醋淬 桑耳

當歸剉微炒 艾葉微炒各一兩 龜甲二兩塗醋炙令微黃

右為末煉蜜搗三五百杵丸如小豆大每服空心以

黃耆湯下三十丸

熟乾地黄散 治產後崩中頭目旋暈神思昏迷四肢

煩亂不知人事

熟乾地黄 伏龍肝 黃耆 赤石脂 阿膠

各一兩

甘草 白朮 艾葉 川芎 人參

炒 各半兩

當歸

三分

右咬咀每服三錢薑三片水一大盞煎至七分去滓

溫服

阿膠丸 治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠

赤石脂

各半兩

續斷

川芎

當歸

甘草

丹參

各一兩

龍骨

鹿茸

酥炙

烏賊骨

龜甲

炙各三兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下二三

十丸一方加鱉甲一兩

白芍藥散

治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損

白芍藥

牡蠣

乾薑

熟乾地黄

桂心

黃耆

烏賊骨

鹿角膠

龍骨

各一兩

右為末食前溫酒調下二錢

療產後下血不止

桑耳

炙

芍藥

炙

地榆

葛根

牛角腮

阿膠

各六

分

艾葉

雞蘇

各四分

白龍骨

十分

右呖咀以水二升煮取八合分三服 此藥尤能治

產後痢先以桂九小下之次投硃砂九日九十九利
頓減半次日遂愈硃砂九產後雖無疾亦宜服之能
養血氣去積滯

大黃散 治崩漏下血不止

大黃_{三兩} 芒硝_{一兩} 桃仁 水蛭 虻蟲_{各三枚} 甘草

當歸_{各三兩} 蟪蟲_{四十枚}

右咬咀以水三升酒二升合煎取三升去滓分三服

龍骨散 療崩中下血

龍骨_研 赤石脂_{研各六分} 烏賊魚骨 牡蠣粉

肉蓯蓉_{各五兩} 龜甲_炙 芍藥

右搗散飲服方寸七日三漸加之加乾地黄十分佳

龜甲散 治產後崩中下血過多不止

龜甲

三兩醋浸
炙令微黃

黑桑耳

二兩

鹿茸

一兩去毛塗
酥炙令黃

白石脂

一兩

禹餘糧

一兩燒醋
滓三遍

當歸

一兩剉
微炒

吳茱萸

半兩湯浸十
遍炒令微黃

芎藭

一兩

栢子仁

一兩

右為散每於食前以溫酒調下一錢

瑞蓮散

治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮

百枚燒
存性

棕櫚

燒存
性

當歸

桂心
各一兩

鯉魚鱗

燒

川芎

各三
分

檳榔

三
枚

右為細末每服三錢煨薑酒調下未止更盡即止

桂丸

硃砂 桂心 甘遂 丁香 木香

芫花

以硃砂炒焦已上各等分

巴豆

去心皮不去油減半

右為細末麪糊丸如菉豆大每服二丸三丸溫酒下

加減更量虛實此丸最宜取積不以久近皆能消化

阿膠散

出聖惠方

治產後崩中下血不止作血片如雞肝色

碎爛者

阿膠

一兩搗碎炒黃燥

當歸

一兩剉微炒

續斷

一兩剉

地榆

一兩剉

熟乾地黄一兩 牛膝一兩 紅花子一兩

右為散每服三錢以伏龍肝一兩浸取水一中盞煎

至六分去滓每於食前溫服

騏驎竭散出聖惠方 治產後崩中下血不絕小腹疼痛

騏驎竭一兩 禹餘糧一兩 燒醋地榆一兩

阿膠二兩 搗碎炒令黃色 赤芍藥一兩 熟乾地黄一兩

右為散每於食前以溫酒調下一錢

熟地黄散出聖惠方 治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損

熟地黃

赤石脂

各一兩

鹿茸

牡蠣

當歸

各半兩

右為細末食前粥飲調二錢

固經丸

出醫方集成

治產後所下過多勞役傷損致血暴崩

淋瀝不已或醎酸不節所致此謂重傷如有腹脹則

是瘀血使然此藥又非其治

艾葉

赤石脂

煨

補骨脂

木賊

各半兩

附子

一箇炮

右為末陳米湯和丸如梧桐子大食前溫酒下二十

丸米飲亦可一方煎芎歸湯加芍藥下評曰血崩不

是輕病况產後有此是謂重傷恐不止
致多因驚憂怒氣不平或產後服斷血藥太早致惡
血不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸自難責効不若
大料煮芎藭湯加芍藥候定隨證藥治為得小腹滿
痛肝經已壞難治局方大順散除杏仁用醋煮附子
依等分入効

桂心散

出千金方

治崩漏下血不止

桂心

蟬蛸

各二兩

枯薑根

牡丹

各三兩

豉

一升

右呔咀以水八升煎取三升去滓分三服

治產後血崩不止

出護命方

兔絲子

杜仲

去皮

益智子

去皮

草薢

山茱萸

茯苓

五味子

赤石脂

龍骨

川芎

各一分

川椒

三銖

覆盆子

半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下三

十九

治產後崩中惡露不止大腑冷方喫此方

出護命方

白朮

當歸

芍

白芷

各半兩

牡蠣

火煨三分

舶上硫黃

一兩細研

右為細末令如飛塵同舶上硫黃相袞鍊蜜丸如梧桐

子大早朝空心鹽湯下三十丸

伏龍肝散 療崩中下血數升氣欲絕

伏龍肝

五升

人參

一兩

麝香

二兩

生薑

四兩

右切以水一大斗煮土取二升下藥煎取一升半更

別研伏龍肝一雞子許并麝香內湯中攪令調分服

治產後連下血不止者

黃連

黃蘗

阿膠

炙各三分

熟艾

二兩

右以水六升煮取二升半分溫為三服

龍骨丸

治產後虛冷下血及所下晝夜無數兼治產

後惡露不斷

方見本門產後惡露不絕類

龍骨丸

加味芎藭湯

出醫學類証

芎藭

當歸

芍藥

各等分

右咬咀每服四錢水一盞半煮取七分去滓無時熱

服

治產後崩露下血不止

出朱氏集驗方

棕櫚皮

乾薑

烏梅

各一兩燒灰存性

右研為細末每服三錢煎烏梅湯調下不拘時候久

患三服愈

香墨散

出聖惠方

治產後崩中下血不止

香墨

半兩

露蜂房

半兩微炒

龍骨

半兩

右為散每於食前用水煎乾地黃湯調下二錢

又方

出聖
惠方

白塼

半兩

乳香

一分

阿膠

半兩

搗碎
炒令黃燥

右為散每於食前以粥飲調下一錢

赤龍皮散

出聖
惠方

治產後崩中有惡物或渴者

赤鯉魚皮

二兩

亂髮

一兩

椶櫚皮

一兩

剉

右同於銚子內用麻點火均炒令煙盡候冷入麝香

半分研令勻每於食前以醋一合水二合煎一兩沸

調一錢服之