

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百八十九



南京中醫藥大學圖書館版權所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十九 明

周王朱橚 撰

諸血門

吐血衄血 附論

夫口鼻之中俱出血者由因勞熱而成是以血者本屬於心經脈流行不暫停滯一關不利百病俱生或有憂悸之所因或有卒驚之所致此皆食飽過度飲酒勞傷壅滯積蓄於心胸熱毒薰蒸於肝肺臟腑既蘊邪熱則

血流散上行故令吐血而致鼻衄也

方

天門冬湯

出醫方大成

治思慮傷心吐血不止

遠志

去心甘草水煮

白芍藥

天門冬

去心

黃耆

去蘆

藕節

阿膠

蛤粉炒

沒藥

當歸

去蘆

生地黃

各一兩

人參

甘草

炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓溫

服不據時

刺薊散

出聖惠方

治吐血衄血及大小便下血不止

刺薊

白芍藥

白朮

人參

去蘆頭

生乾地黄

鹿角膠

搗碎炒令黃色各一兩

芎藭

桂心

黃芩

各半兩

右為散不計時候以生地黄汁調下二錢

竹茹散

出聖惠方

治吐血衄血此為內損或勞傷所致

青竹茹

白芍藥

芎藭

桂心

當歸

各一兩

生乾地黄

三兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分不計時候

溫服

伏龍肝湯

出千金方

治五臟熱結吐血衄血嘔血

伏龍肝

鷄子大一枚

生竹茹一升

芍藥

當歸

黃芩

芎藭

甘草

各二兩

生地黄

一觔

右呖咀以水一斗三升先煮竹茹減三升下藥取三

升分作三服一方有桂心

人參散

人參

黑豆

燈心

淡竹茹

放棗行

扁栢

腦 茅根 紫萍

右等分㕮咀同煎服或為細末以紅酒調下

地黃散

一名生地黃
飲出千金方

治口鼻皆出血血上行胸心氣急

及大便出血

生地黃

八兩

蒲黃

一升

地骨皮

五兩

黃芩

去黑心

芍藥

生竹茹

各三兩

右㕮咀以水八升煮取三升七分溫三服

當歸湯

出聖惠方

治衄血吐血不止心胸疼痛

當歸 乾薑 芍藥 阿膠 各二兩 黃芩 三兩

右㕮咀以水六升煮取二升分三服一方為散以生

地黃汁調二錢

扁栢散 治男子血旋

汧街草 梔子藥 地竹 扁栢

右等分先將蒜薑水研淺鐘飲之令睡隨後將四件

用水二碗煎至淺碗服

黃芩芍藥湯 出醫方大成 治虛家不能飲食衄血吐血 一方

治鼻

衄

黃芩

白芍藥

甘草

各等分

右㕮咀以水二盞煎一盞服一方加生薑黃耆

鬱金散

出聖惠方

治吐血衄血不止

鬱金

木香

飛羅麝

黃蘗

劉各一兩

甘草

一兩半炙

微赤

劉

右為散以生地黃汁一大盞旋拌藥後焙令乾又拌之地黃汁盡為度再搗細為散不計時候煎青竹茹

湯調下二錢

藕汁散

出聖惠方

治吐血衄血不止

生藕汁

生地黃汁

大薊汁

各三合

生蜜

半匙

右和令勻每服一小盞細細令呷之不據時候一方

有牛蒡根無大薊根

蒲黃飲 治吐血鼻衄不止

糯米

炒

蒲黃

青黛

白麴

各一兩

右為末水調五錢服

麥門冬飲子

出聖惠方

治吐血衄血至一斗不止者宜服

生麥門冬汁

五合

生刺薊汁

五合

生地黃汁

五合

右相和於銀鍋中略煖過每服一小盞調伏龍肝末

一錢服

茅蘇湯

出直指方

治吐血衄血

茅花

三錢

紫蘇莖葉

二錢

右判為呔咀以新汲水一碗煎至七分去滓乘熱調

生蒲黃二錢漸漸服仍以蒜兩顆煨熟搗扁貼敷兩

脚中心少頃自覺胸中有蒜氣其血立止若下部出

血可以煨蒜敷手心尤佳

白芍藥散

出肘後方

治咯血衄血

白芍藥

一兩

犀角末

一分

右為末新汲水服一錢以血止為度

鷄子白丸

出聖惠方

治吐血衄血

鷄子白

三個

好香墨

二兩

右搗蜜為末以鷄子白和丸如梧桐子大不計時候

以生地黃汁下十丸

蛤粉散

出百一選方

治吐血兼治衄血

右用蛤粉白膠香等分以好松烟墨汁調服

胡黃連散

治吐血衄血

生地黃

胡黃連

各等分

右為末用猪膽汁為丸如梧桐子大每服五十丸臨

卧煎茅花湯送下

茅花湯

出百一選方

治吐血衄血

金匱要略卷一百八十九
用茅花不計多少煎湯服

治吐血衄血不止

用乾石榴皮末吹鼻立止

蘿蔔飲

一名萊菔飲
出楊氏家藏

治諸血熱吐血衄血

用生蘿蔔取汁半盞入白鹽少許服之立效如無生

蘿蔔只用蘿蔔子一分微炒紫蘇葉莖半分剉散用

煎亦效一方用蘿蔔汁入鼻中

治吐血鼻紅

用生薑一分搗絞汁並壯健丈夫便一升乘熱頓飲

治吐血鼻衄

用茅香花煎湯服之

又方

用陳紅米泔水一鍾溫服

三豆湯

出朱氏
集驗方

治飲酒太過衄血吐血起則無事睡

則甚服諸藥不效服此而愈

烏豆 赤小豆 萊豆

金匱要略卷之四
療衄血一月者肘後方去暴驚所為

出聖惠方

以刺羊血熱飲之即差一方新羊血慎勿刺羊取血
神道不祐當無差也

鼻衄

附論

夫脾移熱於肝則為驚衄脾土也肝木也木本尅土今
脾熱為土氣翻盛逆往乘木是木之虛不能制土故受
脾之移熱也肝之神為魂而藏血虛熱則魂神不定故
驚也凡血與氣內榮臟腑外循經絡相通而行於身周

證者無不取效量虛實與之

治吐血衄血

出危方

用山梔子燒灰穀醋調服一方用梔子甘草每服三

錢煎五分溫服

黃芩散

出聖惠方

治吐血衄血或發或止皆心臟積熱所

致宜服

用黃芩一兩去心中黑腐為散每服三錢以水一中

盞煎至六分不計時和滓溫服

療衄血一月者肘後方去暴驚所為

出聖惠方

以刺羊血熱飲之即差一方新羊血慎勿刺羊取血
神道不祐當無差也

鼻衄

附論

夫脾移熱於肝則為驚衄脾土也肝木也木本尅土今
脾熱為土氣翻盛逆往乘木是木之虛不能制土故受
脾之移熱也肝之神為魂而藏血虛熱則魂神不定故
驚也凡血與氣內榮臟腑外循經絡相通而行於身周