

欽定四庫全書

子部
仁齋直指卷五



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

仁齋直指

五

楊士瀛 撰

諸氣

梅核氣

朱宗正 附遺

以氣

息不運則機

第一毫不續則穹壤判

之所以

降者氣也

之所以流行者亦氣也

常衛之所以運轉者氣也五臟六腑之所以相養相生

仁齋直指

仁齋直指

者亦此氣也盛則盈衰則虛順則平逆則病氣也者獨
非人身之根本乎人有七情病生七氣七氣者寒熱怒
恚喜憂愁或以為喜怒憂思悲驚恐皆通也然則均調
是氣將何先焉曰氣結則生痰痰盛則氣愈結故調氣
必先豁痰如七氣湯以半夏主治而官桂佐之蓋良法
也況夫冷則生氣調氣雖用豁痰亦不可無溫中之劑
其間用桂又所以溫其中也不然七氣相干痰涎凝結
如絮如膜甚如梅核窒礙於咽喉之間咯不出嚥不下

或中滿艱食或上氣喘急曰氣隔曰氣滯曰氣秘曰氣
中以至五積六聚亦癰癥瘕心腹塊痛發即欲絕殆無
往而不至矣○冷氣者生冷傷脾風冷入胃或血海虛
冷冷則生氣用和劑七氣湯治中湯沈香降氣湯大沈
香圓○痰結者三因七氣湯指迷七氣湯易簡二陳湯
○中滿者痞滿不食水氣腫脹面目俱浮枳殼散加南
木香大流氣飲指迷七氣湯順氣木香散三和散五皮
散加半夏茯苓○上氣者氣逆而上呼吸喘促分氣紫

蘇湯蘇子降氣湯或嚼蘇合香圓以秘傳降氣湯送下
○氣隔者陰陽不和中脘窒塞五隔吐噫食不能下五
隔寬中散和劑七氣湯加木香縮砂間以紅圓子佐之
○氣滯者滯於胃膈則脹滿滯于手足則浮腫滯于腰
間則墜痛脹滿用異香散調氣散沈香降氣湯仍與神
保圓或少蓬煎圓利之浮腫用三和散夾生料五苓散
或五皮散加桂吞青木香圓局方流氣飲加赤茯苓枳
殼腰痛俞山人降氣湯局方七氣湯加橘核或辣桂煎

湯點調氣散吞青娥丸○氣秘者停宿不消腸胃留滯
大便不通蘇合香圓夾和感應圓或楊氏麝香圓局方
麻仁圓並用枳殼散送下○氣疾之人多因氣不歸元
遂成氣中狀如中風仆倒昏迷牙關緊急只是無痰此
為氣中不得誤用風藥及通關利腠等輩先以薑汁泡
湯調蘇合香圓次用七氣湯大流氣飲加石菖蒲繼之
氣順而蘇即以治中湯加木香以和其中使氣歸常道
若更不能調則氣逆而厥又有變證○五積者五臟之

所積其病難醫六聚者六腑之所聚其病易治挾水為
癖挾血為癥氣血水飲皆能結塊輕者神保圓以麝香
湯送下或少與蓬煎圓撞氣阿魏圓三稜煎圓重者如
意圓頂珠圓酌量用○又一證漉漉作聲腹中纏滯他
無所苦此為水飲消飲圓倍朮圓方並見水飲類二薑圓夾和
用之○人有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常一種
婦人平時任氣易為七情所傷適月事經季不行一身
百病胷臆氣填嘔惡全不入食入食則吐痰涎或一塊

如核室塞胃喉而痛或一塊如卵築觸心下而疼或腹中塊物動而作痛攻刺腰背時發熱四肢乏力脚不能行小便白濁浮油帶下淋瀝日就瘦弱全似虛勞然而穀雖不入果子雜物常喜食之却只是有孕諺所謂孕婦做得百般病者此也用藥但以二陳湯加縮砂桔梗薑棗烏梅同煎半夏理氣消痰縮砂安胎順氣北梗以開胃喉之隔服之自然安平若妄以剛劑溫胃胎氣必煩病無由愈白濁一節謹勿燥澀二陳湯加白茯苓

以下白圓子

方並見痰涎類

可也若夫七情所發逆氣填胸不

惟核膜上塞咽喉甚者攻擊滿悶欲絕產後尤多有之

故曰產前安胎產後調氣

男女或有胸喉間梅核作恙者觸事勿怒飲食勿冷

諸氣證治

和劑七氣湯治七氣所傷痰涎結聚心腹刺痛不能飲

食

半夏

製焙五兩

人參

辣桂

去麝皮各一兩

甘草

炙半兩

右劉散每服三錢水大盞薑五片棗一枚煎至七分

食前服

和劑治中湯

方見脾胃門

沈香降氣湯治陰陽交滯心腹脹滿留飲停酸積冷諸

證

沈香

一兩二錢

縮砂仁

三兩

甘草

煨二兩半

香附

炒淨一升

右末每一錢鹽一點沸湯點下

大沈香圓治一切冷氣攻心腹刺痛胃膈噎塞婦人血

氣刺痛並宜服之

方見心氣類

三因七氣湯證治如前有熱者可用此

半夏

五兩

茯苓

四兩

厚樸

製三兩

紫蘇葉

二兩

右剉散每服四錢水盞半薑七片棗二枚煎六分不

時服

易簡二陳湯

方見痰涎門

枳殼散

方見脚氣門

治證同前加南木香煎服

和劑流氣飲調榮衛利三焦行痞滯消腫脹

橘紅

青皮

紫蘇葉

厚樸

製

香附

炒淨

甘草

炙各四兩

木通

二兩

大腹皮

丁皮

檳榔

辣桂

木香

草果仁

蓬朮

煨

霍香葉

各一兩半

麥門冬

人參

白朮

木瓜

赤茯苓

石菖蒲

白芷

半夏製

枳殼製各一兩

右劉散每服三錢薑四片棗二枚煎服

餘見水腫門

指迷七氣湯治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻

衝作疼

青皮

陳皮

桔梗

蓬莪朮

辣桂

藿香

益智仁

各一兩

香附

一兩半

甘草

炙三分

加半夏製三分

右剉散每服三錢水一盞薑四片棗一枚煎七分不

時服

順氣木香散治冷證腫脹泄瀉

良薑

乾薑炮

茴香炒

縮砂仁

辣桂

橘紅

厚樸薑汁焙

甘草燂

蒼朮炒

丁皮

桔梗各等分

右末每二錢半薑棗煎食前服

三和散和暢三焦治痞脹浮腫

大腹皮

炒

紫蘇莖葉

沈香

宣木瓜

焙切

羌活

各一兩

白朮

川芎

木香

甘草

炒

陳橘皮

去白

檳榔

濕紙煨各三分

右麤末每二錢煎服加赤茯苓可以和氣利水

五皮散治皮膚水氣

大腹皮炒

桑白皮炒

茯苓皮

生薑皮

陳橘皮等分

右麤末每三錢煎服

分氣紫蘇湯治腹脅疼痛氣促喘急

五味子去梗洗淨

桔梗剉

茯苓

大腹皮

陳橘皮洗淨

草果仁

桑白皮炙剉

甘草炙各三斤

右八味咀咀為麤末秤二十斤淨入揀嫩枝葉乾紫