

醫學實在

米

存仁堂

醫學實在易卷之三

閩長樂陳念祖修園著

男元犀靈石參訂

男

心與薇菴
心蘭芝亭

全校字

裏症

傷寒病陽明經大渴大熱法用白虎湯爲表中之裏症
及其傳裏譫語胸腹滿不大便爲裏中之裏症宜三承
氣湯擇用詳於傷寒門不贅劉河間先生用三一承氣
湯代上三方

傷寒裏症詩

表中之裏是陽明熱渴汗多白虎湯行胃實肺潮膨

譫語裏中之裏枳

實黃平

三承氣湯隨其見症而用之

心痛

心爲君主之官受邪而痛手足寒至節名

胸膈痛

肺氣

胃脘痛

胃氣不和

兩脇痛

肝脾之病

大腹痛

屬小腹痛

肝腎之病

皆人每症當分別九種曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰蟲

曰悸曰注曰去來悸者心虛而動痛也注者邪氣着而

痛也去來者作止不常亦邪氣也但注陰而去來爲陽

耳其實是小家伎倆不必泥也宜以上中下兩旁部位

分之。自心胸至胃脘爲上部。宜宣其陽氣。陽氣虛宜黃

芪氣實宜枳實。氣結宜貝母。瓜蒌皮。氣逆宜半夏。薤白。

氣滯宜檀香。砂仁之類。自胃脘至臍爲中部。宜調其陰

陽。仲景理中丸以人參。

甘寒多液爲陰分藥

甘草。

味勝於氣亦陰分藥

補陰。

以白朮。乾薑補陽。爲萬古準繩。卽如通脈四逆湯急於

回陽。若有腹痛。必加苦寒之芍藥。以養陰。黃連湯重於

清火。因有腹痛。不離辛熱之薑桂。以開陽。此理甚微。非

熱於內經者。不可與語也。自臍下至陰器爲下部。宜破

其陰氣。金匱名爲寒疝。

今人以單丸腫大爲疝。金匱則以腹中痛劇爲寒疝。

所主

皆附子烏頭蜀椒大熱之性扶陽以破陰若前痛徹後
後痛徹前陰陽無分界限宜加赤石脂一二兩以堵截
之而生薑當歸羊肉湯藉羊肉之濁氣引入陰分以破
陰尤其神妙也協助一帝爲側部宜利其樞轉肝膽之
氣其行在側小柴胡湯爲少陽之正藥當歸四逆湯爲
厥陰之正藥或再加鮮橘葉四十九片則得矣以上諸
症脈細而遲寒也以薑桂附子吳茱萸之類爲主脈大
而數熱也以金鈴子黃連沙參芍藥之類爲主痛而利
者虛也以附子理中湯之類爲主痛而閉者實也以小

承氣湯之類爲主。亦有寒實而痛者。宜大黃附子湯。以溫通之。若吐蟲。則用附子理中湯。去甘草加當歸川椒黃連烏梅。若食積則先以平胃散。加麥芽山查以消導之。否則以承氣湯下之。若因怒氣而痛。則以七氣湯加貝母撫芎香附以解之。人人共知不必贅也。又仁齋直指治脾痛。攻刺百藥罔效。用和劑抽刀散如神。此方醫家秘不輕傳。嘉慶十八年。長州徐炳南梓尤氏金匱翼載之。心腹爲陰。故列於裏症。

經義舉痛論曰。經脈流行不止。環周不休。寒氣入經而稽

遲泣而不行。客於脈外則血少。客於脈中則氣不通。故卒然而痛。厥病篇曰。真心痛手足青至節。心痛甚。旦發夕死。夕發旦死。按經文極繁。此不過摘其要語。

心腹諸痛詩

痛分四面定醫方。下主於陰上屬陽。介在陰陽中部位。樞行在側轉斯康。

痰飲症乃水氣上泛。得陽煎熬。則稠而爲痰。得陰凝聚。則稀而爲飲。此症以脾腎爲主。以水歸於腎而受制於脾也。痰宜二陳湯。隨寒熱虛實加減。怪病老痰宜滾痰。

光飲宜桂苓甘朮湯真武湯二症愈後以桂附八味丸收功

經義

六元正紀大論曰少陰司天四之氣民病飲發又曰太陰所至爲積飲痞隔又曰土鬱之發爲飲發注下至真要大論曰諸病水液澄澈清冷皆屬於寒按內經言飲而不言痰有之自仲景始

痰飲詩

痰病却緣水泛成。滾痰丸峻烈二陳湯。
湯同真武。一化太陽水府之氣。五飲源流一派清。
鎮少陰水藏之氣。和平桂苓甘朮。

附錄

痰飲之病源皆水也。經云三焦者決瀆之官水道出焉。設三焦失職因之聚成痰飲變證多端。古人論痰有四。痰飲懸飲溢飲支飲詳於金匱要畧。余箸有淺註宜細辨之。然又有聚而不散者名留飲。僻處脇下者名癖飲。流移不定者名流飲。沉伏於內者名伏飲。又因酒而成癖者名酒癖。因寒所傷者名治痰。因熱所傷者名熱痰。總由於三焦失職氣道否澁所致。是以氣行卽水行氣滯卽水滯。唯能宣通三焦之氣則爲治其本而清其源。

矣。金匱曰：當以溫藥和之。此六字爲金針之度也。所以然者，人之氣血得溫則宣流，及結而成病，尤在涇新立七法授時醫之捷徑。余閱江蘇顧西疇徐炳南之治案，多本於此。今姑錄之，以見奇相賞疑與析神交在三千里外云。

一曰攻。

古云：治痰先補脾，脾復健之常而痰自化。然停積既甚，譬如溝渠壅滯，久則倒流逆上，污濁臭穢無所不有。若不決而去之，而欲澄治已壅之水，而使之清，無是理也。

故須攻逐之劑。

神仙墜痰丸

控涎丹

礞石滾痰丸

十棗湯

二曰消導

凡病痰飲未盛。或雖盛而未至堅頑者。不可攻之。但宜消導而已。消者損而盡之。導者引而去之也。

青礞石丸

竹瀝丸

半夏丸

三曰和

始因虛而生痰。繼因痰而成實。補之則痰益固。攻之則正不支。惟寓攻於補。庶正復而痰不滋。或寓補於攻。斯

痰去而正無損。是在辨其虛實多寡而施之。

六君子湯。

按此湯宜八補方此條宜香砂六君子

四曰補。

夫痰卽水也。其本在腎。痰卽液也。其本在脾。在腎者氣虛水泛。在脾者土虛不化。攻之則彌盛。補之則潛消。非明者不能知也。

濟生腎氣丸。

桂苓甘朮湯。

六君子湯。

余新增

五曰溫。

凡痰飲停凝。心隔上下。或痞或嘔。或利久而不去。或雖

去而復生者。法當溫之。蓋痰太於脾。溫則能健之。痰生於濕。溫則能行之。

沉香茯苓丸。本事神朮丸。

六曰清。

或因熱而生痰。或因痰而生熱。交結不解。相助爲虐。昔人故言痰因火而逆上者。治火爲先也。其證咽喉乾燥。或塞或壅。頭目昏重。或欬吐稠粘。面目赤熱。

二陳湯加黃芩。連翹。山梔。桔梗。薄荷。

七曰潤。

肺虛陰潤枯燥曰至氣不化而成火津以結而成痰是
不可以辛散不可以燥奪清之則氣自化潤之則痰自
消。

王節齋化痰丸

痢疾伏邪之爲病也。夏月受非時之小寒。或貪涼而多
食瓜果。胃性喜寒。初不覺其病。久則鬱而爲熱。從小腸
以傳大腸。大腸喜熱。又不覺其爲病。至於秋後。或因燥
氣。或感涼氣。或因飲食失節。引動伏邪。以致暴瀉。旋而
裏急後重。膿血赤白。小腹疼痛。甚則爲噤口不食之危。

症當知寒氣在胃。熱氣在腸。寒熱久伏而忽發之。病用芍藥湯。蕩滌大腸之伏熱。令邪氣一行。正氣自能上顧脾胃。如若未效。卽用理中湯。以溫胃中之伏寒。加大黃以泄大腸之伏熱。一方而兩扼其要。紅者可加地榆。白者可加水香。紅白兼見者並加之。倘久而不瘥。可用理中湯原方以補之。或用真人養臟湯以濟之。或間用香連丸以堅之。此定法亦活法也。如初起而發熱不休。方書皆云死證。其實非經絡不和。卽外感風寒所致。唯審其發熱而仍惡寒者。用當歸四逆湯。發熱胸脇滿而嘔。

吐者用小柴胡湯。和其經絡而下利自鬆。倉廩湯更面
面周到。足補古人所未及。痢爲腸胃之病。故列於裏症。
經義太陰陽明論曰。飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受

之則入五臟。入五臟則填滿閉塞。下爲飧泄。久爲腸
澼。論疾診尺篇曰。春傷於風。夏生飧泄。腸澼。陰陽別
論曰。陰陽虛腸澼。死氣厥論曰。腎移熱於脾。傳爲虛
腸澼死。按內經所謂腸澼。卽今之下痢。方書又名滯
下是也。本經准評虛實論謂腸澼便血身熱則死。寒
則生。大奇論謂腎脈小搏沉爲腸澼下血。血湯身熱

者死又云心肝澀其脈小沉瀼為腸澀其身熱者死
熱見七日者死論疾診尺篇又謂殮泄脈小手足寒
者難已脈小手足溫者易已數句互異而不知熱與溫
有別熱者壯熱溫者溫和也且痢與瀉二證同而不同

痢疾詩

痢分寒熱各相爭張氏暑心在近時人伏邪論最精

腸熱腸喜熱日受熱胃寒胃喜寒日受寒標標熱本寒

異暑過炎暑已退秋新秋初至為病根序時更理中湯量

克貪涼病加味前湯黃合帶火清初患倘輕依語此