

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

大正四年

正體類聚
胃
正體類聚
胃
正體類聚
胃
正體類聚
胃

明 薛已 撰

疾者肝火侮肺也用

腹脹痛大便不通喘

滯散通之內經云肝

欽定四庫全書

薛氏醫案

藏血脾統血蓋肝屬木生火侮土肝火既熾肝血必傷
脾氣必虛宜先清肝養血則瘀血不致凝滯肌肉不致
遍潰次壯脾健胃則瘀肉易潰新肉易生若行剋伐則
虛者益虛滯者益滯禍不旋踵矣

一肚腹作痛或大便不通按之痛甚瘀血在內也用加
味承氣湯下之既下而痛不止按之仍痛瘀血未盡也
用加味四物湯補而行之若腹痛按之不痛血氣傷也
用四物湯加參芪白朮補而和之若下而胸脇反痛肝

血傷也用四君芎歸補之既下而發熱陰血傷也用四
物參朮補之既下而惡寒陽氣傷也用十全大補湯補
之既下而惡寒發熱氣血俱傷也用八珍湯補之既下
而泄瀉脾腎傷也用六君肉果破故紙補之若下後手
足俱冷昏憤出汗陽氣虛寒也急用參附湯吐瀉手足
俱冷指甲青者脾腎虛寒之甚也急用大劑參附湯口
噤手撒遺尿痰盛唇青體冷者虛極之壞症也急投大
劑參附湯多有得生者

一肌肉間作痛營衛之氣滯也用復元通氣散筋骨作痛肝腎之氣傷也用六味地黄丸內傷下血作痛脾胃之氣虛也用補中益氣湯外傷出血作痛脾肺之氣虛也用八珍湯大凡下血不止脾胃之氣脫也吐瀉不食脾胃之氣敗也苟預為調補脾胃則無此患矣

一作痛若痛至四五日不減或至一二日方痛欲作膿也用托裏散若以指按下復起膿已成也刺去其膿痛自止若頭痛時作時止氣血虛也痛而兼眩屬痰也當

生肝血補脾氣

一青腫不消用補中益氣湯以補氣腫黯不消用加味
逍遙散以散血若歛腫脹痛瘀血作膿也以八珍湯加
白芷托之若膿潰而反痛氣血虛也以十全大補湯補
之若骨髁接而復脫肝腎虛也用地黃丸腫不消青不
退氣血虛也內用八珍湯外用葱熨法則瘀血自散腫
痛自消若行血破血則脾胃愈虛運氣愈滯若敷貼涼
藥則瘀血益凝內腐益深致難收拾

一發熱若出血過多或潰膿之後脈洪大而虛重按全無此陰虛發熱也用當歸補血湯脈沉微按之軟弱此陰盛發躁也用四君薑附若發熱煩躁肉潤筋惕亡血也用聖愈湯如汗不止血脫也用獨參湯其血脫脈實汗後脈躁者難治細小者易治外臺秘要云陰盛發躁欲坐井中用附子四逆湯加蔥白王太僕先生云凡熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動者名曰無火此無根之虛火也

一作嘔若因痛甚或因尅伐而傷胃者用四君當歸半
夏生薑或因忿怒而肝傷者用小柴胡湯加山梔茯苓
若因痰火盛用二陳薑炒黃連山梔若因胃氣虛用補
中益氣湯生薑半夏若出血過多或因潰後用六君子
湯加當歸

一喘咳若出血過多面黑胸脹或胸膈痛而發喘者乃
氣虛血乘於肺也急用二味參蘇飲若咳血衄血者乃
氣逆血蘊於肺也急用十味參蘇飲加山梔苓連蘇木

一作渴若因出血過多用四物參朮如不應用人參黃芪以補氣當歸熟地以養血若因潰後用八珍湯若胃熱傷津液用竹葉黃芪湯胃虛津液不足用補中益氣湯胃火熾盛竹葉石膏湯若煩熱作渴小便淋瀝乃腎經虛熱非地黃丸不能救

一出血若患處或諸竅出者肝火熾盛血熱錯經而妄行也用加味逍遙散清熱養血若中氣虛弱血無所附而妄行用加味四君子湯補益中氣或元氣內脫不能

攝血用獨參湯加炮薑以回陽如不應急加附子或血
蘊於內而嘔血用四物加柴胡黃芩凡損傷勞碌怒氣
肚腹脹悶誤服大黃等藥傷陽絡則為吐血衄血便血
尿血傷陰絡則為血積血塊肌肉青黯此臟腑虧損經
隧失職急補脾肺亦有生者但患者不悟此理不用此
法惜哉

一手足傷損若元氣虛弱或不戒房勞或妄行政伐致
死肉上延或腐而不痛黑而不脫者當大補元氣庶可

保生若手足節齟斷去者無妨骨斷筋連不急剪去若
侵及好肉則不治若預為調補脾氣則無此患大凡膿
瘀內焮者即針之而投托裏散或口噤遺尿而似破傷
風者急用十全大補湯加附子多有生者

一腐肉不潰或惡寒而不潰用補中益氣湯發熱而不
潰用八珍湯若因尅伐而不潰者用六君子湯加當歸
其外皮黑堅硬不潰者內火蒸炙也內服八珍湯外塗
當歸膏其死肉不能潰或新肉不能生而致死者皆失

於不預補脾胃也

一新肉不生若患處天白脾氣虛也用六君芎歸患處
緋赤陰血虛也用四物參朮若惡寒發熱氣血虛也用
十全大補湯膿稀白而不生者脾肺氣虛也用補中益
氣湯膿稀赤而不生者心脾血虛也用東垣聖愈湯寒
熱而不生肝火動也用加味逍遙散晡熱而不生肝血
虛也用八珍牡丹皮食少體倦而不生脾胃氣虛也用
六君子湯膿穢而不生者陰虛邪火也用六味地黃丸

四肢困倦精神短少而不生者元氣內傷也用補中益氣湯如夏月用調中益氣湯作瀉用清暑益氣湯秋令作瀉用清燥湯

一傷重昏憤者急灌以獨參湯雖內瘀血切不可下急用花蕊石散內化之恐因瀉而亡陰也若元氣虛甚者尤不可下亦用以前散化之凡瘀血在內大小便不通用大黃朴硝血凝而不下者急用木香肉桂末三二錢以熱酒調灌服血下乃生如怯弱之人用硝黃須加肉

桂木香同煎假其熱以行其寒也

一大便秘結若大腸血虛火熾者用四物湯送潤腸丸
或以豬膽汁導之若腎虛火燥者用六味地黄丸腸胃
氣虛用補中益氣湯

一傷損症用黑羊皮者蓋羊性熱能補氣也若杖瘡傷
甚內肉已壞欲其潰者貼之成膿固速苟內非補劑壯
其根本毒氣不無內侵外非砭刺泄其瘀穢良肉不無
傷壞若受刑輕外皮破傷者但宜當歸膏敷貼更服四

物芩連柴胡山梔白朮茯苓又丁痂不結傷肉不潰死血自散腫痛自消若槩行菴貼則醞釀瘀毒矣

一跳躍捶胃閃挫舉重勞役恚怒而胃腹痛悶喜手摸者肝火傷脾也用四君柴胡山梔畏手摸者肝經血滯也用四物柴胡山梔桃仁紅花若胸脇作痛發熱晡熱肝經血傷也用加味道遙散若胸脇作痛飲食少思肝脾氣傷也用四君芎歸柴梔丹皮若胸腹脹滿飲食少思肝脾氣滯也用六君加柴胡芎歸若胸腹不利食少

無寐脾氣鬱結也用加味歸脾湯若痰氣不利脾肺氣滯也用二陳白朮芎歸梔子青皮若咬牙發搐肝旺脾虛也用小柴胡湯川芎山梔天麻鈎藤鈎或用風藥則肝血益傷肝火益甚或飲糖酒則腎水益虛肝火愈熾若用大黃等藥內傷陰絡反致下血少壯者必為痼疾老弱者多致不起

一破傷風河間云風症善行數變入臟甚速死生在反掌之間宜急分表裏虛實而治之邪在表者則筋脈拘