

欽定四庫全書

子部

傷寒直格方卷下



南京中医药大学图书馆版权所有

作
寒
直
林
卷

者登樂石

雙仁者下能同法
 精溫
 浸去皮尖
 蘇黃
 云
 生
 湯
 為
 料
 占

劉守真撰

兩劑去皺甘草半兩
官桂是也炙

是也謂一水一盞半
約重五錢

煎至八分濾去滓溫服

滓阻史切
澀也糝也

衣覆以取微汗

或溫病身煩痛小便自利者加白朮四分微汗之一

分二錢
半也

益元散

一名天水散
一名太白散

滑石

六兩白
膩好者

甘草

一兩

右為細末每服三錢蜜多許溫水調下或無蜜亦可

每時日三服或欲冷飲者新井泉調下亦得解利發

汗煎葱白豆豉湯下每服水一盞葱白五寸豆豉五

十粒煮取汁七分調併三四服以効為度此藥是寒涼解散熱鬱設病甚不解多服無害但有益耳本世傳名太白散俗惡性寒蔥易得之賤物而又不明素問造化之理故不取本草神驗之言而多不用焉若以隨證驗之乃凡人之仙藥也何可缺歟 夫傷寒當汗則不可下當下則不可汗且如誤服此藥則汗自不出而裏熱亦獲不効亦有裏熱便得宣通而愈者也或半在表半在裏可和解而不可吐下發汗者

若服此藥多愈或不愈亦小減加涼膈散和解尤佳
或自當汗解者更加蒼朮粗末三錢同葱豉煎湯
調服尤良或孕婦不宜滑石麻黃桂枝葶發汗即用
甘草一兩蒼朮二兩同為粗末每服四錢水一盞葱
白五寸豉五十粒同煎至六分濾去滓熱服併二三
服取微汗是名逼毒散非孕婦亦可服或太白散加
麻黃二兩去節如法煎服世云神白散 或逼毒散
加麻黃與蒼朮等分去節濟衆云青龍散 或青龍

散更加滑石末與蒼朮二倍是為發汗之妙藥名曰
大逼毒散此方唯正可汗者即用誤服之則轉加熱
也或解利兩感煎涼膈調下益元散四錢 或下乳
用猪肉麵羹粥飲湯之類調下四錢不拘時候日三
服及宜食肉麵羹粥 催產溫香油漿調下五錢併
二三服以產為度 或死肝不下者煎三乙承氣湯
一服調下益元散五錢須臾更頻用油漿調益元散
溫服前後俱下而胎下可活產母也凡難產或死胎

不下皆由風熱燥澁緊斂結滯而不能舒緩故產戶
不得自然開通也此藥力至則結滯頓開而產矣後
慎不可溫補而反生燥熱也俗未知產後亡液損血
痛疼怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而
為諸熱證由不讀素問不知造化故不識證候陰陽
反以為凡產諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱
藥溫補或見煩渴者不令飲水本雖善心為害多矣
豈治病之道但以臨時審其臟腑六氣虛實明其標

本如法治之而已矣此藥泛常多用然須為效至大
而俗以病異藥同將謂妄行反招侮慢今以黃丹加
令桃紅色名曰紅玉散 加青黛令輕碧色名碧玉
散 加薄荷葉一分名雞蘇散主療不殊收效則一
俗目懵然何能別此可遠妄誕可顯玄功後之學者
其究心焉

桂枝湯

桂枝

去

芍藥

甘草

炙等分三
分為率

右剉如麻黃大每服八錢水一盞半姜三片棗三枚
擘破煎至七分令去滓溫服續後啜熱稀粥溫覆令
遍身微汗或暖也及初夏可加黃芩一兩名陽旦湯
大熱之分及素有熱人可再加知母半兩石膏一兩
為末或更加升麻一分禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪
息物等桂枝證反下之不成結胸及痞但腰滿証在
者本方倍加芍藥大實痛者更加大黃半兩脈弱自
利者不加

桂枝加葛枝湯

桂枝

芍藥

甘草

各六錢三分

葛枝

一兩三錢

右如桂枝湯服

謂如桂枝湯剉煎服也下並飲此

葛枝湯

葛根

一兩

麻黃

泡去黃

汁焙乾秤三分

桂枝

去皺

芍藥

甘草

炙各半兩

右如桂枝湯服

大青龍湯

麻黃

泡去黃汁焙乾

石膏

為末各三分

桂枝

一分半

甘草

炙一分

杏仁

十枚湯去
皮尖雙仁

右剉如麻豆大抄五錢水一盞生姜三片棗三枚擘
破煎至半盞濾去滓溫服令身汗濕未潤再服

小青龍湯

麻黃如前製

半夏湯洗芍藥

細辛

乾姜

甘草

炙三分

桂枝

去皴各三分

五味子

二錢

右剉麻豆大每服八錢水一盞半生姜四片煎至七

分絞汁溫服

渴者去半夏加栝蒌根三錢

微利

去麻黃加芫花彈子大 噎者去麻黃加附子二錢

炮以開沸熱結滯 小便不利少腹滿者去麻黃加

茯苓四錢 喘者去麻黃加杏仁製如前法此方治燥溫

散其水以潤腸胃臟腑之燥以開發沸熱結滯者也

小柴胡湯

柴胡

去苗秤二兩

黃芩

甘草

人參

以上各三分

半夏

六錢炮五

七次

右剉如麻豆大抄五錢生姜三片棗三枚切煎至半

盞濾去滓溫服日三小兒一服作三服諸藥法同

涼膈散

一名連翹飲子

連翹

一兩

山梔子

大黃

薄荷葉

淨去毛

黃芩

以上各半兩

甘草

一兩半

朴硝

一分

右為粗末每服二三錢水一盞蜜少許

或無蜜亦可舊用竹葉或

亦不須煎至七分濾去滓溫服熱甚者可服四錢亦有

可服一二十錢者治咽喉并涎嗽加桔梗一兩荆

芥穗半兩咳而嘔者本方加半夏半兩每劑生姜三

片煎服 衄嘔血者加當歸芍藥各半兩生地黃一兩淋者加滑石四兩茯苓一兩風眩者加川芎防風各半兩石膏三兩酒毒者加葛根一兩斑疹痘瘡加荊芥穗赤芍藥川芎防風桔梗各半兩三歲兒可服七八錢或熱甚黑陷腹滿喘急小便赤澁而將死者此一服更加大承氣湯約以下之得利立甦

凡言加者皆自本方加也但加者每服五七錢以意加減調理 兩感傷寒下證前後以退表裏之熱者

煎本方四五錢調下益元散三四錢其本方皆能治
此諸證但加即為效也

白虎湯

知母

半一兩

甘草

炙一兩

粳米

合一

石膏

四兩為末

右剉麻豆大抄五錢水一盞煎至六分去滓溫服無
時日三四服熱甚者服七八錢至十餘錢或眩或嘔
或咳者加半夏半兩陳皮半兩每服用生姜三片煎
服 或傷寒發汗不解脈闕者加蒼朮半兩名曰蒼

朮白虎湯 或發汗或下後煩渴口乾或脈洪大或
微惡寒者或不可下者或除可用之藥外並宜加人
參半兩以調之名人參白虎湯

五苓散

猪苓

去黑皮

茯苓

白朮

各半兩

桂

去皺一分

澤瀉

一兩

右為細末每服二三錢熱湯調下惡熱欲冷飲者新
水調下或生姜湯調下愈妙或加滑石二兩甚或喘
嗽咳煩心不得眠者更加阿膠半兩泡

桂苓甘露飲

一名桂苓白朮散

桂半兩 茯苓

白朮各半兩

甘草炙

澤瀉

石膏

寒水

石各一兩 滑石

二兩 製如前

右為極細末熟湯調下三錢欲冷飲者新水調下或生薑湯調下尤良小兒服一錢

白朮散

白朮

茯苓去皮 人參

藿香葉

淨俱各半兩

甘草

炙一兩

木

香末一分

葛根

一兩