

全氏痘疹秘錄

辰集

邦字抄

辰集

邦字五折

全氏家藏痘疹秘錄

全氏家藏痘疹秘錄卷五辰集目錄 起脹門

起脹總論

起脹症治

家傳方治

不起脹有因

起發不透

紫陷黑陷

白陷灰陷

乾枯

青黯

頂凸

粘連

發泡

煩燥

瘡白如錫

把縛

頭面

封蛤

手足痘瘡

痛痒

痘疔

作渴

吐瀉嘔

泄瀉小便不利

大便秘結

起脹吉凶

內托護心湯

十宣內托散

內托解毒湯

加味十宣散

加味活血湯

加味大補湯

起痘解毒湯

大無比散

桂枝葛根湯

全氏起痘解毒湯

大無比散

全氏家傳益氣和胃丸

全氏解毒涼血湯

保元八珍湯

桂枝葛根湯

奪命丹

人參白朮散

一名七味白朮散

導赤散

牛黃清心丸

安神丸

當歸丸

膽導法

三承氣湯

紫草飲

胡荽酒

連壳湯

通關散

錢氏百祥丸

牛李膏

宣風散

水楊柳湯

調元湯

理中湯

陳氏十一味不香散

十二味異攻散

茵陳薑法

當歸活血湯

化毒湯

無價散
一名四聖散
一名萬全丹

升麻湯

解毒湯

參歸鹿茸湯

大紫草飲

四物湯合保元湯

內托散

麥味地黃湯

六一湯

四物湯

全氏解毒涼血湯

大解毒湯

快癰湯

消毒飲

保元湯

加味清肺飲

益氣清肺飲

地黃涼血湯

敗草散

四苓散

導赤散

清心丸

退火回生丹

當歸丸

通幽散

防風通聖散

龍腦安神丸

助脾快癰湯

萬氏加味保元湯

全氏加味保元湯

全氏利咽解毒湯

家傳封眼散

補脾快癰湯

九味順氣散

活血湯

十全大補湯

蟬退膏

四聖散

全氏解疔湯

牛黃八寶丹

賽金化毒散

生津地黃湯

竹葉石膏湯

全氏健脾湯

全氏陳皮止嘔湯

四苓新加湯

胃苓和中湯

附子理中湯

豆蔻丸

全氏參連飲

家傳淨君丹

補中益氣湯

導赤散

通幽散

胆導法

蜜導法

牛黃奪命丹

初如放點其粒如菽遞至五六朝前後表裏無邪滯痘瘡不扁陷縱勢而出根透膿綻由秀而實是為起脹其毒盡行於肌表矣以毒達於外故得以起脹也

萬氏曰痘疹瘡之症發熱三日後方起發此其常也若先出者先起後出者後起毒輕稟厚者起發自易毒重稟薄者起發恒難則又未可以日期為定論也

乘六日起脹之時最為緊要關頭形色更宜精察古人云有膿

則生無膿則死於此時也而痘顆不起何以為成膿之地乎失時不治則痘終不起而膿終不灌矣醫痘之家豈可忽諸

起脹症治

摘錦曰凡痘之起脹多在五六日間痘出有次序起發亦有次序謂之適中如過五六日不起是內氣虛弱矣毒留於中正氣不能推送法當解表托裏以防倒陷黑乾之變宜用內托護心散主之如痘形扁痛顏色枯黑氣血虛乏不能光壯用十宣內托散主之如痘稠密起發不透恐生變症當服內托解毒湯有一齊湧出使皮肉虛腫一齊掀發者此表氣虛毒氣潰出表虛不能收斂必生痒痛急用加味十宣散加味活血湯兩煎而服

若痘已出齊當起不起或起不透此裏氣虛弱毒留氣留伏壅
遏必增燥^煩暖滿喘促宜用加味大補湯治之起脹吉不起脹凶
此定論也

乘六曰按前人所論多用溫補少用清涼不起知起脹之時止
解毒之時也此時不解其毒恐後變態多端補瀉兩難若十分
虛寒者猶可用補虛而有熱者便不可用也大抵虛實之分全
在痘之色重色淡身之熾熱溫熱驗之耳

按痘之形氣為之也痘之色血為之也氣充則痘頂尖圓血
活則痘色紅活痘瘡清補當以形色變之

邦字識

內托護心湯 人參 當歸 川芎 牛子 酒苓 酒黃連

連壳 木通 荊芥 防風 蟬退 加桂枝便秘加紫草

去人參

水煎服

乘六曰毒氣內蓄未能外達用荊連通壳以解毒荊防蟬退以達表毒火一清則正氣自復古方內用人參當歸殊屬不確

十宣內托散

黃芪

人參

當歸

川芎

牛子

荊芥穗

連壳

防風 赤芍

甘草

水煎服作渴加花粉知母小便

澁加枝子仁木通車前子

乘六曰按痘形扁而色枯黑乃毒滯氣分^之熱症也宜解毒涼血則痘自起色自活矣右方用人參黃芪當歸川芎者能不助邪

為患耶

內托解毒湯

牛子

防風

歸尾

赤芍

連壳

人中黃

蟬退

升麻

桔梗

葛根

芥穗

紅花

水煎服

加味十宣散

黃芪

人參

當歸

防風

赤芍

肉桂心

連壳

牛子

桔梗

厚朴

白芷

川芎

水煎服

加味活血湯

當歸

川芎

連壳

牛子

升麻

山豆根

紫草

紅花

灯心引

乘六日一齊湧出皮肉虛腫此乃毒火過盛正不勝邪耳宜用

破血涼血解毒之劑右方內人參黃芪桂心川芎之味溫補之

性恐屬未合

加味大補湯

黃芪

人參

當歸

川芎

白芍

緩用白朮

生地酒炒 蒼苓用 山查 青皮不用 水煎服

乘六日痘已出盡當起不起宜就其所因而治之未必裏氣盡虛也大補湯似亦未安余家所傳痘至五六日起脹時用起痘解毒湯照法加減庶免過共不及之患也

起痘解毒湯 芥穗 生地 青皮 丹皮 蟬退 山查肉

連壳 牛子 赤芍 紅花 甘草 水煎服氣虛痘不宜用青皮皮薄痘不宜用蟬退

加減法 如血分過熱色紅或紫頂雖平陷不宜溫補只宜活

血為主也如紫草翻白草或酒炒黃連或鮮生地黃汁若用鮮生地黃

汁者即去生也同煎調服如全然不顯起發者宜加羌活重用山查及

穿山甲按穿山甲性燥用之僅三四分而止若多用恐發水泡也 聲音不清忌用穿山甲若色沒或

白宜加當歸川芎去赤芍皮薄有皺加生黃芪去青皮夾疔
加翻白草地丁桃仁歸尾夾癰加元參吐舌加黃連木通吐
加陳皮藿香瀉加滑石木通去牛子或加乾姜炒黃連痘色雖紅
亦可大便秘加只羌大黃小便溢加車前子口乾唇燥加石
羔煩燥不寧灯心湯調下無比散渴加花粉知母或用紅花
籽煎湯飲之喘嗽加杏仁川貝蘇葉噴嚏加黃芩咽痛加桔
梗元參射干腹痛加只羌大黃不食大便秘臭重用山楂及
神曲麥芽失血加百草霜京墨汁童便血痢加白頭翁黃芩
椿根白皮白痢加陳皮生姜細茶葉四股冷加桂枝
乘六曰痘當起脹之時正宜解毒補藥不可輕用若痘滿頂通

紅火毒猶熾也。宜入涼血解毒之味。如黃芩、黃連、枝子、黃柏、連
老丹皮之屬是也。若至六日，頂已放白，根脚色淡，火邪已解，皮
薄有皺者，而補藥方可徐徐加之。古人云：先用清涼，後用補劑。
者為六七日前後言之也。

大無比散 西滑石^{六兩} 粉甘草^{一兩} 硃砂^十 雄黃^十 共為細面，每
服一小灯心湯調下。

不起脹有因

乘六日痘出全後，當起不起，宜求其所因而治之也。如冬月嚴
寒，為冷氣所侵，以致痘瘡不起者，其兒必畏寒多涕，渾身拘急。
宜用蟬退、荊芥、防風之類，代羌活治之，以散寒邪。外以重衣厚

被蓋之則寒從汗解而痘自起矣。或用桂枝葛根湯。若久被淫雨而為濕氣所侵。以致痘瘡不起者。其痘必光亮而濕。宜用起痘解毒湯。去生地。牛子。加木通。滑石。澤瀉。治之。或時在盛夏而為熱氣所侵。以致痘瘡不起者。其兒必煩燥不安。痘色深紅。宜用大無比散。灯心湯調下。或因飲食過多。脾胃受傷。以致中氣鬱遏。而痘因之不起者。其兒前必能食。忽然不食。宜於起痘藥中多加山楂。煎服。益氣和胃丸。或因毒氣過多。而正氣不能踈達於外。以致痘瘡不起者。痘色必紅紫。滯黯。治宜涼血解毒。正氣自復。用解毒涼血湯治之。或因中氣虛寒。以致痘瘡不起者。其痘必皮薄而軟。血色淡白。宜用保元八珍湯。加減治之。若飲

食冷物過多以致痘瘡不起者其兒四肢不熱眉皺而啼宜於

起痘藥中少加生姜中病即止不可服過服

翁口若痘瘡濕者宜用白芷防風之屬或利小便

桂枝葛根湯

桂枝

葛根

赤芍

升麻

防風

甘草

錦摘錦有麻黃無甘草不用引

準繩有甘草無麻黃生姜三斤波豆豉一斗為引

全氏起痘解毒湯

芥穗

生地

丹皮

青皮

蟬退

防風

連翹

牛蒡子

山查

赤芍

紅花

甘草

大無比散

西滑石

六兩水飛

粉甘草

一兩為面

硃砂

雄黃木

全氏家傳益氣和胃丸

醋青皮

陳皮

神曲炒

麥芽炒

醋三棱 醋莪朮 醋香附 枳櫛兩 廣木香三 共為細面
醋糊為丸 小米大開水送服 每服一二小量 兒大小用之

全氏解毒涼血湯 連壳 紫草 生地 丹皮 紅花

山查 赤芍 荊芥穗 石羔 青皮 甘草 水煎服大

便秘者加大黃

保元八珍湯 人參 黃芪 吳草 當歸 川芎 大熟地

枸杞子 山查肉 生姜三片 炒糯米百數粒為引

起發不透

萬氏曰 痘瘡起發透時 磊落去圓光壯肥澤者上也 根脚橫開
皮起水漲者次也 頂皮不起根脚不開 猶是先出之形 不見生