

濟世良方

濟世良方卷六目錄

小兒門

洗兒方法

調燮

初生服方

斷臍帶法

夢生

生下無穀道

白膜裹舌

手指連皮

足趾向後

初生無皮

周身發皰

小便不通

二便不通腹脹欲絕

初生七日二便有血

外腎縮入

眼閉不開

發驚

吐沫不乳

吐乳

口皰

鵝口

重舌

木舌

兩腮腫硬及一切症

撮口臍風

口噤

口噤撮口擦藥

察臍風症救治法

小紅丸

去風解毒湯

濟世良方
臍風神方

辰砂蠶蠶散

龍膽湯

保生湯

慎用燈火

臍內不乾

肚臍腫出

臍瘡

胎毒

松香散

解毒糕

兒生色黃

兒生色赤

胎驚

驚死

受驚肝風

腹痛曲腰啼哭

盤腸氣痛

氣上衝心

嘔吐泄瀉

變蒸

夜啼辨症

夜啼不止

睡夢狂語啼哭

猝驚啼哭似有隱痛

滿月剃頭

缺乳

斷乳

驗紋按額診脉四言訣

面部形色賦

簡切辨症

集成沆瀣丹

外感初起發熱

疏表法

清裏法

解煩法

開閉法

納氣法

傷寒發熱

百辟嗽

喉嘶聲啞

集成止瀉散

久痢

中暑吐瀉昏倒

偏身浮腫

沙癆

乳癰

遲語

引痰法

通脉法

擦疹法

哮喘痰壅

胎瘡

遺尿不禁

脫肛

中惡

偏身奇癢

乖瘡

失音不語

時流口水

煖痰法

定痛法

咳嗽痰喘

清金丹

嘔吐

痢疾

霍亂吐瀉腹痛

蝦蟆瘟

赤遊風

幕瘡

病後聲啞

口角流涎浸濕紅赤

三歲不能行走

頭項軟

瘡癩頭瘡

黃水頭瘡

眼目簡便方

口唇腫黑

月蝕瘡

鎖喉

週身脫皮

卵腫

食滯飽悶

健脾糕

解顱

頭上軟癬

綠雲膏

痢癰白禿頭癩頭瘡

燕窩瘡

口瘡糜爛

耳爛

頸項結核

兩腿生瘡脫皮

胎疔

傷食腹脹皮黃肌瘦

愛喫泥炭

凶門腫陷

頭瘡

頭頂生白色腫塊

目赤腫爛

繭脣風

兩腮腫硬

羊鬚瘡

龜胸龜背

身如蛇皮鱗甲

傷冷食及難化物

麪米食積

愛喫生米茶葉

腹內蟲痛

魅病

乳疳

痞塊

肝臟受疳

脾臟受疳

統治五疳

纏蛇丹

解毒湯

集成金粟丹

慢驚症治

痘症門

熱瘡

疳積

口疳

瘰癧

肺臟受疳

腎臟受疳

熱疳

遍體生丹

太極丸

瀉青丸

逐寒蕩驚湯

疳瘡

丁奚疳

疳瀉

無辜疳

心臟受疳

腎疳鼻疳頭瘡耳瘡

火毒

胡麻丸

消風丸

三仙丹

加味理中地黃湯

預解痘毒法

辨痘法

看耳法

認痘法

治痘法

痘有四宜

發熱

形色

起脹

養漿

收結

痘毒

麻疹

藥方 補中益氣湯 大補元煎 六味回陽飲 荊防地黃湯 白虎地黃湯

婦女痘疹治法

經期出痘

發熱行經

起發灌漿時經至

經行未斷出痘

崩漏不止

經閉血乾出痘

痘已灌漿經至

痘出月經違期忽至

藥方 涼血地黃湯 解毒湯 桃花散

芫荽酒 當歸養心湯 漏肝湯

妊婦出痘

起發灌漿遇產

生產未久出痘

藥方 安胎散 參芪內托散 如聖散 復燃丹

另備痘科要方

稀痘法

驚搐痘與驚風

相似辨誤

氣喘連聲

腹痛

見點認痘法

野痘

痘初出成塊

舌上有痘

防痘入目

眼出膿血

頰燥

口渴

稀痘方

發熱方

咬牙

足下冰冷

烙印堂上痘法

痘疔

痘毒入心

出痘縮舌

痘瘡入眼

痘不快發

催漿方

遍身疼痛

永不出痘

口鼻出血

喉嚨疼

經水觸犯法

蟲痘

痘出紅色

舌及鼻孔內有痘

喉下出痘

痘入目生翳

腰痛

痘不起水

痘痛

嘔吐

吐瀉

痘作漿時發瀉

痘痢

腎腫

癰疽厥逆

中風

口噤

咬牙寒顫

搔破出血

痘損破膿水不止

綿繭散

痘破爛流血不止

痘破成坑不能合口

痘瘡潰爛

痘爛生蛆

痘不收

痘不落痂

翻漿痘

痘疱

四肢節疤

痘後起疔

痘後發疹

痘起風丹

痘疹後生毒

痘後餘毒

痘後生瘡

餘毒紅腫

三豆散芙蓉膏

痘後諸瘡

金華散

鵝口瘡

痘後口水不收

痘後四體腫

痘後肚腹腫

眼腫

眼內紅

痘後兩目難開

痘後爛眼弦

痘後眼內生翳

痘後心痛

引痘新法

原說

三焦經圖

種痘穴分圖

經脈歌

執刀式

刀簪尺式

審穴用尺攷

引痘說

首在留養苗漿

引泄法

審苗法

度苗法

出痘時宜辨

出痘後須知

麻症門

四方麻名

麻症論

麻症與傷寒辨

論麻症輕重

麻症四忌

麻症治法

孟氏治麻良方

麻發不起氣喘欲死

麻症作癢

瘡後馬脾風

稀麻疹驗方

和五門

力氣即宜辨

性理

張大誠入地

張大誠

別義

作真傳

應真傳內

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

張大誠

濟世良方卷六

小兒門

方所不載者與大人同治

語云。願醫十男子。不醫一婦人。寧醫十婦人。不醫一嬰孩。蓋以嬰孩語言難達。四診難施。醫家每苦於測度也。然獨無情緒可察。形色可觀乎。是故鎮日無聲。知自在也。呱呱而啼。知有苦也。每臨夜啼。必內火熱。及於血分。啼即皺眉。必寒氣內發。於三陰。且欲食。哭常伸口。內熱哭。必畏光。內寒者。哭則見光。必止。內怯者。哭則得人即寤。又况苗竅之微。純一無偽。面色淡白。必氣虛。而體寒。便色金黃。必氣熱。而血燥。肝風動。眼目必青。心火灼。口舌如災。本此治之。雖不中不遠矣。醫顧可忽乎哉。

洗兒方法

初生下地。用猪膽汁入湯浴之。不生瘡疥。後以益母草煎水浴之。無病。

調燮

當兒未啼時即以輕指探兒口挖去汚血隨以甘草湯用軟帛裹指蘸湯拭去口中涎沫然後看兒面色若身面俱紅脣舌紫赤者必有胎毒每日用鹽茶不可太鹹以帛蘸洗其口去其稠涎日須五六次蓋胎毒藏於脾胃口中多有積涎其馬牙驚口重舌木舌皆從此起每日洗拭則毒隨涎去病從何來此法至簡至神萬毋忽視倘胎毒重直須洗過周歲方可止也若面脣淡紅此為胎寒前法則不適用惟以淡薑湯洗拭每日一二次足矣薑能開胃和中最切時用至於古法之用黃連大黃硃砂輕粉開口之法今時稟受十有九虛斷不可用又初生服方下地時即服

連翹

赤芍

防風

薄荷

各壹分

金銀花

叁分

鉤藤

壹分伍厘

蟬蛻

壹隻去

頭足

荊芥

壹分

甘草

肆分

燈芯引

斷臍帶法

凡斷臍帶世俗皆以剪刀最為不妥宜以大紙撚蘸香油燃火於臍帶上燒之

令斷以補接其陽氣不但為回生起死之良法且日後可免傷寒泄瀉之患若用剪刀必先入懷中溫暖

夢生

小兒初生或不能發聲謂之夢生又謂之悶臍生多不知救深為可憫若寒天宜將兒抱懷中切勿誤斷臍帶速用明火將胞衣炙煖使煖氣入兒腹更以熱湯溫洗臍帶或用細紙條點油火於臍帶下往來薰之即取貓壹隻以布袋裹

其頭足使伶俐婦人拿住貓頭向兒耳邊以口咬貓耳貓必大叫一聲兒即醒而聞聲方可剪斷臍帶又法以葱鞭其背取開通擊醒之義如數日不啼用

白當歸心蒸紹酒搽口效

若氣絕面青指甲黑者無救

又有因難產或冒風

寒舉之遲兒氣欲絕不能啼者亦以前法溫暖之令煖氣入腹氣回即甦更令父母之真氣呵而接之

生下無穀道

此為肺熱閉於肛門急以金銀簪或玉簪看穀道端的刺穿之或用針刺穿但不可深以油紙搽套住免其再合

初生有白膜皮裹舌或遍舌根

以指甲刮破令血出以枯礬末如綠豆大敷之若不摘去兒必啞

初生手指連皮不能分開

以琴線鋸開如血不止用生薑黃為末搽之若過一七二七則難鋸矣

足趾向後

此由懷孕時日日盤坐兒在母腹一氣相通形隨氣化故足趾俱向後曲治法用軟綿捲如棍子安兒膝後彎內用木瓜煎湯常洗熨之日久筋長舒展則自能伸

初生無皮

兒初生偏身無皮俱是紅肉蓋因母受胎後久處高樓不沾地氣故耳用純黃

土或陳壁土不拘多少研極細末盛軟絹袋內在兒周身輕輕撲之一日三四次皮自生又方將兒卧泥地上一宿即長皮又方早稻白米作粉時時撲之其皮漸生胎元不足者宜之又方黃柏生石膏煨各等分研細末撲之濕則乾撲乾則用猪膽調搽遺毒者宜之或由母之火盛所致者亦治

初生周身發炮

形如魚泡或如水晶擦破則水滲流

蜜陀僧

炒乾研極細末頻搽患處再服蘇合香丸自愈

初生小便不通

用猪毛於陽物孔上刺去薄皮即通如孔上無薄皮即係胎熱用大葱頭

壹個

切四片以乳汁半盞同蒸分作四次服即通如數日不通遍身腫滿者用蘇

葉壹斤煎濃湯一盆抱兒向盆中薰之冷則再換熱湯外用炒鹽熨臍上及遍

身腫處即愈又方皂角末吹鼻令嚏即通

初生大小便不通腹脹欲絕

急令人溫湯漱淨口，吸嘔兒之背心，心窩臍下兩手足心共七處，吸嘔五七口，取紅赤色氣透為度。氣透則便自通。又方：連鬚蔥頭茶個、老薑壹大塊、豆豉、食鹽各叁錢，同搗作餅，焙熱，掩肚臍上，帶熱良久自通。

初生七日内大小便有血

此由胎氣熱盛之所致。或母食酒麪炙煖熱毒等物，流入心肺，兒在胎內受之，熱毒亦傳於心肺。女子熱入於心，故小便有之；男子熱入於肺，故大便有之。方用生地黄取自然汁，入蜜少許，和勻溫服，男女皆效。

初生外腎縮入

硫黃

吳茱萸末

各伍錢

以蒜汁調塗臍腹上，再以蛇床子燒烟微微薰之。

初生眼閉不開

熊膽

黃連

各少許

同煎洗眼自開。

又方：川芎

生地

當歸

赤芍

花

粉

甘草

各壹錢

煎服亦效。