

欽定四庫全書

子部

婦人大全良方卷二



南京中医药大学图书馆版权所有

婦人大全

卷之

婦人經水不調

婦人經水不調

宋 陳白明 撰

於陰陽雖清濁動靜之
婦人之病與男子不同

男子十倍難治不亦言

之深乎但三十六病產蓐一門男子無之其餘外傷風暑寒濕內積喜怒憂思飲食房勞虛實寒熱悉與丈夫一同也依源治療可得而知之

產寶方論第二

古書治婦人別著方論者以其胎妊生產崩傷之異況婦人之病比之男子十倍難療蓋女子嗜慾多於丈夫感病倍於男子加之慈戀愛憎嫉妬憂恚染著堅牢情不自抑所以為病根深治之難差况懷胎妊娠而挾病

也不特避其毒藥仍須審其虛實冷熱而調治之無使妄投湯劑以致夭枉

博濟方論第三

夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷血氣則風冷乘虛而干之或作之於經絡或循入於腹中內受風邪脾胃虛弱故不能消於飲食也食既不充榮衛凝滯肌膚黃燥面不光澤若大腸氣虛則變為下利若流入關元致絕子嗣隨其所傷而變成疾醫經

曰凡婦人三十六種病皆由子臟冷熱勞損而挾帶下起於胞內也是故衝任之脉為十二經之會海婦人之病皆見手少陰太陽之經而候之

寇宗奭論第四

治婦人雖有別料然亦有不能盡聖人之法者今豪足之家居奧室之中處帷幔之內復以帛幪手臂既不能行望色之神又不能殫切脉之巧四者有二闕焉黃帝有言曰凡治病察其形氣色澤形氣相得謂之可治色

澤已浮謂之易已形氣相失謂之難治色夭不澤謂之難已又曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以為診法若患人脉病不相應既不得見其形醫人止據脉供藥其可得乎如此言之烏能盡其術也此醫家之通患世不能革醫者不免盡理質問病家見所問繁遂謂醫業不精徃徃得藥不肯服似此甚多扁鵲見齊侯之色尚不肯信況其不得見者乎嗚呼可謂難也已

通用方序論第五

夫通用方者蓋產前產後皆可用也或一方而治數十證不可入於專門皆是名賢所處世之常用有效之方雖曰通用亦不可刻舟求劍按圖索驥而膠柱者也

加減四物湯 治婦人經病或先或後或多或少疼痛

不一腰足腹中痛或崩中漏下或半產惡露多或停留不出妊娠腹痛下血胎不安產後塊不散或亡血過多或惡露不下服之如神 張聲道云此方治婦人百疾只是四物湯加茺萸煎服若陽臟少使茺萸若陰臟多

使茱萸吳興周端仁郎中頃赴省試照矚一鄰案出場
云某本醫家凡婦人百病只是四物湯加茱萸無不效
者謹以此為報

徐明仲方
加香附子

當歸 白芍藥 川芎

陸氏云川
芎減半

生乾地黄

洗焙
養生

必用方熟者和劑亦然本草云男子
宜熟者女子宜生者合用生者為是

右等分為粗末每服四錢水一盞半煎至八分去滓
取六分清者帶熱服食前 若平常血氣不調及常
服只用本方日二三服 治經血凝滯腹內血氣作

疼加莢茂官桂等分用之

王碩膚云熟地黃滯血安能止痛不若用五味子代

之如因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生薑煎

若胎動不安下血每服加艾葉五七片更加葱白

阿膠末減四味之半當歸用小半如疾勢甚者以四

味各半兩細剉以水四盞熟艾一塊如雞子大阿膠

五七片煎至二盞半去滓分作四服一日令盡

一方有粉

草乾薑黃耆

日二三服至二臈

以一七日為一臈

以前產後每日

可一二服

如氣虛弱血海不調服一月不妨如

產後被驚氣滯種種積滯敗血一月內惡物微少敗
血作病或脹或疼胸膈脹悶或發寒熱四肢疼痛加
延胡索沒藥香白芷與四物等分為細末淡醋湯或
童子小便酒調下 如血風於產後乘虛發作或產

後傷風頭痛發熱百骨節痛加荆芥穗天麻香附子
石膏藿香各一分四物料共一兩中加之每服三錢
水一盞煎七分服 如虛熱心煩與血相搏口舌乾
渴欲飲水者加栝樓根一兩麥門冬去心三分 如腹

刺痛惡物不下加當歸芍藥一分 如血崩不止加

熟地黃蒲黃各一兩 嘔逆加白朮人參各半兩

如寒熱往來加炮了乾薑牡丹皮各一分 因熱生

風加川芎一分柴胡半兩 腹脹加厚朴枳實各一

分 身熱脉數頭昏項強加柴胡黃芩各半兩 如

臟腑滑泄加桂心附子炮熟各一分 若虛煩不睡加

竹葉人參各一分 煩躁引飲頭痛大渴加知母石

膏各半兩若水停心下微吐逆加朮猪苓防已各三

分同煎 若平常些少虛眩肢體瘦倦月信不調只

用生薑薄荷如常煎服

此是婦人常服之藥蓋味寡而性緩效遲而功深

一

方治婦人血虚心腹疔痛不可忍者去地黃加乾薑

名四神湯 治老人風秘加青皮等分煎服 一方

治小便澁大便秘加大黃桃仁去皮尖炒黃減半煎

一方治血痢不止加阿膠艾葉煎

陳氏方治痢疾腹痛難忍以此

名六物湯

一方治婦人腹痛作聲經脉不快加熟地黃一

倍添桂心半倍煎治瘡疾加荊芥酒煎常服 一方

添柴胡名五神湯柴胡大能補虛退虛熱 一方以
四物湯共四兩為細末煉蜜為圓如梧桐子大空心
米飲下三四十圓以療年高婦人白帶又良驗也請
詳用之 一方四物湯共四兩加甘草半兩細末煉
蜜為圓每兩作八圓酒醋共半盞溫湯同化調停下
名當歸煎去敗血生好血如人行五里再進一圓無
時候用生地黃為正此藥不知起於何代或云始自魏華佗
按巢氏云佗之術精微方類單省傳稱佗術鍼灸不

過數處千金方云自三代以來醫方論藥未有如此
詳備者其間有漢晉名公諸方今產寶方乃朱梁時
節度巡官咎膺所撰其中有四物散國朝太平興國
中修入聖惠方者數方自後醫者易散為湯雖無傑
特之功但善用者若馭良馬以意驅策之則隨意無
所不至自可珍也自皇朝以來名醫於此四物中
增損品味隨意虛實寒燠無不得其效者然亦非
止婦人之疾可用而已

懷妊產前後加減良方

川芎

洗

當歸

桂心

火不見

白芍藥

洗

右四味各為細末取淨一兩各隨病證加減用

產前初覺胎動川芎芍藥各半錢米飲下 臨產腹

痛甚川芎芍藥當歸各半錢桂末一錢

溫酒下扶產婦運行

產

後惡露未快川芎當歸各半錢童子小便調下仍時

時打醋炭令香不絕則血脉自收安樂無病切不可

妄投藥恐逐血過多則心虛氣劣三日內只服當歸

川芎末各一錢童子便調下日三服三日後只服四順
理中圓空心童子小便吞下 七日內補虛當歸川
芎末各一錢童子小便或米飲調下 七日外方可
服補藥補得太早則留住惡血 纔平善四味各半

錢童子便調下 產後頭昏目暈川芎芍藥當歸末各

半錢童子小便調下未滿月已滿月四味各半錢水

一盞煎至八分溫服 腹痛當歸末一錢桂心末半

錢童子小便調下心胃煩悶當歸芍藥各一錢童子

小便調下 惡露過多桂心芍藥當歸各一錢童子

小便調下 大便冷用理中圓水一盞煎八分溫服

佛手散 治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾纔產了

未進別物即先服此藥能除諸疾逐敗血生新血

川芎二兩 川當歸三兩

右為細末每服二錢水一盞酒二分煎七分溫服

一方為粗末每服四錢水七分酒三分同煎至七分
熱服將產前先安排此藥將兩服藥末煎之產了速