

辨

證

錄

辨證錄卷之十二

山陰陳士鏗敬之甫號遠公號朱華子著述

會稽陶式三尚白甫號存齋又號

叅訂

安胎門

婦人小腹作痛胎動不安如下墜之狀人以爲帶脉之無力也誰知脾腎兩虧乎夫胞胎雖係於帶脉而帶脉實關於脾腎二經虧損則帶脉力微胞胎何能勝任乎然人致脾腎之虧者非因於飲食之過多卽由於色慾之太甚不補脾補腎而帶脉迫急胞胎所以下墜也第胞

胎通於心腎不通於脾補腎可也何必補脾不知脾胃
爲後天腎爲先天脾非先天之氣不能化腎非後天之
氣不能生補腎不補脾則腎之精正不能遽生也補後
天之脾正所以補先天之腎補先後天之脾腎正所以
固胞胎之氣蓋胞胎原備先後天之氣安可不兼補先
後天脾腎哉方用安奠二天湯人參一兩白朮一兩熟
地一兩山茱萸五錢山藥五錢炙甘草一錢杜仲三錢
枸杞子二錢扁豆二錢水煎服一劑痛定二劑胎安不
必三劑夫胎動乃脾腎雙虧之症必須大用參朮熟地

補陰補陽之味始能挽回於頃刻世人往往畏用參朮或少用以冀建功反致寡效此方正妙在多用也

用娛親湯

亦效

熟地一兩白朮一兩甘草一錢人參五錢杜仲五錢山藥五錢水煎服

婦人懷妊至三四月自覺口乾舌燥咽喉微痛無津以潤以致胎動不安甚則血流如經水人以爲火動之故也誰知水虛之故乎夫胎非男精不結亦非女精不成逐月養胎古人每分經絡其實不能離腎水以養之也故腎水足而胎安腎水缺而胎動又必腎火動而胎始不

寧蓋火之有餘仍是水之不足火旺動胎補腎水則是以安之矣惟是腎水不能遽生必須上補肺金則金能生水而水有化源無根之火何難制乎方中少加清熱之品則胎氣易安方用潤燥安胎湯熟地一兩山茱萸五錢益母草二錢黃芩一錢麥冬五錢生地三錢阿膠二錢五味子二分水煎服二劑燥減又二劑胎安連服十劑胎不再動矣此方專添腎中之精雖兼於治肺然補肺無非補腎故腎經不燥火不燥胎安得而不寧靜乎

用過參散
亦效

熟地一兩玄參地骨皮麥冬各五錢北五味子
甘草各一錢貝母五分炒棗仁五錢水煎服

婦人有上吐下瀉以致胎動下墜疼痛難忍急不可緩人
以爲脾胃之寒極也誰知脾胃之虛極乎夫脾胃氣虛
則胞胎無力必有崩墜之虞況加上吐下瀉則脾胃
愈虛欲胞胎無恙得乎然而胞胎雖疼痛而猶不下者
蓋脾胃雖損而腎氣尙固也胞胎系於腎而連於心腎
未損則腎氣交於心心氣通於胞胎所以未至於胎墜
也且腎氣能固則腎之氣必來生脾心氣能通則心之

氣必來援胃脾胃雖虛而未絕則胞胎雖動而未落耳
治法可不急救其脾胃乎然而脾胃將絕止救脾胃而
土氣難生更補助其心腎之火則火能生土尤易接續
也方用援土固胎湯人參一兩白朮二兩肉桂二錢山
藥一兩附子五分炙甘草一錢杜仲三錢續斷三錢枸
杞子三錢山茱萸一兩兔絲子三錢砂仁三粒水煎服
一劑瀉止二劑吐止腹中疼痛急迫無不盡止也此方
救脾胃之土十之八救心腎之火十之二救火輕於救
土者豈土欲絕而火未絕乎不知土崩非重劑不能援

火息雖小劑亦可助熱藥多用必有大燥之虞不比溫
補之品可以多用况懷妊胎動原係土衰非係火衰也
何必用大熱之劑過於助土以傷胎氣哉

用脾胃兩安

湯亦效

白朮五錢白茯苓人參各三錢陳皮五分
砂仁一粒山藥一兩薏仁五錢水煎服

婦人有懷抱憂鬱以致胎動不安兩脅悶痛如子上懸人
以爲子懸之病誰知是肝氣之不通乎夫養胎半係腎
水然非肝血相助則腎水亦必有獨力難支之勢使肝
經不鬱則肝氣不閉而肝血亦舒自然灌注於胞胎以

助腎水之不足今肝因憂鬱則肝且閉塞不通子無血
蔭安得不上升以覓食乎此子懸之所必至乃氣使之
升非子之欲自懸也治法不必治子懸以瀉子但開肝
氣之鬱結補肝血之燥乾則子懸自定方用解懸湯白
芍一兩當歸一兩炒梔子三錢枳殼五分砂仁三粒白
朮五錢人參一錢茯苓三錢薄荷二錢水煎服 劑悶
痛除二劑子懸定三劑全安去梔子多服數劑尤妙此
方乃平肝解鬱之聖藥鬱開而肝不去剋土肝平而木
不去生火况方中又有健脾生胃之藥自然水穀生精

四布各藏肝腎有潤澤之機則胞胎自無乾澀之患何至嬰兒之上懸哉

用通肝散

亦佳

白芍一兩歸身川芎茯苓各三錢鬱金薄荷各一錢
香附神曲各二錢陳皮三分蘇葉五分白朮五錢水
煎服

婦人有跌閃失足以致傷損胎元因而疼痛人以爲外傷之故也誰知仍是內傷之故乎凡人跌撲閃挫亦能動胎若作跌閃外治未能奏功且有因治反墮者必須大補氣血少加行動之味則瘀血自散胎又得安然補血

宜多補氣宜少方用救損湯治之歸身五錢白芍三錢
白朮五錢人參一錢生地一兩甘草一錢蘇木三錢乳
香末一錢沒藥末一錢水酒煎服一劑疼痛止二劑胎
不墮矣不必三劑此方既能去瘀又不傷胎蓋補血補
氣復無停滯之憂更少通滑之害治無胎之跌閃可建
奇功治有胎之跌閃尤有殊績者也

亦可用救傷

散治之

歸身熟地各一兩白朮白芍生地杜仲
各五錢甘草一錢丹皮二錢水煎服

婦人有胎雖不動腹亦不疼然時常有血流出人以爲血

虛胎漏也誰知氣虛不能攝血乎夫血能蔭胎胎中之血必藉氣以包之氣虛下陷血乃隨氣亦陷矣夫氣虛則血必旺血旺則血必熱血寒則靜血熱則動動則必有躍躍欲出之兆况加氣虛安得不漏泄乎猶幸其氣之虛也倘氣旺血熱則血必大崩不止些些之漏出矣治法補氣之不足瀉火之有餘則血不必止而自止方用助氣補漏湯人參一兩甘草一錢白芍五錢黃芩三錢生地三錢益母草二錢續斷二錢水煎服一劑血止再劑不再漏也此方用人參以補陽氣用黃芩以漏陰

火火瀉則血不熱無欲動之機氣補則血能包無可漏之竅自然氣攝血而血歸經寧有漏洩之患哉

用攝血丹

亦效

黃芪白朮各五錢人參二錢甘草荆芥破故紙各一錢續斷二錢肉果一枚水煎服

婦人有懷妊至七八月忽然兒啼腹中腹亦隱隱作痛人以爲胎熱之故也誰知氣虛之故乎夫兒在胎中母呼亦呼母吸亦吸未嘗有一刻之間斷也然嬰兒至七八月母之氣必虛兒不能隨母之氣以呼吸則子失母氣而作啼矣腹中聲啼似乎可異其實不必異也治法大

補其氣使母之氣能哺於子則子之氣既安而子之啼
亦息方用止啼湯人參一兩黃芪一兩當歸五錢麥冬
一兩橘紅五分甘草一錢天花粉一錢水煎服一服卽
止啼二服斷不再啼也此方用參芪歸冬以補肺氣以
肺主氣也肺氣旺而胞胎之氣不弱胞中之子自安矣
所以一二劑而奏功耳

用接氣飲

亦效

人參白朮黃芪麥冬各五錢茯苓三錢當歸三錢貝
母神曲各一錢炮薑五分水煎服一劑卽止啼四劑
不發

婦人有口渴出汗大飲凉水煩燥發狂腹痛腰疼以致胎動欲墮此乃胃火熾炎熬乾胞胎之水故耳夫胃爲水穀之海多氣多血以養各藏府者也萬物皆生於上上氣厚而物生因土中有火也然則火在胃中宜乎生土何以火盛反致太乾以害土乎不知無火難以生上而多火又能爍水也土中有火則土不死土中無水則爲焦土使胃火過旺必致先爍賢水而土中燥裂何以分潤於胞胎哉土爍之極火勢炎蒸犯心而神越以致嬰兒逼迫安得不下墮乎治法必須急瀉其火濟之以水

水旺而火自衰火衰而胎自定也方用止焚定胎飲之
參二而自菊三錢青蒿五錢茯苓三錢生地一兩知母
二錢白朮五錢人參三錢天花粉二錢水煎服一劑狂
少平二劑狂大定三劑火盡解胎亦安也不必四劑此
方藥料頗大恐有不勝之憂第懷妊而火盛若此非用
大劑之藥火不肯息狂不肯止而胎不肯寧也然而藥
料雖多均是補水之味亦正有益無損不必顧忌耳

用滋胎飲

亦效

麥冬二兩黃芩三錢生地歸身各一兩天花
粉二錢甘草一錢水煎服二劑狂定四劑愈

婦人懷子在身痰多吐涎偶遇里崇忽然腹痛胎向上頂
人以爲子懸之滿也誰知亦有中惡而胎不寧乎凡不
正之氣最能傷胎蓋陰邪陽祟多在神宇潛踪幽險岩
洞實其往來之所觸之最易相犯故孕婦不可不戒也
治法似宜治痰爲主然而治痰必至耗氣之虛則痰雖
消化胎必動搖必須補氣以生血補血以活痰少加消
痰之味則氣血不虧痰又湯化方用消惡安胎湯白朮
五錢甘草一錢白芍一兩陳皮五分蘇葉一錢沈香末
一錢乳香末一錢天花粉三錢當歸一兩人參三錢茯