

下利

成自利者不因攻下而自泄瀉也有表邪傳裏裏虛協

熱而利者有不因攻下而下之遂利者是皆協熱也又

三陽合病皆作自利有發表攻裏和解之不同

太陽陽明合病

為在表故與葛根湯以汗之太陽少陽合病為在半表半裏故與黃芩湯以和解之陽明少陽合病為少陽邪

氣入裏故與承氣湯下之且自利不渴者屬太陰藏寒故也下利欲

飲水者有熱故也故大便溏小便自可與夫發熱後感

泄色黃赤者皆為熱也自利小便色白少陰病形悉具

與夫惡寒脉微自利清穀者皆有寒也夫自利固多可

溫然腸胃有積結與下焦客邪又非溫劑所能止必也

或分利之或攻泄之乃可也

經曰理中者理中焦此利在下焦宜赤而胎禹餘糧

湯不差當利其小便是也少陰病自利清水色純青心

下必痛口乾燥與夫下利三部皆平按之心下硬或脈

沉而滑或不欲食而譫語或差後至年月復發此數者

皆腸胃有積結而須攻泄者也此則謂之通因通用

又下利雖有表證不可發汗以下利為邪氣內攻走津

液而胃虛也經曰下利不可攻表汗出必脹滿是也蓋

三陰自利居多然自利家身涼脈靜為順身熱脈大為

逆大抵下利脫氣又為難治蓋邪盛正虛邪壅正氣下

脫多下利而死

經同少陰病自利復煩躁不得卧寐者或直視譫語下利者死下利日十餘行

脈反實者死下利手足厥冷無脈灸之不溫脈不還者

死發熱下利至甚厥不止者死此數者皆邪氣壅正氣

下脫

要略曰六府氣絕于外手足寒五藏氣絕于內利

故死

下不禁噫疾成而後藥雖神醫莫能為氣已脫矣孰能為之六經俱有下利之病表裏寒熱治各不同學者宜審

太陽傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯

太陽不解

與陽明合病必自下利葛根湯

成傷寒有合病有併病太陽病不解併於陽明

者謂之併病三經俱受邪相合病者謂之合病合病者邪氣甚也太陽陽明合病者與太陽少陽合病陽明少陽合病皆言必自下利者以邪氣併於陰則陰實而陽虛邪氣併於陽則陽實而陰虛寒邪氣甚客於二陽二陽方外實而不主裏則裏氣虛故必下利與葛根湯以散經中甚邪○其脈必浮而長也

太陽病

外證未除而數下之遂挾熱而利利不止心下痞鞭表

裏不解者桂枝人參湯

張或云仲景論中太陽病桂枝證醫反下之利遂不止與葛根

黃連黃芩湯上條又與桂枝人參湯且二證俱係不解而下之成利者何故用藥有溫涼之異夫二證俱係內虛熱入協熱遂利但脈證不同故用藥有殊耳經言肺促者表未解也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之夫肺促為陽盛喘而汗出為裏熱其陽盛裏熱與葛根黃連黃芩者理所宜也

太陽與少陽

合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏薑湯

下利而頭疼胃滿或口苦咽乾或往來寒熱其脈或大而弦是也

黃芩湯方

黃芩

參兩

芍藥

甘草

各二兩

大棗

拾貳枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜

一服

虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦酸以堅斂腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草大棗之甘以補固腸胃之弱

黃芩加半夏生薑湯

黃芩湯內加半夏半升

洗

生薑參兩切

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞅下利不止水

漿不下其人心煩

生薑瀉心湯

○張凡合病皆下利各從外證

以別焉夫太陽病頭項痛脣春強陽明病目疼鼻乾不得臥少陽病胸脇痛耳聾凡遇兩經病證齊見而下利者曰合病也雖然但見一證便是不必悉具然仲景不言脈證止言太陽與陽明合病者以前章所論包含已上之證即此理也况各經之證所見不一難為定論

太陽病桂枝證反下之利

遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩黃連

湯

葛根黃芩黃連湯方

葛根

半斤 甘艸 炙

黃芩

各貳兩

黃連

參兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二

升去滓分溫再服

內經曰甘發散為陽表未解者散以葛根甘草之甘苦以堅裏氣弱者堅以黃芩黃連之苦

太陽病下之脉促不結胸者為欲解脉沉滑者協熱利

脉浮滑者必下血

黃芩湯

太陽病二三日不能卧但

欲起心下必結脉微弱者此本有寒分也反下之若利

止必作結胸未止者四日復下之此作協熱利也

黃芩湯

傷寒中風反下之利遂不止穀不化腹中雷鳴心下
鞭滿乾嘔心煩不安醫見其痞復下之痞益甚此非結
熱以胃中空虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉心湯 傷
寒汗解後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣
腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯 太陽中風下利嘔逆
表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下
痞鞭引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未
和也十棗湯 傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而
下利者大柴胡湯 傷寒十三日不解過經譫語者以
有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利

脉調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此為內實也調胃承氣湯 太陽病二日反躁反熨其背而大汗出大熱入胃水竭躁煩必發譫語十餘日振慄自下利者為欲解也 傷寒醫下之續得下利清穀不止身痛者急當救之四逆湯身痛清便自調者急當救表桂枝湯成傷寒下之續得下利清穀不止身痛急當救裏以裏氣不足必先救之急與四逆湯得清便自調知裏氣已和然後急與桂枝湯以救表身疼者表邪也內經曰病發而不足標而本之先治其標後治其本此以寒為本也

四逆湯方

甘草

炙貳兩

乾薑

壹兩半

附子

壹枚去皮破剝片

一用附子去皮臍先將鹽水薑汁各半盞里五無酢煮
七沸後入甘草黃連各半兩每加童便半盞其煮志
沸在火良久陽起大磁器盛貯受地氣一晝夜取出
曬乾以備後用庶無毒害頂圓脩正一兩一枚者佳
右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再
服強人可大附子一枚乾薑三兩

成四肢者諸陽之本陽氣不足陰寒加之陽氣不相
順接是致手足不溫而成四逆此湯中發陽氣走散
陰寒溫經暖肌故以四逆名也內經曰寒淫於內治
以甘熱却陰扶陽必以甘爲主是以甘草爲君內經
曰寒淫所勝平以辛熱逐寒正氣必先辛熱是以乾
薑爲臣內經曰辛以潤之開發腠理致津液通氣也

煖肌溫經必憑大熱是以附子為使此奇制之大劑也四逆屬少陰少陰者腎也腎肝位遠非大劑不能達內經曰遠而奇偶制大其服此之謂也

傷寒服湯藥下利不止心下痞硬服瀉心已復以他藥下之利不止治以理中利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯復利不止當利小便或用猪苓湯赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂

壹斤碎

禹餘糧

壹斤碎

已上二味以水六升煮取二升去滓分二服

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日痢潮熱已而微利此

本柴胡證下之不利今反利者誤以丸藥下之也潮熱者實也先宜柴胡以解外後以柴胡加芒硝 太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐胸中痛大便反澀腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者調胃承氣湯

陽明病潮熱大便澹小便自可胸脇滿者小柴胡湯

病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下下之脈數不解而下利不止必便膿血也黃芩湯 柴皮湯 陽明少陽

合病必下利其脈不負者順也負者失也互相尅賊名

爲負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯成

明土少陽木二經合病氣不相和則必下利少陽脈不勝陽明不負是不相尅爲順也若少陽脈勝陽明脈負

者是鬼賊相刺為正氣失也脈經曰脈滑者為病食也
又曰滑數則胃氣實下利者脈當微厥今脈滑數知胃
日消食與大承氣湯以下除之
臟結如結胸狀飲食如故時時下利

寸脈浮關脈小細沉緊舌上白胎滑者難治

太陰太陰為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛

若下之必胸下結鞭自利不渴者屬太陰以其臟有

寒故也當溫之宜服四逆輩

張經言輩字者謂藥性同類惟輕重優劣不同耳凡

太陰自利不渴師言有用理中而愈者甚則理中加附
子而獲安者凡言輩者蓋如此大四逆湯甘辛相合乃
大熱之劑苟輕用之恐有過度之失所以仲景不為定
處也莫若以理中循循而用之至為平穩如不得已者
四逆方可
太陰為病脈弱其人續自便利設當行芍

藥大黃者宜減之以其人胃氣弱易動故也

成腹滿痛者太陰為

也脉弱其人續自便利則邪雖在裏未成大實欲用大黃為藥攻除滿痛者宜少與之以胃氣尚弱易為動利也

傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰當發身黃

若小便自利者不發黃至七八日雖暴煩下利日十餘

行必自止以脾家實腐穢當去故也

平胃散加穿山甲

少陰病欲吐不吐但欲寐五六日自利而渴者屬少陰

也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便

白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

欲吐不吐心煩者表

邪傳裏也若腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陽

五六日邪傳少陰之時也自利不渴者寒在中焦屬太

陰此自利而渴寒在下焦屬少陰○按寒在下焦之說不通未聞寒在下焦而渴者小便色白下焦虛寒可知惟其虛故藉外水以自救非熱而作渴也故活人云四逆湯主之若小便不白而黃亦則不在此例故厥陰篇

傷寒下利
又曰下利欲飲水者以有
熱故也白頭翁湯主之

少陰病下利咽痛胸滿心

煩者猪膚湯

猪膚湯方

猪膚壹斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉
五合熬香和相得溫分六服

猪水畜也其氣先入腎少陰客熱是以猪膚
解之加白蜜以潤燥除煩曰粉以益氣斷利

少陰病四逆或泄利下重者四逆散方見前條少陰病下

利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯方見少

陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜

大承氣湯

孫寶大郎患傷寒經十餘日口燥舌乾而渴心中疼
自利清水衆醫皆相守但調理耳汗下皆所不敢寶
氏親故相謂曰傷寒邪氣害人性命甚速安可以不
決之疾投不明之醫乎召孫至曰卽日不可下明日
正當下投小承氣湯遂大便通得睡明日平復衆皆
曰此證緣何下之而愈孫曰不深於書徒知有書耳
不知書之奧也口燥舌乾而渴豈非少陰證乎少陰
證固不可下豈不知少陰一證自利清水心下痛者
下之而愈仲景之書明有是說也衆皆欽服

少陰病下利惡寒而蹇手足溫者可治四逆湯少陰

二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者

桃花湯主之

詳腹
痛

桃花湯方

赤石脂

壹斤一半全
用一半篩末

乾薑

壹兩

粳米

壹升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石

脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

瀉可去脫赤石脂之瀉以固腸胃辛以散之
乾薑之辛以散裏寒粳米之甘以補正氣

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼