

欽定四庫全書

子部

醫壘元戎卷五



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

醫壘元戎卷五

元 王好古 撰

少陽證 先足經從湯液 次手經從雜例

海藏論男子婦人傷寒同一法

古人云婦人傷寒治法與男子不同舉男子調氣女子

調血以為大略舉脈緊脈緩脈洪為傷寒傷風熱病

為一證當汗當下不必調血而後行仲景不分男女

良以此歟此論固當猶為未也仲景亞聖也世醫所知仲景不知有是理乎聖人辨物賢者述之事可以為天下則聖人已先據之矣何待世人明之乎聖人不言以其男女同診也後人不知湯液之源故立為婦人法則異於男子常人所易聰明眼者肯以此為是乎然以藥考之則可知也假令桂枝芍藥固榮而閉衛非血藥如何麻黃防風雖為之發汗本治乳子餘疾非血藥如何白虎小柴胡中知母則治腎柴胡

則調經皆氣中之血藥也當歸地黃不言可知為血藥白朮人參皆以為氣劑本草言能利腰臍間血非血藥乎大抵用之在陽便是氣藥用之在陰便是血藥若男子與女人傷寒皆榮衛受病其證一也何必云男先調氣女先調血也此二句雲岐子以為治襍病法之常體非為傷寒設也其所以異者以其任衝盛而有子月事行有期有熱入血室一證不得不異也在妊孕不得不保在經血不得不調表裏汗下何

嘗有異也無汗下藥中增損自有調保之義活人云
妊娠不用桂枝半夏桃仁柴胡湯減半夏為黃龍湯
是則是矣必竟畜血極而隣於死須抵當湯九則安
得不用也是減劑從輕可也故黃帝云重身毒之何
如岐伯曰有故無損亦無損也大積大聚可輕犯也
哀其大半乃生過者死此所以有從輕之義活人注
中舉似其言甚當仲景不言男子婦人有異其意蓋
由諸此以知桂枝半夏桃仁可用處必用不可全無

但當從輕則可以保安丸中有桂枝附牛膝皆墮胎
之劑以其數多之中些少是亦從輕而無妨也又為
引用必須少而不可無也大意如此後之君子更宜
詳定保劑多破劑少破者從其保破劑多安劑少安
者從其破此理不可不知 又寒熱多少例寒者多
熱者少熱不為之熱熱者多寒者少寒不為之寒
此婦人之病多在經血不調故婦人傷寒一條列少
陽條下

仲景小柴胡湯

治往來寒熱胸脇痛而耳聾或欬或嘔尺寸脈俱浮而弦

柴胡

三兩

人參

半夏

黃芩

甘草

右以咀生薑棗煎本經加減七法

此方亦治瘧與

襍病中外不相及

襍病寒熱往來經水不調加秦

芎芍藥當歸知母地骨皮牡丹皮川芎白朮茯苓去

半夏

治婦人虛勞發熱加蛤蚧赤茯苓小柴胡湯

與四物湯各半一名調經湯 無汗嘔者加半夏亦可無汗者加柴胡 惡寒者加桂 有汗者加地骨皮嗽者加紫苑 通經加三稜廣茂勞者鱉甲

又小柴胡湯加法 若胸中煩不嘔者去半夏人參加

括蕒實二枚 若渴者去半夏加入參合前成四兩

半括蕒根四兩 若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩 若脇

下痞鞭者去大棗加牡蠣四兩 若心下悸小便不利去

黃芩加茯苓四兩 若不渴外有微熱去人參加桂三

兩溫覆取微汗愈 若嗽去人參大棗生薑加五味
子半兩乾薑二兩 血弱氣虛腠理間邪氣因入與
正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱發作有時
默然不欲飲食臟腑相連其痛必下邪高痛下故使
嘔也小柴胡湯主之

易簡小柴胡湯

治傷寒溫病身熱惡風頭項強胸滿脇痛煩渴嘔噦
小便不利大便秘鞭或過經未解潮熱不除非汗非

下之證並宜服之及產後勞復發熱頭疼徃來寒熱
婦人傷寒經水適來適斷發熱發寒晝則明了夜則
譫語此為熱入血室則血必結故使寒熱如癰狀此
藥主之小兒溫熟悉能療

柴胡

二兩

半夏

黃芩

人參

甘草

各二兩

右㕮咀每服五錢水鍾半生薑五片棗一枚煎至六
分去滓食前服 若腹痛去黃芩加芍藥半兩心悸
去黃芩加茯苓一兩 若不渴外有熱者去人參加

桂三分溫服令有汗則解 若咳嗽去棗加五味子
三分乾薑半兩 胸中煩而嘔者去半夏人參加括
萎實半兩 渴者去半夏加括萎根一兩胸中痞鞭
者加煨了牡蠣一兩傷寒十三日不解胸脇滿而嘔
者晡則發熱已微利醫以丸藥利之非其治也宜加
芒硝一兩 傷寒十餘日結熱在裏徃來寒熱或心
下急鬱鬱微煩或口生白胎大便不通或發熱汗出
或胸中滿痛或日晡發熱如瘧或六七日目中不了了

了晡不飢無裏證大便難身發熱者實也去人參加
枳實大黃一兩名大柴胡湯服之以利為度熱除不
宜遽用補藥仍忌羊肉腰子酒并難化之物或有所
傷是名食復難以治療切宜忌之

逍遙散

主治修製
並見局方

柴胡

二兩

當歸

芍藥

白朮

茯苓

薄荷

少許

甘草

各半兩

右以咀生薑煎服

丹溪云治婦人大人小兒男女

同法

易簡逍遙散

治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰
赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月水
不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女榮衛不和痰嗽
潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓 白朮 當歸 白芍藥 柴胡

各一兩

甘草

半兩

右呔咀每服四錢水一鍾煨生薑一塊切片煎至六分去滓熱服無時 一方名人飲治婦人血熱虛勞骨蒸兼治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏疼夜多盜汗補正氣解勞倦用人參白朮茯苓柴胡半夏當歸赤芍藥乾葛甘草黃芩各等分呔咀每服四錢水鍾半生薑四片棗二枚煎至六分不拘時候應有勞熱證者皆可服之熱退即止但婦人寒熱亦因有經血結閉者致令五心煩熱及骨節間熱或

作虛勞治之反以為害積日既久乃成真病法當行
其經血若月事以時自然平治或以局方大聖散用
紅花煎酒調服不能飲者以醋代之仍以紅丸子醋
湯嚥下此二藥大治經事不調或腹有血塊若久無
子息服之數月其效特異非可數服責其無功 或
因下血過多發為寒熱當用當歸地黃之類如大建
中藥令養勞雙和輩是也 然有痰飲停積之人則
難用此蓋當歸地黃與痰飲不得其宜反傷胃氣因

是不進飲食遂成真病至於不救者多矣 痰飲中
積致生寒熱者宜以二陳湯參蘇飲等藥療之應手
有效 更或有服退熱冷藥太過因而咳嗽下利發
熱自汗皆不可用之惟真武湯增損名固陽湯仍以
震靈丹服之病輕者可療重者當別求治法

錢氏地骨皮散

秦艽鱉甲柴胡甘草湯

秦艽青蒿烏梅甘草湯