

第三卷

肩疽鼠疽圖說方二

三串毒圖說

脾癰圖說

左搭肩發圖

右搭肩發圖說方四

左右串說圖

兩肩兩脇癰疽發圖說

癰瘡圖說方三

血潰流注疽圖說方三

腎疽圖說方二

疔發圖說

腎癰圖說方三

委中毒圖說方二

陰蝕瘡圖說方十

腿遊風圖說方二

左右便毒圖說方二

又圖說

穿襠發圖說方五

女陰蝕瘡圖說方十

小腸流注圖說方三

冷漏濕毒流注圖說方二

紫疥瘡圖說方四

坐馬癰圖說方三

貼骨疽圖說方一

附骨癰圖說見上

臑毒症圖說方三

鶴膝風圖說方三

膝腿毒圖說方二

人面瘡圖說

臃疽骨槽疽圖說

脚手癰背圖說方

骨癭疽圖說

脚拐毒圖說

骨疽瘡圖說

跟疽圖說方一

鞋帶瘡圖說方二

血風瘡圖說方三

風疔瘡圖說方二

腎氣遊風圖說方二

裏外癰瘡圖說方五

飛遊毒圖說方

紅絲瘡圖說方二

楊梅瘡圖說方十八

癰瘡圖說方十

雀子班圖說方二

諸癰圖說方七

人麻風毒圖說方八

天泡瘡圖說方三

冷疳圖說方一

癰瘡圖說方九

眉疳瘡圖說方一

頰疳瘡圖說方一

赤遊丹圖說方二十一

鼻痔圖說方九

附痔漏症方五十二

醫經全書卷之三

宋燕山齊漢卿輯著

天都洪瞻巖
桐川陳友恭
仝校

圖論方

上府疔下鼠疔



此疔因怒氣上攻于心酒後房事下傷于腎宜服加味托裏散
桔梗 厚朴 白芷 人參 黃芪 當歸

宮桂

川芎

荆芥

黃芩

烏藥

防風

連翹

杏附

枳殼

天花粉

右水煎服

胸膈滿悶加陳皮砂仁

熱盛加小柴胡黃芩玄參

咳嗽加麥冬地骨五味杏仁桑皮

口乾煩燥加麥冬前胡乾葛烏梅

寒多加厚朴防風藿香再服黃凡丸通氣散仍貼玄武宮金絲膏

如膿由盡時服內補散三四貼

膿未盡時服排膿內托散

小便赤澀用五苓散加黃連燈心服之

其毒從小便中出

更服乳香護心散日進五服

又服黃凡丸日進三服

開胃散

治發背寒氣人胃不欲飲食

砂仁

枳殼

陳皮

茯苓

肉桂


甘草

三

厚木

右水前脈

仍用神異膏貼之



此症上下生之其形雖一而中間皮好但內肉潰爛初起紅色亦
不大痛日漸潰爛此症之來六氣七情所感嚴寒酷暑所遇積毒
于臟腑或年老男婦性度怡默而亦患此者想平居坐臥濕地而
然也若無外症得生若飲食日減泄瀉發熱勢難生矣
治法與發背諸癰同

腎俞怒發及脾癰



此症下腎俞發因飲熱酒行房怒氣傷肝受濕而得也陽發于
 外可治痰發陰發傷于腎膜膿補者爲虛難治若老少婦人性氣
 溫和飲食謹節又無六情惱懷而亦患此者乃受地之濕氣或暑
 月以冷水沐浴而然脾癰發于左膊之間初發可用艾火灸之急
 服追疔湯汗之卽散治法服藥同前蠟丸尤甚宜服之

右髮

右髮



此症少陽經少血有相火尤甚于厥陰發于左搭肩骨上生者以
動之處人可治難安串于右搭肩者必難治也此症由于風變之
來以脉斷之邪在表其症大小便如故飲食如常口能知味知其
不在裏也不惡風只燥熱脉不浮知不在表若表裏既和則邪在
經絡中凝于經絡其癰斯出身半已上風從受之故云八風之變
法當却寒邪調和經絡中氣血則氣血通暢自愈

搽藥

雞黃皮

倍

血竭

花蕊石

冰片

石爲細末濕用乾搽乾用清油調搽

加味麻黃桂枝湯

形實色黑背生經腫脾

骨下通脉浮數而微緊

食則嘔

生附子錢 瓜蒌仁一錢 羌活一錢 甘草節六分 人參一錢 青皮一錢

黃芪二錢 半夏六分 白朮一錢 山藥一錢

水二鍾 姜三片 照服 冬天加黃栢

牛膠飲 截癰疽惡瘡險處服之使毒氣不攻于內不傳惡症

牛皮膠透明好者 右用好酒一碗入膠內重湯煮令膠溶透者亦

用酒煎米湯調和服之

白芷升麻湯

白芷一錢 升麻五分 桔梗 甘草一兩 生地二兩 黃芩二錢

黃芪 連翹各二錢 紅花一錢 歸稍二錢 官桂三分 當歸一錢

生黃連一錢 右十三味水酒各一碗煎至半碗服之須臾


并怡養心神不可妄想以動心火

左右串



此症發于左搭肩骨上生在移動之處可治難安串在右搭肩必
 難治矣可用雞黃皮及綿絮焙乾爲末濕則乾滲乾則清油調
 如症發于右搭肩骨上生在動移之處可治難安串在左搭肩者
 亦難治之用藥擦搽依前左搭肩藥治之
 另有良方在前左串右串二形圖後看方治之

兩肩兩脇癰疽發



凡兩肩下兩脇邊成癰疽因血虛而氣亦虛切不可服補陽之藥
 熱劑即補陽也倘受熱劑則虛熱愈盛易致傷骨膜切慎切慎宜
 服七六味流氣飲內疎苗運湯治法與發背癰疽同
 湯劑附子薄桂烏頭之類禁用

血潰流注疽



此症多生膏梁形重之人有此症者好食煎炒炙煿糖蜜之類其
疽大者如雞子形像猶如柴李只腫不紅內串經絡之間流注骨
節之內遍身痠疼百節疼痛用內托散加木瓜一白芍連翹
再服乳香護心散黃芩丸外用圍藥敷之不可遲也
凡用藥以意消息切勿執方對症夫子曰疾固也

痲瘋



此病屬陰多生骨骼之間初生如梅子大在于皮肉之間內不疼
不痒無力之人二十日始作紅腫有方人一月八作紅腫內生潰
爛皮面上紫黑色破後口不能收時常作痛出臭膿水必成其漏
則難治也急服排膿托裏散

排膿內補散

人參內補散

人參膏

五香連翹湯

蠟凡丸

護心散

更用猪蹄湯頻洗之

未潰之先用鐵箍散敷之能消其一半

癰瘡



大抵下部之症以蒼朮爲主佐以黃柏之辛行以青皮加以甘草
墮症用引經之劑則得効矣此毒受在肝腎
痛不可忍用內托
流氣飲治之

蒼木

黃柏

青皮

甘草

芍藥

當歸

白木

枳柳

川芎

羌活

獨活

白芷

木瓜

牛膝

杜仲

冬加薄桂

夏加黃芩

姜三片煎服

內托清氣飲

人參

茯苓

白朮

官桂

陳皮

木瓜

紫蘇

枳殼

甘草

芍藥

當歸

蒼朮

羌活

獨活

川芎

白芷

姜三片棗

枳煎服

再服紫蘇流氣飲

三香和氣飲

搽藥用腿遊風及婦人癰瘡藥通用