

欽定四庫全書

子部

仁齋傷寒類書卷五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書卷五

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

懊懷
懷平仄
兩音

懊懷心堅用陷胃

舌間胎白豉梔供

發黃須與茵陳草

燥糞陽明承氣攻

懊懷者懊惱鬱悶之狀蓋由表証誤下正氣內虛於

是客氣乘虛入而動腸煩鬱微疼特未至結胃之甚

也由懊懷而結胃亦不難矣

○短氣煩燥胃中懊懷心下困鞭則為結胃用陷胃湯○舌上白胎虛煩不得眠心下懊懷或飢不能食頭汗出此邪熱鬱於胃中也並梔子豉湯吐之○陽明病下之後懊懷而煩胃中有燥糞此熱結於胃也承氣湯攻之○陽明無汗小便不利心中懊懷者必發黃用茵陳湯是則胃中邪熱前後二部俱泄之也

痞

痞滿關沉痛不侵

關浮肝熱用連苓

惡寒勿下先投桂

痞利餘糧及瀉心

當汗誤下或病屬陰而反下之輕則為痞其狀心下
滿而不痛按之則濡是其虛邪留滯故但滿而不痛
也通用枳殼桔梗最良若欲攻之亦須表証已解則
可矣

○痞滿關脉多沉枳實理中丸半夏瀉心湯主之桔
梗枳殼湯尤妙○關脉浮而痞此為肝熱用三黃湯

瀉其肝若或惡寒汗出三黃湯加附子名附子瀉心
湯服湯後痞不去煩渴小便不利五苓散主之○下
後復汗心下痞而惡寒者表未解不可攻痞當先
與桂枝湯表解乃可攻痞用三黃湯表未解而心下
妨悶曰支結用柴胡桂枝湯胃脘滿而微結小柴胡
加乾薑牡蠣湯表証在數下之協熱而利心下痞鞭
表裏俱病桂枝人參湯○下利心下痞鞭乾噎食臭
腹鳴甘草瀉心湯生薑瀉心湯証治論用桂枝人參

湯若利不止則治下焦用赤石脂禹餘糧湯又不止
即利小使用五苓散○發熱汗出不解嘔吐下利心
中痞鞭用大柴胡湯下之此太陽証○吐汗下後噯
氣痞鞭旋覆代赭湯若咳逆氣虛則先用四逆湯胃
寒則先用理中丸後用旋覆代赭湯若虛煩心下痞
薄氣上衝胃頭眩經脈動身振搖伏苓桂枝白朮甘
草湯○十棗湯証須是身涼表解脇疼而痞則可用

結胃

結胃痛硬滿其中

大小隨名用陷胃

熱實多煩寒不熱

水兼浮脉豈容攻

凡病發於陽而下之早或當汗而誤下外証項強心
下滿硬而痛者結胃也結胃痛硬是為實邪在裏法
當下之若脉浮大若表証若水氣戒不可下亦有不
經下劑而心下鞭滿者此又有可吐可下不同焉經
曰病人手足厥脉乍緊邪結胃中心滿而煩飢不入
食當吐之是則病在胃中故也經曰陽明病心下鞭

滿不可下下之遂利不止而死是則邪氣自表傳重
留於心下未全為實法當吐之故有此戒也審如是
則經所謂高者因而越之是爾吐下界限判然天壤
安可以結胃裏實例論之乎要之結胃治法大要審
其邪氣所在而已矣或曰結胃証具加煩燥而不治
者何此胃氣絕也胃氣既絕安能布藥力以勝邪也
哉○凡病在胃膈者上皖澎湃痰壅氣促粥藥不能
下咽

○結胃寸脉浮關尺皆沉或沉緊俱當下若脉浮大
或有表証則先用小柴胡湯表已解即下之○大結
胃不按而痛胃連臍腹痛硬不可近大陷胃湯陷胃
湯太峻合用者只與陷胃丸○小結胃按之而痛只
心下硬用小陷胃湯○熱實結胃懊懷煩渴心下痛
少與大陷胃湯○寒實結胃無熱証三物白散枳實
理中湯丸○水結胃心下怔忡頭汗出無大熱小半
夏加伏苓湯小柴胡去棗加干礪湯○臍結亦是結

胃一種但舌上胎滑時時下利陰筋引痛有本條○
病人血結胃此熱入血室見譌語條下膿血條○結
胃先理其氣用桔梗枳殼湯枳實理中湯渴者加括
萸根證治論諸藥不愈用增損理中丸凡結胃理氣
已平旋腹大便澁者須利導之否則熱邪結為塊血
○誤下後未成結胃急與理中湯救解○陰毒陽毒
隨氣逆上伏於胃中亦有結胃痛硬之證治法詳見

本條

氣短

氣短裏實熱來潮

風濕溲難汗自流

停水心間并裏水

太陽誤下結胃痞

氣短者呼吸短促而不能相續是也其間呼多吸少
皆不救焉千金曰少氣不足以息者危金匱曰短氣
不足以息者實大抵短氣為實亦有表裏虛實之差
心腹脹滿而短氣者邪在裏而為實也心腹濡滿而
短氣者邪在表而為虛也其或怔忡氣短此則心下

停水致之體認不精其差千里信矣哉○氣短潮熱
腹滿而喘此為外欲解而裏實小承氣湯大柴胡湯
○風濕相搏汗出短氣小便不利惡風不欲去衣其
邪在表甘草附子湯○食少飲多水停心下亦令氣
短小半夏湯○身涼乾嘔短氣汗出不惡寒此表解
而裏有水十棗湯○誤下太陽短氣煩燥心中懊懷
因鞭硬為結胃大陷胃湯丸

更發黃
一證

喘

喘不熱熱解表家

汗多潮熱裏攻邪

滿胃合病尤須汗

水嗽青龍杏去麻

內經云肺氣實則喘逆上氣所以氣逆者邪氣為實
耳傷寒發喘邪氣在表者心腹濡而不堅外證無汗
法當汗之邪氣在裏者心腹脹而為滿外證有汗法
當下之又有水氣作喘心下怔忡即水為邪是以有
小青龍之證若經汗下逐水不獲痊愈喘促上攻壅
塞而不得息可以瓜蒂散從權吐之吁喘特病之常

也其或直視譫語而喘汗出髮潤而喘身汗如油而喘皆不可救此邪氣內盛而正氣欲絕也臨機對境盍消息焉○麻黃寧主喘喘家湯劑多用麻黃

○太陽證無汗而喘麻黃湯或誤下之利不止脉促有汗而喘葛根黃芩黃連湯下之微喘者桂枝加厚朴杏子湯發汗後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草石膏湯○陽明證汗出不惡寒氣短腹滿潮熱而喘小承氣湯若脉浮無汗而喘

即汗之用麻黃湯○太陽陽明合病喘而胃滿勿下
可麻黃湯○水氣嗽喘乃太陽汗後飲水多而水停
心下小青龍去麻黃加杏仁主之小腹滿者小青龍
去麻黃加茯苓○陰證喘則必促脉伏而厥返陰丹
五味子湯○鼻息鳴喘氣逆上衝孫用和用麻黃湯
加吉皮杏子久喘咳嗽感冒鼻涕易簡九寶湯

咳嗽

嗽家嘔喘屬膀胱

寒熱胃堅值少陽

若是少陰頻下利

四肢沉重更清涼

凡肺主氣氣逆而不下則嗽熱邪乘之氣則燥鬱寒邪乘之氣則冷滯水飲乘之又與氣搏熱寒水飲皆生痰壅嗽之所從始乎陰陽治法固自有條其間水生痰壅嗽之所從始乎陰陽治法固自有條其間水咳三證不可無辨小青龍湯太陽之表水也十棗湯太陽之裏水也真武湯陰證之水氣也常須識之雖然古人一藥對一病所主安在哉曰水與表寒相合而咳則小青龍法之水與裏寒相合而咳則真武湯