

透關射一

向外爲射甲。主驚風惡症受驚傳於經絡風熱發生十死一生。



勾脉


主傷寒



男左手


女右手

斗肘圖



腳穴圖

男右脚
女左脚



懷娠之後。必須飲食有常。起居自若。使神全氣和。則胎常安。生子必偉。最忌食熱毒等物。庶生兒免有臍突瘡癰。

初誕

嬰兒在胎。必藉胎液以滋養之。初離母體。口有液毒。啼聲未出。急用軟綿裹大人指拭。兒口中惡汁。得免痘瘡之患。或有時氣侵染。只出膚瘡。易爲調理。

回氣

俗謂草迷

初生氣欲絕。不能啼者。必是難產。或冒寒所致。急以綿絮包裹。抱懷中。未可斷臍。且將胞衣置炭火爐中燒之。仍作

大紙捻蘸清油點着，於臍帶上往來遍燎之。蓋臍帶得火氣由臍入腹更以熱醋湯洗臍帶。湏臾氣回啼聲如常方可浴洗畢。斷臍帶。

便結

小兒初生，大小便不通，腹脹欲絕者，急令大人以溫水漱了口，吸咂兒前後心，并臍下手足心共七處，每處咂三五次，每次要漱口，以紅赤爲度，湏臾自通。

浴兒

浴兒用猪膽一枚投湯中，免生瘡疥。浴時看湯冷熱無全兒驚而成疾也。

斷擠

斷臍不可用刀剪。湏隔單衣咬斷。後將暖氣呵七遍。纏結所留臍帶。令至兒足跗上。當留六寸。長則傷。肌短則中。寒令兒肚中不調。或成內吊。若先斷後浴。恐水入臍中。令兒腹痛。斷訖連臍帶中。多有虫者。宜急剔去。不然虫自入。腹成疾。斷臍之後。宜用熟艾厚裹。包用白綿。若浴兒。將水入臍中。或尿在裙包之內。濕氣傷臍。或解脱裙。包爲風冷邪氣所侵。皆令兒臍腫。多啼。不乳。卽成臍風。

臍風

兒初生六七日。患臍風。百無一活。用青絹裹大人指蘸溫

水於兒上下牙根上。將如粟米大紅泡子。拭破即愈。

剃頭

小兒月滿剃頭湏就溫煖避風處。剃後以杏仁三枚去皮尖研碎。入薄荷三葉同研。却入生麻油三四滴。膩粉拌和頭上拭以避風傷。免生瘡疥熱毒。

護養

小兒脾胃嫩弱。父母或以口物飼之。不能消化必致成疾。小兒於天氣和緩宜抱出日中嬉戲。頻見風日則血凝氣剛。肉堅可耐風寒。不致疾病。

抱小兒勿泣。恐淚入兒眼。令眼枯。

小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與喫卽止

小兒腹脹用韭菜根搗汁和猪脂煎服

小兒頭瘡用生芝麻口中嚼爛塗之切忌不可搽藥
小兒患秋痢與棗食之良。或與柿餅食。

小兒宜以菊花爲枕則清頭目

小兒入夏令縫裏盛杏仁七箇去皮尖佩之聞雷聲不懼
小兒一期之內衣服宜以故帛故綿爲之用新太煖令肌肉緩弱蒸熱成病不可裹足覆頂致陽氣不出多發熱
小兒不宜食肉太早傷及脾胃免致重積疳積雞肉能生
肚蟲宜忌之非三歲以上勿食

卷之十一
恐三分寒喫七分飽多採胜少洗澡

小兒不可令就瓢及瓶飲水語言多訥

小兒勿令人祔廟中恐神精閃灼生怖畏

面色圖歌

額印堂山根

額紅大熱燥青色有肝風印堂青色見人驚火則紅山根
青隱隱驚遭是兩重若還斯處赤瀉燥定相攻

年壽

年上微微黃爲正色若乎更陷夭難禁急因痢疾黑危候霍

亂吐瀉黃色深

鼻準微黃赤白平深黃燥黑死難生人中短縮吐因痢唇
反黑候廻必傾。

正口

正口常紅號曰平燥乾脾熱積黃生白主失血黑繞口青
黑驚風盡死形。

承漿兩眉

承漿青色食時驚黃多吐逆痢紅形煩躁夜啼青色青
病眉紅死症真。

兩眼

白睛赤色有肝風若是黃時有積攻或見黑睛黃色現傷寒病症此其踪。

風池氣池兩頤。

風氣二池黃吐逆躁煩啼叫色鮮紅更有兩頤胚樣赤肺家客熱此非空。

兩太陽

太陽青色驚方始紅色赤淋萌孽起要知死症是何如青色從茲生入耳。

兩臉

兩臉黃爲痰實咽青色客忤紅風熱傷寒赤色紅主淋二

兩頤金匱風門

吐黃青色滯頤黃一色頰間兩目詳風門黑痴青驚水紋
青金匱主驚狂

辨小兒五色受病症

面色青者痛也色紅者熱也色黃者脾氣弱也色白者寒
也色黑者腎氣敗也

哭者病在肝也汗者主心笑者主脾而多痰啼者主肺有
風睂者主腎有虧

察色驗病生死訣

面上紫心氣絕五日死。面白目陷肝氣絕三日死。面黃四肢重。脾氣絕九日死。面白鼻入奇論。肺氣絕三日死。胸如黃熟豆。骨氣絕一日死。面白黑耳黃。呻吟腎氣絕四日死。口張唇青。毛枯肺絕五日死。大凡病兒足跗腫身重。大小便不禁。目無轉睛。皆死。若病將愈者。面白黃。目黃。有生意。

痢疾眉頭皺驚風面頰紅渴來唇帶赤。吐瀉面浮黃
熱甚眼瞼腫青色是驚風白色是泄瀉傷寒色紫紅

湯氏歌

山根若見脉橫青。此病明知兩度驚。亦黑因痰時吐瀉色
紅。帝夜不曾停。

青肺生於左太陽湏驚一度見推謀亦是傷寒微燥熱黑
青知是乳多傷

右邊赤脉不湏多有則頻驚怎柰何紅赤爲風抽眼目黑
沉三日見閻羅

指甲青兼黑暗多唇青惡逆病將瘥忽將鴉聲心氣急此
病端的命難過

蛔虫出口有三般口鼻中來大不堪如或白虫兼黑色此
病端的命難延

四肢瘡痛不爲祥下氣冲心兼滑腸氣喘汗流身不熱手
擎胸膈定遭殃

內八段鉢

紅淨爲安不用驚若逢紅黑便難寧更加紅亂青龍甚取
下風痰病立輕

赤色微輕是外驚若如米粒勢難輕紅散多因乘怒亂更
加搐搦實難平

小兒初誕月腹病兩眉顰號作盤腸泣時啼哭又呻吟急
宜施法行功作

小兒初誕日肌體瘦尪羸禿髮毛稀少元因是鬼胎。

外八段錦

先望孩兒眼色青次看背上冷如冰陽男搞左無防事搞

右令人甚可驚。

女搐右邊猶可治。若逢搐左疾非輕至邪口眼終無害。縱有仙丹也莫平。

顙門腫起定爲風。此候應知是必凶。忽陷成坑如盞足未過七日命湏終。

鼻門青燥渴難禁。面黑唇青命莫存。肚大青筋俱惡候。更兼腹肚有青紋。

忽見眉間紫帶青。看來立便見風生。青紅碎襍風將起。必見痺癥膈氣形。

亂紋交錯紫兼青。急急求醫免命傾。盛紫再加身體熱湏。