

婦科要書

梅花 點香 丹記 火梅 片記

# 女科要略

各附產寶

韓廷臣讀

光緒癸未孟秋  
江西書局開雋

韓園居士輯女科要略付之剞劂而屬余校其  
字且曰婦人之病與男子俱同惟經之前後與  
胎產之前後則治法有別此編取傳青主徐靈  
胎陳修園及越中錢氏祕方諸書擇其用藥精  
審諸名家意義相符者一以經驗爲準無取多  
也略而已非云備也要而已今與倪鳳賓產寶  
合刻之俾閨房中各置一編隨時瀏覽開卷瞭  
然適遇有症可免煩亂延醫雜投方藥之弊矣



余因書其語以爲緣起云光緒丁丑六月朔壺  
園寓客識

女科要略目錄

調經一

安胎二

臨產三

產後四

女科要略

韓園居士增輯

調經

婦人一科專以月事爲主。經水一月一至不愆其期。故名月信。古人以月經名爲月信。不止命名確切。而月事之有無多少遲速。及一切治療之原委。無不包括於信字之中。夫五行之土。猶五常之信也。脾爲陰土。胃爲陽土。而皆屬信。信

經三篇

女科要略

則以時而下。不愆其期。雖曰心生血。肝藏血。衝  
任督三脈俱爲血海。爲月信之原。而其統主則  
唯脾胃。脾胃和則血自生。謂血生於水穀之精  
氣也。若經血之來。前後多少有無不一。謂之不  
調。不調則爲失信矣。經云。土太過則敦阜。阜者  
高也。敦者厚也。旣高而又厚。則令除去。宜用平  
胃散。加大黃。白芍藥。枳實。桃仁之類。經又云。土  
不及則卑監。卑者下也。監者陷也。坑也。旣下而



又陷坑則令培補宜六君子湯加芍歸柴芍及  
歸脾湯之類此言經水不調以虛實分之也又  
有以陰陽偏勝分之者許叔微云婦人病多是  
月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例  
呼爲經病不辨陰勝陽勝陰勝所以服藥少效  
蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天  
寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後或斷絕  
若陽氣乘陰則血氣散溢經所謂天暑地熱經

水沸騰故令乍多而在月前

或一月數下當別

其陰陽調其氣血使不相乖以平爲期此叔微

統論陰陽之道也而余則以陰陽二字專指脾

胃而言蓋脾者太陰之濕土也不得陽明燥氣

以調之則寒濕盛而陰獨勝陰道常虛卽內經

卑監之旨也胃者陽明之燥土也不得太陰之

濕氣以調之則燥熱盛而陽獨勝陽道常實卽

內經敦阜之旨也至於用方以四物湯加香附

民國廿三

年七月十

七日

馬文則

茯神、炙草爲主。陰勝加乾薑、桂附、吳萸及桃仁、紅花之類。陽勝加知柏、芩連、續斷、門冬之類。平淺淺中亦不可廢。

李氏曰：婦人月水循環，纖疴不作而有子。若兼潮熱、腹痛，重則咳嗽、汗嘔，或瀉有潮熱，則血愈消耗，有汗、咳、嘔，則氣往上行，瀉則津偏于後，痛則積結于中，是以必先去病而後可以滋血調經。就中潮熱疼痛尤爲婦人常病，蓋血滯積入

骨髓便爲骨蒸血滯積瘀與日生新血相搏則  
爲疼痛血枯不能滋養百骸則蒸熱于內血枯  
胞絡火盛或挾氣食積寒冷則爲疼痛凡此諸  
病皆阻經候不調必先去其病而後可以調經  
也

方氏曰婦人經病有月候不調者有月候不通  
者然不調不通中有兼疼痛者有兼發熱者此  
分而爲四也細詳之不調中有趨前者有退後

者。趲前爲熱。退後爲虛。不通中有血枯者。有血  
滯者。血滯宜破。血枯宜補也。疼痛中有常時作  
痛者。有經前經後作痛者。常時與經前爲血積。  
經後爲血虛也。發熱中有常時發熱者。有經行  
發熱者。常時爲血虛有積。經行爲血虛而有熱。  
也是四者之中。又分爲八矣。人之血氣周流。忽  
有憂思忿怒。則鬱結不行。經前產後。忽遇飲冷  
形寒。則惡露不盡。此經候不調。不通作痛發熱。



所由作也。大抵氣行血行。氣止血止。故治血病以行氣爲先。香附之類是也。熱則流通。寒則凝塞。故治血病以熱藥爲佐。肉桂之類是也。

蕭慎齋曰。婦人有先病而後致經不調。當先治病。病去則經自調。若因經不行而後生病。當先調經。經調則病自除。李氏一論。可謂調經之要。然偏而不全。余故補其未盡之旨。若方氏分因詳症。誠得統論調經大法。

婦人經水不調多不能成孕宜先審其寒熱虛實及有無憂鬱以調其經如四物湯時人習用之妙在川芎一味陳脩園加入香附茯神各二錢爲佐是取鐵瓮道人之交感丸參贊其內交感者以氣之化於無形也又加炙甘草肆錢爲君是取仲景先生之復脈湯主持其際復脈者以血之運而不息也真變淺近爲神奇矣又有加減法經血先期而至加苓連知柏後期而至

加薑桂艾葉實者加陳皮枳實虛者加人參白  
朮大實而閉者加大黃枳實桃仁牛膝更佐以  
抵當湯桃仁承氣湯大虛而枯者加參朮鹿角  
膠牛膝外更佐以人參養榮湯經行而腹痛拒  
按者加延胡索木香經已行而腹痛者加人參  
白朮乾薑經水不通逆行而爲吐血衄血者加  
牛膝澤蘭莖汁童便若腹中素有痞飲食滿悶  
者除地黃加枳實半夏色紫者風也加荆防白

芷黑者熱甚也。加芩連丹皮地骨皮。淡白者虛也。有挾痰停水以混之。加參耆陳半。色如烟塵。水如屋漏水者。合二陳湯。再加防風秦艽蒼朮。如豆汁者。加芩連。或帶黃混濁者。濕痰也。或成塊作片。血不變者。氣滯也。加元胡枳實陳皮。色變紫黑者。屬熱者多。屬寒者亦有之。宜察脈審症。此外若惡寒發熱頭痛有汗。加桂枝薑棗無汗。加麻黃細辛之類。詳於海藏六合湯不贅。其