

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第四百二十七卷目錄

醫部全錄四百七

小兒初生諸疾門一

黃帝素問

孫思邈千金方

錢小兒重訂

張從政儒門事親

朱實亭心法

幼科全書

方賢奇效良方

萬氏秘傳

幼科秘傳

有嬰家秘

黃帝素問

小兒初生諸疾門一

醫部全錄四百七

黃帝素問

奇病論

帝曰人生而有病

曰病名胎病此得之在母腹中

氣上而不下

此女子胞之為病也

有所大驚則氣舉上而不

下



下夫精以養胎而精氣升居者也母受胎而氣上則子之精氣亦成合子結為胎也胎氣未固當作癰瘕嬰兒難多困母腹中受驚所致於癰疾者逆氣之所生也故因氣上而逆為癰瘕兆項日胎中受病時止驚癰瘕女子飲食起居大宜謹慎則生子聰俊無病長年

唐孫思邈千金方

小兒初生出腹時

小兒初生出腹時肉未斂肌肉者是血也血凝乃堅成肉肉其血沮散不成肌肉則使面目結鼻口左右悉而暗閉目緊口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者是血脈不斂也多有若如此者皆宜與

龍腦散也

兒生落地不作聲者取燈水一盞灌之須臾當啼兒生不作聲者此由難產氣少故也可取兒臍帶向身却掛之令氣入腹何阿之至百度啼聲自發亦可以

葱白徐徐釋之即啼

兒生十許日怒啼似哭中有刺者此或臍燥刺其臍當翼之身衣更裏仍以溫粉粉之若臍不愈燒粉

吊末粉之若過一月殊有汁不愈燒蝦蟆灰粉之日三四度若臍中水及中冷則令兒腹軟痛天乳啼呼

面目青黑此是中水之過當受粉粉以製之不時治

腫臍至腫者當隨輕重者便安之乃可至八九十

壯輕者將不壞但出汁時時啼呼者當歸末和

胡粉傳之或聚日變之至百日愈以啼呼止為候

至八九十壯者不可食宜食之

若兒黃者冷也與臍中水同

乳哺不進者腹中皆有痰積也當以四物藥丸服下

之粉餅乳數日便自愈小兒微寒熱亦當利之要

當下之然後乃痊

驚風

新生即病者是其五臟不斂故血氣不聚五臟不流

骨法不成也多有其一月四日已上至期歲

而病者亦由乳養失理血氣不和風邪所中也病先

身壯聖藥驚風啼喚而後發熱脈浮者為陽熱病在

六腑外在肌膚猶易治也病先身冷不驚聲不啼呼

而病發難治者為陰熱病在五臟內在骨髓難治也

初出腹血脈不斂五臟未成稍將髮失宜即為病也

胎不成人其經發熱之後有痰粉證難化中風最

甚卒也小兒四肢不舒驚風息小異欲作風及變

寒日滿不解者並宜與藥丸下之小兒始生生氣尚

凡小兒不能乳哺當與藥丸下之小兒始生生氣尚

盛但有微惡則須下之必無所損及其全病則致澤

益若不時下則成大疾疾成難治矣凡下四味藥丸

最善雖下不損人足以去其苦四味藥丸不得下者

當以赤丸下之赤丸不下當倍之若已下而無餘熱

不盡當按方作龍腦湯稍服之升麻亦善

風癰亦當下之然當以棉心湯下之驚風但被風吹

之及摩生青不可大下也何者驚風心氣不定下之

內虛益令甚驚驚甚者特為難治故驚小兒常慎

驚勿令開大驚抱持之間當安勿令驚小兒天雷

時當塞耳耳汗作條細髮以亂之也凡驚小兒皆微

驚以長其血氣但不微大驚大驚乃變驚者五六

驚

驚

驚

驚

驚

驚

驚

驚

驚

驚

雙燕吟

[illegible]

平者五日而長還者十日而愈矣先期五日後期五日爲十日之然然如嬰兒生十二月一歲二十九日先期而熱便治如法至三十六日一歲乃畢耳恐不解了故重述也且憂發一語不欲縱動勿令傍多人兒驚濤或臥或脫不如法者多又初變之時或熱甚者連日數不眠驚者變變五日當其困有微微愈驚強不可治及灸和之藥之若久熱不已少驚與九變下熱微便其若於變之中久於辨行已過與紫九變下熱微便其若於變之中久於辨行已過病或初變下而維持行者其變者相似惟耳及尻通熱口上無白泡當此眼眼微閉以發其汗出通

粉粒之熱當飲便就寢若猶不靜除乃與紫丸下之
兒嬰蒸肝若有寒加之卽寒熱交爭腹脹天乳啼不
止者覺之則愈也驚風法製之之燄蒸與溫壯傷寒相似
若非嬰身熱耳熱耳亦熱此乃爲他病可作他治也
審是燄蒸不得爲他治也

又法凡兒生至十一日始變髮者身熱也至十五
日再變髮且其髮狀欲踰趾上至十九六十二
定者候其髮出至二十十八日四變髮且三
以鬚髮也至二百六十日五變以成鬚鬣也至一
百九十二日六變鬚且鬚五綫成也至三百二十四
日七變以能開齒也至三百五十六日八變鬚且鬚
以初欲學語至五百八十九日九變以手舉其髮也
凡小兒生至三百八十八日九變四鬚也當其變之
日慎可多忌則加其髮鬚且鬚者是兒近迎月
也若有其髮鬚脫汗出者是也近者五日缺過者八
九日也也當髮落至不可從剃髮治之也
未幾小兒面直談

胎驚

小兒初生壯熱吐衄身體強直手足抽掣目反直視是胎驚風證也

按前證多因娘婦忿怒驚恐調攝乖常或挾外邪內傷於胎蓋母有所觸胎必感之常用豬乳膏拭兒口中或用惺惺散加蒲蘆令母煎服使藥通乳中兒病自愈矣

百日內發搐異者不過兩三次必死似者頻發不死
異者內生驚癇假者外傷風冷血氣未實不能勝任
故發搐口中氣熱用大青膏塗顙浴體二法

按前證多因胎中受患或乳母鬱怒傳兒或兒脾傷自病當固元氣爲主而兼治其母仍參吮乳不能類治之後俟此

雙蒸

兒在母腹中乃生香氣五臟六腑成而未全自生
後即長而脈息漸熱之智也後者易也二日內
氣變甚即智慧有異於前何也長生藏神智慧故也何
謂兩兩二十一日長骨添精神人有三百六十五骨除手
足四十五并脊外有三百一十數自生下第一寸按
良而度之十寸百度而三十二數自生下第一寸按
骨度如左 蓋骨之脩長一身隨分入髓中作三
節而齒牙不及三十二數者由變不足其常也
或二八曰長一二十八齒已下微此但不過則小
之數也凡一周遍乃生香氣諸病如是十週則小
之數也計六十日生香氣訖至年未壯也初初初
生髮生髮生髮六十四日再變生髮脫其

其耳與鼻皆帶膿液俱主於水水數故先變生
之其發汗出而微痛心爲火數二一百四日變生小
兒生疳矣一百九十二日變生體其發目閉
而赤汗主木木數三百一十四日七變生肺癆
百五十六日八變生大腸其發鼻熱而汗或不通
者金數金數三百八十八日變生脾疳此
十變生胃其發不食腹痛而吐乳此後乃齒生
能言其善怒故云齒全也夫倉氣入四肢長骨皆
髮後六十四日長其經脈手足受血故能持

酒麵致兒口舌生瘡用消胃散以清熱若作嘔少食泄瀉用白朮散以補脾若手足冷或腹痛惡寒用六君炮薑以溫中若因乳母飲食勞役失宜致兒發熱用補中益氣湯因乳母肝脾二經血虛內熱傳兒用加味逍遙散八珍湯因乳母肝脾鬱熱血傷內熱致兒為患用加味逍遙散加味歸脾湯俱加漏蘆子亦服數滴仍參前弄舌類凡針重舌以針直刺不可橫挑恐傷舌絡則言部不清胎黃

若百日或半年不因病而身黃者胃熱胎疸也若淡黃白者胃怯也
 若初生身黃壯熱不乳便硬此為胎熱用地黃湯若一便赤澀腹脹面赤飲水用茵陳湯調五苓散若清便自調四股並冷用益黃散淡黃白用調中丸

若患吐瀉或大便後雖有聲而不能言又能嘔物者非失音此胃怯不能上接于陽也當以地黃丸主之凡口噤不止則失音部選

按前證多因憂鬱不足蓋腎脈繫于舌本非地黃不能治故思此證者若初呵欠則嗽如未應須兼以補中益氣湯滋其化源若除火上炎肺金受傷而失音者亦治以前法保嬰集云小兒五六歲腎氣不足而不能言者用菖蒲丸口噤不能言者用地黃丸

行遲遲遲長大不行行則軟齒久不生則不固皆弱病也

按前證即五遲之證也蓋腎主骨齒者骨之餘也其由父母精血不足腎氣虛弱不能榮養而然耳有肝腎虛虛不能行者有肝氣虛手足拳攣者有肝腎虛虛不能行不能舒展者並用地黃丸滋補之有心氣虛虛不能言者用團參湯補中益氣湯培養之若久病或五疳所致者但調補脾胃為主全嬰方云頭項手足身軟謂之五軟證皆胎裏腎氣怯弱也元張從政儒門事親

夜啼
 夫小兒夜啼不止者當用燈花一枚研細龍乳汁下併三服則每服用燈花一枚服能此藥於淨室中臥一兩日即止也
 拋棄不止
 夫小兒拋棄不止或一二日或三四日乃邪祟之氣滲于心拋棄不止也有鍼經一法以絲絹帶縛手足說謂三經婦人爭墮禮臥小兒于其中不令傍人知而離之寢時則拋棄自止也

悲哭不止
 夫小兒悲哭彌日不休兩手脈弦而緊戴人曰心火甚而乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云心火熾則痛甚故哭甚悲亦甚今治以溫湯清形以爲汗也助主皮毛汗出則肺熱散矣冷止而啼亦止仍命服涼膈散加當歸桂梗以竹葉生薑朴硝同煎服瀉胸中之邪熱

小兒驚風
 凡小兒三五歲或七八歲至十餘歲驚風遲潮潮病

如銘撰不肖人事日增暗急將欲死者內經曰此者得之在母胎胞之所受悸悸驚悸恐懼之氣故令小兒經者爲驚風天中車者爲癇病風濕胎中積熱者爲諸風已上諸風證可用吐涎散吐之吐涎宜珠犀龍膽清涼聖藥之藥其食乳子母皆宜服之安魂定魄之藥定志丸之類是也故婦人懷孕之月大忌悲憂驚悸驚悸得子必有前疾小兒風熱誕後者可以通聖加半夏同煎服服

小兒驚
 乳下小兒常多濕熱食積痰熱傷乳為病大概肝與脾兩多
 小兒易怒肝病最多大人亦怒肝只是有餘肝只是不足
 小兒夜啼此是邪熱乘心
 小兒夜啼小兒驚冷也陰盛于後則冷動則驚陰極發寒盛在表所以夜啼而不歇
 小兒變蒸是胎毒散也
 幼科全書

胎疾
 凡小兒在月內有病者皆胎疾也並治其母小兒月內胎病甚驚氣血未充若有微疾不可妄服補湯恐傷胎氣胎氣一傷則胎息于身身或至天命可不成故如不得已而用湯丸母代天和中病即止又不可過劑也乳母服藥必別理乳母乳之而後可哺可氣也若母身自乳則不可亂投湯藥蓋產後之婦氣血甚虛有補無竭虧兒有熱而用涼藥則產後之變

必害其母如有溫補則反助小兒之熱又害其子歸者人之司命偏害之事而可安為乎必須斟酌謹慎勿損陰也

凡小兒生下就死者急看兒口中應塞而露上必有泡養住即以手指摘破其泡通用軟棉拭令血津若血入喉即死

萬氏曰兒生十日之內常抱向明處視其口中為要

凡小兒初生下驚絕不能啼者必因難產或因胃呆所致急以綿絮包裹于懷中未可輕斷臍帶却將包衣置鍋中向炭上以水煮之又作大油往點著往來于臍帶上下摩之須臾熱氣由臍入腹便能啼哭方可洗浴却斷臍帶若不如此急救便斷臍帶者多死不治

萬氏曰俗名問臍生即猶生鄉俗有連呼其父乳名即醒者

凡小兒初出胎時被風寒所吹鼻塞服藥不得者用天南星為末生薑自然汁調成膏貼臍門上白愈

萬氏自製貼臍法加北細辛蔥汁更好

凡小兒生後或月內或百日痰多氣喘目閉尿赤尿濁困久欠通身壯熱小便赤澀大便不通時復驚煩此胎熱也因母平日恣食辛辣熱食熾熱而致以涼驚丸黃連解毒湯治之
凡小兒生後覺口中冷腹痛腸鳴泄瀉昏昏不醒或夜啼此胎寒也因母喜寒生冷或有外感風寒涼藥致傷胎氣以理中丸勻氣散治之
凡小兒生下洋腫通身紅色滿月以後漸漸瘦弱五

心煩熱此各胎氣又有生下而無精光身無血色日無精氣肌肉瘦弱者此胎性寒宜內服八物湯而外用浴露法

凡小兒生下通身面目皆青狀如金龜身上壯熱大便不通小便如梔子汁乳食不思此胎黃也因母受熱而傳于胎以地黃湯治之

凡小兒生下壯熱昏睡服藥不效口直目迷漸至熱目閉面黃此胎驚也因母受驚跌撲以致驚胎視其目間氣色赤而鮮者可治若黑暗者不可治以至要保命丹金銀燈心湯下

凡小兒生下大小便三五日不通者此名鎖肚胎中受熱熱毒凝結于肛門閉而不通無復滋潤急令婦人以溫水漱口吸吮兒前腹心并臍下手足心共七處凡四五次再用輕粉五分蜜少許溫水化開時時少許服之以通為度如更不通即是肛門內合或以金簪透而通之須刺入二十許以香油和蜜納入孔中費出為快也若肚脹孔作呻吟聲至于一七難可望生

凡小兒初生時即不吃乳者此由拭口不淨惡穢入腹致令腹滿氣不能吃或有吐乳乳不竭下或胎中受寒令兒腹滿亦不吃乳此則多啼但白香散治之

脾風

脾風者由斷乳之便或太濕風命之氣所乘而流入心脾連合腹脹脾腫四肢強直日夜多啼不能吮乳甚則發為風搐不辨言語數日不開者是為內搐不治凡中風者即死

撮口

撮口者由胎氣未熱寒之風氣入臍流入心脾二經故令舌強唇青口撮端急啼聲不出不乳若口出白沫而四肢冷者不治撮口最為急候一服之內見之尤其

喉風

喉風者喉閉口噤喘聲漸少吮乳不得口吐白沫大便皆不通亦由胎中受熱熱毒流入心脾故形見此上三證其名雖異受病之源則一初生七日得此恐者多不可治若不急救坐以待死良可惜焉但見小兒咽喉多啼身熱不乳急看小兒上唇有小泡如粟米大成以指甲刮之或耳經輕刮之以稍鬆手指懸溫水拭淨其血勿令下咽便安不必服藥誠良法也

如兒才開緊急已成撮口驚搐者先用撮風散以開其關大用撮風散以吐其痰或用金銀散以和其胃保命丹貼臍即愈若手足攣來口噤不開者不治亦有熱在胃經脾經無形呢呢作聲努眼其氣以致臍突浮腫此非斷臍使之然也但散其熱自愈如減龍腦湯下之

亦有肚脹黃筋中腸脾疳內氣引痛而聚口者皆腸胃鬱結不通致之治法實平疏利紫霜凡量而與之一粒金丹升妙

西江月

胎黃狀如金身熱大便難通小便黃赤色深難少乳時時吞并此證傳來母毒每胎均過無相及涼經涼

觀諸變態熱作驚風須見日角左邊眉間脈紅是也大凡初生兒一條長一分在眉上者經自日角垂至眉上者重變驚發熱見一條紅者兩三次蒸熱在內不解脈紅帶又因驚而蒸脈青變蒸多次青在左太陽因傷風而蒸自額門青生眉之上因驚而蒸三歲皆青三證皆見若及三十一歲者變蒸足也萬氏秘傳片玉心書

初生諸疾胎毒
初生三五日大便血書來黑色為胎毒紅實可哀初生便嘔吐胎毒並胃中物盡吐自止不止便為因小兒初生十日內少乳多啼常噴嚏急看喉中有珠泡手注刮去免憂毒
胎毒微腫眼微腫少通急用解毒散便下得從容便閉肚膨脹口緊咬唇青時手足掣騰風杜用心腹肢不便名銀肚口緊不乳是噤風目視叫哭盤腸釣天釣身仰似角弓初生牙兒有此病父母歡喜一掃空

變蒸休用藥三日自然安外感驚風散傷食保和丸胎毒甘草黃連湯胎毒去連加桂方胎毒甘草加茵陳胎驚辰砂一味良胎瘦胎肥浴體注胎性五軟用地黃此是來傳其口誤兒孫記誦莫遺忘

肝色多青心赤紅脾黃肺白腎黑同黃白疳虛風中惡赤紅是熱青驚風

諸遲者出在胎之時母受驚邪之氣氣心兒兒母氣心神不定不能安古故而諸遲者九之受胎母即有驚邪二氣氣心若本加驚諸伏神變遠志麥冬當歸乳香砂蜜丸大吞干黃荷渴下語

五入司事長文

運產

夜啼之證有四驚啼熱煩啼腹痛啼神不安啼驚啼者邪乘于心也當安心以導赤散加燈心退心熱以安神丸定心效

熱煩啼者其氣無從生燈則喜而以導赤散加麥冬梔子仁治之

腹痛啼者藏冷而痛也面青而無光以溫中藥調理中九益黃散治之

神不安啼者睡中忽驚自哭以安神丸燈心燭灰調湯吞服

又有拂其性而抱哭者要審明白不可妄投湯丸祖傳治夜啼以至驚悸命用燈心灰調湯下甚效

小兒夜啼四證皆驚肚痛如蓬物矢行未言睡中忽啼驚見肚痛手足厥冷腰曲口氣冰寒心熱煩躁不安服其證面赤腹緩

既解夜啼證候其間治法須分明傳授與人問只得心誠求通件驚安神丸于理中專治脾痛涼驚錠子治心煩總用燈花妙散

啼哭直視熱在肝湯青一服即靜安啼哭面赤熱在

心導赤麥冬效如神

面赤而逆腹中痛發黃散用薑湯送夜夜見驚多動

哭父母母驚多不足

幼科珍撰

胎疾

小兒初生至周歲者皆為胎疾

氣陽也血陰也人之有生受氣于父陽之變也成形于母陰之合也陰陽變合而成其身身少中形臟四

子母陰之合也陰陽變合而成其身身少中形臟四

子母陰之合也陰陽變合而成其身身少中形臟四

子母陰之合也陰陽變合而成其身身少中形臟四

子母陰之合也陰陽變合而成其身身少中形臟四

子母陰之合也陰陽變合而成其身身少中形臟四

子母陰之合也陰陽變合而成其身身少中形臟四

子母陰之合也陰陽變合而成其身身少中形臟四

子母陰之合也陰陽變合而成其身身少中形臟四

頭面一也耳目口鼻一也手足二也皮肉筋骨四也

神氣五心藏神肝藏魂脾藏意肺藏魄腎藏志是也

凡五臟者皆父母一體而分者也形拘于一偏而無

能相運者陰之靜也神隨感而動者陽之動也兒之

初生只是一塊血肉耳雖有形而無所用者有五臟

而無其神神隨感而動者陽之動也兒之初生只是一塊

血肉耳雖有形而無所用者有五臟而無其神神隨感而

動者陽之動也兒之初生只是一塊血肉耳雖有形而無

所用者有五臟而無其神神隨感而動者陽之動也兒之

初生只是一塊血肉耳雖有形而無所用者有五臟而無

其神神隨感而動者陽之動也兒之初生只是一塊血肉

耳雖有形而無所用者有五臟而無其神神隨感而動者

陽之動也兒之初生只是一塊血肉耳雖有形而無所用

者有五臟而無其神神隨感而動者陽之動也兒之初生

只是一塊血肉耳雖有形而無所用者有五臟而無其神

神隨感而動者陽之動也兒之初生只是一塊血肉耳雖

有形而無所用者有五臟而無其神神隨感而動者陽之

動也兒之初生只是一塊血肉耳雖有形而無所用者有

五臟而無其神神隨感而動者陽之動也兒之初生只是

一塊血肉耳雖有形而無所用者有五臟而無其神神隨

感而動者陽之動也兒之初生只是一塊血肉耳雖有形

而無所用者有五臟而無其神神隨感而動者陽之動也

兒之初生只是一塊血肉耳雖有形而無所用者有五臟

而無其神神隨感而動者陽之動也兒之初生只是一塊

四集

第四五七期

之

四集

第四五七期

之

四集

第四五七期

之

四集

第四五七期

之

四集

第四五七期

之

四集

第四五七期

之

四集

第四五七期

之

四集

第四五七期

之

而專論腎何也曰太陽初分天一生水精血妙合先生而腎者五臟之根本也經云種木者必培其根此之謂也

胎毒

初生月內非胎風毒發者此胎毒也宜至聖保命丹金銀散水送下或用全蠍一枚薄荷葉包炙為末碾砂末三分和勻豬乳調五粒許如常發者名胎瘤不可治也

胎風

治未病發在兩兒之間任衝胃三脈之所係也兒之初生斷胎毒不可不慎故斷胎之時隔衣咬斷者上也以火燎而斷之天也以剪斷之以火烙之又其次也護胎之法胎既斷矣用軟布纏裹待乾自落勿使犯去也二劑洗兒當護其膝勿使水漬入也勝落之後當抱包切勿使床溫涼及膝中也如此護則無勝落之病所謂上工治未病十得十也

治初病生者旬日之內胎風為惡病也凡覺小兒噴嚏多啼此胎風發之候急抱兒向明處當響口口中上驚者如珠如米成聚此病根也其色白者初起也黃者久也可用銀空耳輕手到出前甘黃薄荷湯拭之須取粟白皮十塗之自此日日晚七有即去之不可因循以貽後禍所謂中工治初病十全七也

治已病不知保護未病之先不知調護于初病之日其患已入中變為一證一日撮口二日噤風三日無胎毒不問皆胎風也撮口證兒多啼口頻撮者此胎風痛也可用雄黃解毒丸加乳香沒藥各

五分丸如黍米大每服五丸竹瀝生薑自然汁送下利去惡溫良外用新艾炒熟研爛其勝換便溫緩之氣不絕也不乳者不治

陰風毒牙關緊不能吮乳喘聲不出發搐者不治鎖針證驚青腫肌腹脹大青筋浮露大便澀不通者不治

或問胎風三證古人有方何謂不治乎曰一服之內謂初生八日草木方萌稍有病犯即便折每經曰根于中者命曰神機神去則機息故胎風者乳食不得入則機廢于上矣蓋壯者便溺不得出則機廢于下矣所謂出入廢則神機倉滅者是也神出機息雖有神丹不可為也豈緩給緩錄諸毒藥之可治耶

變蒸

變蒸非病也乃兒生長之次第也兒生之後凡二十日一變則發熱昏睡不乳似病非病也恐人不知誤疑為熱而汗下之誤謂太過也曰大惑或誤以變蒸得于胎病者或曰兒之生也初無變蒸既生之後當以二十日一變至下三百八十四日之後又無變者何也曰初無變蒸者諸用陰之聞也中有變者諸謂仁陽之聞也終無變者陰陽固閉之候成也故不復蒸也故兒之初生者其皮肉則未實也諸其筋骨則未堅也諸其腸胃則氣未充也諸其神智則未開發也只是一塊血肉耳至于三百八十四日然後臟腑氣足經絡滋液飲食漸進以漸而合方成人也

或曰變蒸之必以三十日者何也曰易傳六生之謂易易者變易也不變不易不足以見天地生

物之心人有五臟六腑以配手足十二經絡腎屬陽以配陽耳三十二脈屬陰以配陰耳三十二取其一藏一腑各以三十二一小變六十四日一大變陽卦之又一百九十二陰卦之又一百九十二合六十四日凡三百八十四爻所以變蒸一卦之日三百八十四以應六十四卦之數也或曰二十二日一小變六十四日一大變所生者何物也所生之物亦有說歟曰形既生矣復何生也所生者五臟之知覺運動也故初生三十日一變生足少陰水水之精也二日一變生足太陽膀胱精水而腎之臟一證成矣此天一生水矣水之精為髓于此後始能

認人矣九六三三三變生少少陰心火一百二十八日四變生手太陽小腸百火而心與小腸一藏一證之氣足矣此地一生火也火之精為神此後能笑也一變六十日五變生足厥陰肝乙木一百九十二日六變生足少陽膽甲木而肝與膽一藏一證受

氣足而神合矣此天一生木也木之精為筋此後能坐矣一百二十四日七變生手太陽肺辛金二百五十八日八變生手陽明大腸庚金而肺與大腸一藏一證之氣足矣此地四生金也金之精為骨此後始能習人語矣二百八十八日九變生足太陽脾己土一證之氣足矣此天五生土也土之精為肉而脾胃主

四肢此後能飽飽矣三百五十二日一變生手厥陰心包絡三百八十四日十一變生手少陽三焦三焦配腎主骨此後能坐能立能行矣變蒸已足而形神俱全此正知覺之根不如是不足成人

生配腎主骨此後能坐能立能行矣變蒸已足而形神俱全此正知覺之根不如是不足成人

生配腎主骨此後能坐能立能行矣變蒸已足而形神俱全此正知覺之根不如是不足成人

生配腎主骨此後能坐能立能行矣變蒸已足而形神俱全此正知覺之根不如是不足成人

生配腎主骨此後能坐能立能行矣變蒸已足而形神俱全此正知覺之根不如是不足成人

生配腎主骨此後能坐能立能行矣變蒸已足而形神俱全此正知覺之根不如是不足成人

生配腎主骨此後能坐能立能行矣變蒸已足而形神俱全此正知覺之根不如是不足成人

矣凡一變之過則筋骨手足以漸而堅如覺運動以漸而發日異而月不同曰變者變易也曰漸者發熱也蓋謂云變雖是胎毒非胎熱胎毒之可比此少陰生長之氣發育萬物者兒之強者雖有是病不覺氣弱者如兒如變後形體漸長知滋潤增反為無病兒也故無用治古方愚子散結置之可也其間或有未及期而發熱者或有變過熱而而不降者抑有他故謂之發熱之如昏睡不乳則不須治待其自退

寒證

變差之時有外感風寒者宜發散性溫散主之按摩法亦可用也內傷乳食者宜消導胃苓丸主之輕則節之可也而有被驚嚇及客忤者安神丸至聖保命丹如變差過受病以治病為主慎勿犯其胃氣咳嗽甘草桔梗湯加阿膠吐瀉中滿加霍香葉藿風戒功抱龍丸瀉毒丸導赤散如受病後而變差正補脾為主健其功散加對病之藥

夜啼

心虛火熱心熱則煩多夜啼或日夜啼宜導赤散主之

百日咳

小兒初生至百日內嗽者謂之百日內嗽痰多者宜玉液丸肺虛者阿膠散主之此名胎嗽最為難治如喘嗽氣促連聲不止以致發搐必死

自嬰氣促

初生

孩兒初生襁褓中如前秀實漸成意四因內外能分

古今圖書集成

博物彙編醫部全錄卷四百二十七醫部小兒初生諸疾門

第四五七篇之五

辨治不乖方大自功

幼科立方古有定訓兒初生后病者惟以膏乳佐而服之蓋以胎毒未定腸胃脆薄不勝藥劑立調治乳母之法一歲之後則有湯藥與大人同但劑小耳有因氣動而病生者內者如驚風發熱之類驚用安神丸內者用木香丸蟲用安蟲丸疳用消積丸有不因氣動而病生者內者如傷乳食之類初發以巴豆丸和之即之不去以保和丸消之不去以脾積丸取之即之不去以實勿損胃氣

有因氣動而病生者外者如結毒瘰癧疔毒之屬結核用家凝內消丸瘰癧疔用參九丹瘰癧疔用法有不因氣動而病生者外者如傷風傷寒傷暑傷濕之屬風用瀉毒丸防風散傷寒用理中丸傷暑用氣散暑用涼驚丸黃連香薷散濕用胃苓丸大承丸吞散

胎疾

胎疾初生治最難幼科證治者空矣丹溪妙論如獲墨案秘書中大約有

小兒胎病有不治者不可治者有難治者有難治之文東垣謂結毒之論則兒疾之生于父母者似乎不

必治矣一服之胎風不治自靜之疾咳難醫未二月而驚搐者因胎一月而胎風者死不可治者矣

今幼科有胎熱胎寒胎肥胎瘦胎驚胎驚之論理治雖詳豈小兒常服之藥也凡氣熱者胎胎之除毒也肥壯者父母之賦子也非性不可治亦且不可治矣惟丹溪論胎毒者只調治乳母其甚或功科之繩墨歟

胎毒者母懷時多熱病乃服寒涼之藥令兒受之生後發疹多脾間或沈乳渴白其候也或自口之內忽為喉乾口冷手足柔曲不伸拘攣握拳腹痛晝夜啼哭不止此生后受寒得之亦名毒胎宜服溫補之劑當歸散主之乳母宜服龍腦散

胎熱者母懷時食風炒辛熱之物或患熱病失于清解使兒受之生後口閉面赤眼泡浮腫常以身努宛呢作聲或時啼叫或時驚風遍身壯熱小便黃澀此胎熱也若不早治則丹瘤瘰癧由此而生宜用牛黃連氣甘草等分為末入珠砂半之和勻生薑調成劑每服豆許大納兒口中令其嚥下乳母宜服龍腦散

胎驚者母懷時曾因驚悸氣傳于子受之生後煩煩發驚此胎驚也不可治之無功如因有熱發搐者必先增寒亦名胎驚用燈心湯下東垣安神丸效如神不止者此真搐也勿治

小兒胎病有胎寒不足者宜地黃丸有胎毒者如胎熱法所謂胎毒不足者各隨五臟論之如胎毒心氣不足也心上行逆者胎氣不足也胎生驚風不

生者腎氣不足也胎者血之餘腎主血胎者骨之鈔腎主骨此胎病併者胎病之氣不足也脾胃為水穀之府諸虛短者脾氣不足也肺主聲

胎風

胎在身中號命關衛任在此養氣根最宜調護無傷損最忌差池減胎元

勝在南宮之謂調之命門乃人之根本也衛任胃三張皆起于脾之下任脈自中而上至千人中與腎脈

合傷脈。道來任脈而上散于舌下與脾合胃脈。二逆又各衝任脈而上下于臍中上下往來如環無端故男子十六歲而精行女子十四歲而血動任脈不衝胃脈實也小兒初生三脈方具而諸之關係尤重也所以斷脈之時不可不謹或剪髮太短或結縛不緊致外風侵入臍中或用鐵器斷臍為令所侵兒時或牽動臍帶水入生客客風寒虛毒入內傷于腎腎傳肝肝傳心心傳脾脾傳肺肺蘊蓄其毒發為驚風之病其證面赤啼哭者心病也手足攣握者肝病也唇青口撮者逆氣來者肝病也牙關緊者腎病也啼聲不出者肺病也五臟之中時見一二臟形證者病猶可治若見不能發肺風急候逢便傷一臟之中最不可不謹得病在何處起無求無思早預防

小兒初生一臟之內性諸風為最候也如胸膈腹痛啼哭不止唇青口撮者曰驚風牙關緊急吮乳不得啼聲不出者曰驚風肚腹膨脹者曰驚風大小便不通者曰驚風此三者同一病也但證不同耳俗名馬牙風者是也二逆多死驚風轉極者脾胃之氣絕于中也噤風乳食不入者心肺之氣絕于上也領肚大小便不通者肝腎之氣絕于下也任脈止衝脈閉胃脈散故之何不死死欲死此證須要預防

預防之法小兒初生三日之內但見噴嚏多啼不乳者此驚風之候也抱兒向明處視其喉中懸絲上刮有小泡如珠之樣初挾者即用銀挖耳或手拖白麝去之以軟細絲蘸甘草汁拭去其血去之早而治白者無患也其色黃或泡痰在前者入腹中者急用珠

砂牛黃散香各少許研細取豬乳汁調稀抹入口中或取豬乳汁一二匙與兒合之當驚風時乳汁小兒口噤不開最良或用生薑散如常歸川芎木通木香磨汁入藥內與乳母服或與兒服如上法

若失預防之法其病將來而口漸微多啼少乳者此腹中痛也與內約同五苓散散加酒當歸炒吳茱萸木香乳香沒藥同研各二分為極細末乳母乳如失實大納兒口中服之無時乳母仍服上五苓散又取附子桂等分為末生薑白熟汁調作餅約一分厚厚磨相等放在兒臍上以紙托住下用熨斗熨之如諸證悉見不可治也

按古方治驚風者初用控涎膏吐風痰次用益胃散和胃又用辰砂散利驚此良法也又用礪寶全蠍蜈蚣蜘蛛諸毒藥以祛驚風者此皆治其標也不治其本而治其標故鮮克有濟者矣然父母愛子之心必欲救之醫有活人之心不可不救也病輕者如上下五苓散為主蓋五苓散是太陽膀胱之藥也薄薄茯苓以養心安神官桂吳茱萸當歸以散風散邪之氣白木茯苓去以祛風寒濕之氣木香乳香沒藥以止腹中之痛官桂茯苓澤瀉諸苓又去時中之濕以釣離官桂去風之搖以入乳和之或乳母乳化其氣同也若有痰者本方加糖是末口噤者加白礪寶末更加入參末服之如大便不通者至三黃解毒丸下之此意則治其標也去其惡毒後如此法治之驚風之病有胎毒者十無一生吾見人家難子于危者所生之十多以胎風死如東垣所論紅腫之事足以知之

驚風者其帶四有所犯而落故根未嫩漸離而成者也白龍骨桂枝黃芩二味為末散之甚妙要實常宜勿使吐泄之內有尿濕也

驚風者小兒多啼所致也臍下為氣海啼哭不止則動氣氣動于中驚矣下理之常也其狀突出者先浮如吹者皆按則微有聲此證漸深但遇婦人挑水來者即抱兒以笑驚當攪頭上額之不掬口數以擠入為度每試輒效亦良法也吾見小兒驚風者多難奏由于多哭也

不乳兒生三日之內忽有不乳者當審問之勿以不乳即驚風治也驚風有多啼驚悸少證若此無之但不乳也有吐乳乳之又吐者或因飲口不淨惡物入腹也用黃連甘草木香木瓜各少許為末母用少許納兒口中乳汁下如有啼哭不乳者此腹滿也乃胎氣宜上方黃連甘草乳香沒藥以當歸湯心汁調藥如上噴之如無上證無故不乳者問其母之乳汁多不多者傷乳也宜少餵之不久自思乳矣乳小者自有他證心誠求之

驚風

孩兒多哭事堪憐何事連連夜間飢渴痛癢如不中拂其心意自煩燥

小兒初生百日一週之內神安意靜不妄哭多哭者易養如日夜啼哭不止者難養啼哭與哭不同啼者無時有聲而無淚也哭者時作時止大號而無淚也小兒啼哭非驚則渴非痛則痛為父母者心誠求之渴則飲之饑則哺之痛則撫之哭則止哭止者中其心也如哭不止當以意處嬰兒初生之性多純嬌

凡有親押之人玩弄之物一時不在其心不悅而哭謂之拋哭須急與之勿使驚傷肝氣生病也假如又不止請醫視之如大叫哭晝夜不止者肝熱也宜鴉膏丸主之淡竹葉湯入沙糖一豆許化下如日夜啼哭身熱面赤者心熱也宜薄荷赤散加黃連燈心湯服或用東垣珠砂安神丸燈心湯下神效

夜啼

夜啼四證驚風一無淚見燈心熱煩面赤煩書下膽痛難中煩哭是邪干

夜啼者臟冷也陰虛于夜則冷動冷動則爲陰極發膠寒甚作痛所以夜啼而不寐也約膠散合黃散主之

其心熱煩啼者必有酸紅舌白赤澀之病宜導赤散加麥冬燈心或東垣安神丸甚效

小兒夜啼見燈即止者此由點燈習慣乃抽哭也

驚啼者常在夢中哭而作驚錢氏安神丸主之有因客忤觸犯驚風而夜啼者宜四聖保命丹用燈草燒灰和藥拌細乳汁調塗乳上令兒吮之更以狗

法驗之

胎驚

胎驚發搐此胎毒也兒生一服之內多啼不乳或撮唇或牙關緊或肚大或驚哭發搐者此胎驚也謂之一

嬰胎生于內者氣喘痰喘手足冷者不治

嬰胎發搐此胎病也因發寒之痰或傷風或傷乳或受驚或發搐百日之內搐有真假皆曰胎驚真搐者頭發必死假搐者少宜散風化痰安胎至聖保命丹主之百日以後發搐口中氣熱此肝旺病也宜追青

九竹葉湯入沙糖少許化服後以至聖保命丹安其神如逢驚寒之期必發搐者此胎驚也自生者若不急治後成終身之病宜安理氣心定曉頻頻細與服之以不發爲度服傳三聖散主之

百辟喉

小兒百日內有痰喉者謂之百辟喉或因出胎之時暴受風寒或因浴兒之時爲風所襲或因解換襪裏或出懷暖乳皆風之自外入者也或因乳脉湧出吞嚥不及而錯喉者或因啼哭未足以乳哺之氣逆管

出者此病之從內出者也皆能爲喉如汗下調理之則痰與服之蓋胃氣方生也藥湯也或曰小兒百辟喉難治

如三百辟喉一歲及二歲者加以痰涎壅塞通氣沖併以救發驚風者多不可治蓋小兒無知痰在咽中不會吞吐往來自任故也將作搐者急進休砂膏以

降去之搗止者吉預搐者凶以頭搖者日帶一視者閉目呻吟者手足攣舞者有息暫突者喉中痰喘者口噤不乳者喘不休者手足冷者咬牙者皆死也

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第四百二十八卷目錄

醫部彙考四百八

小兒初生諸疾門一

勞伯嗣學嬰童百問

勞伯嗣學五經

王繪明醫雜著

薛氏保嬰秘傳

李梴醫學入門

錢廷賢萬病回春

小兒衛生總微論方

董鳳爭活幼精要

醫部彙考四百八

小兒初生諸疾門一

勞伯嗣學嬰童百問

勞伯嗣學五經

王繪明醫雜著

薛氏保嬰秘傳

李梴醫學入門

錢廷賢萬病回春

小兒衛生總微論方

董鳳爭活幼精要

勞伯嗣學嬰童百問

勞伯嗣學五經

王繪明醫雜著

薛氏保嬰秘傳

李梴醫學入門

錢廷賢萬病回春

小兒衛生總微論方

董鳳爭活幼精要

勞伯嗣學嬰童百問

勞伯嗣學五經

王繪明醫雜著

薛氏保嬰秘傳

李梴醫學入門

錢廷賢萬病回春

小兒衛生總微論方

董鳳爭活幼精要

勞伯嗣學嬰童百問

勞伯嗣學五經

王繪明醫雜著

薛氏保嬰秘傳

醫部彙考四百八

小兒初生諸疾門一

勞伯嗣學嬰童百問

勞伯嗣學五經

王繪明醫雜著

薛氏保嬰秘傳

李梴醫學入門

錢廷賢萬病回春

小兒衛生總微論方

董鳳爭活幼精要

勞伯嗣學嬰童百問

勞伯嗣學五經

王繪明醫雜著

薛氏保嬰秘傳

李梴醫學入門

錢廷賢萬病回春

小兒衛生總微論方

董鳳爭活幼精要

勞伯嗣學嬰童百問

勞伯嗣學五經

王繪明醫雜著

薛氏保嬰秘傳

李梴醫學入門

錢廷賢萬病回春

小兒衛生總微論方

董鳳爭活幼精要

勞伯嗣學嬰童百問

勞伯嗣學五經

王繪明醫雜著

薛氏保嬰秘傳

嬰兒盛作疹所以夜啼不眠也約勝散主之或心熱煩啼必有燥紅舌白小便赤澀之疹約勝散去書歸木香加硃砂木通照海關下又有獨兒驚風而夜啼者用醋炭煎可服蘇合香丸客作者小兒驚風氣弱外邪客氣鬱與物聚觸而竹之其候驚喘口出青白沫水數升雖面色變易喘息腹痛及側與癰狀似驚搐但眼不上竄脈來並逆而數視其口中懸雜左右若小小者核按即以竹針刺瀉之或以爪甲摘破亦佳治法辟邪正氣散驚定心爲上延久則難爲力也凡客作中惡惡作醋炭或降真香見而併用薰之仍服蘇合香丸即自痊愈治驚喘抽夾本方力能散散主之又有花火膏亦卒急可用也論曰心藏神神安則臟和故小兒驚得精神安而夜得穩睡若心氣不和邪氣乘之則精神不得安故驚驚而啼叫也安神散等劑治之又有驚啼之證小兒胞胎中其母將養失宜傳於風冷則邪氣入於胞胎既生之後冷氣停留復因乳哺不節邪氣與正氣相搏故腹中脹服咸是氣而啼也年黃丸善制主之冷甚者理中丸主之

胎疾

胎來期月數將滿母失調護或勞動氣血相干或坐臥傷胎或受寒或飲酒食肉辛辣熱制或受驚怖血脈相阻胎氣有傷兒形無備有胎熱胎寒胎驚胎弱等症胎熱則兒在胎中母多驚悸或因食熱毒之物誕生之後兒多虛寒氣急喘目眩淚困因欠不得伸舒呢呢作聲大小便不利或過利或有血水其則手常拳緊即當補虛胎驚當親身常覺胎由

胎中受熱宜速與人連茹飲子解散諸熱大與消風散散散無忌其胎驚風自見本證並不發連胎寒則兒在胎中母因受寒或胎寒或食寒生冷過度寒盛則胎驚風洩利泄瀉以亂其真治法寒邪當用和劑治藏寒則溫藏寒甚則用鹽湯內釣因寒而得之大便青者是也各有本證見之胎寒候則小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不運小便也扼了汗乳食不思啼叫不止若因母受寒而傳于胎也凡有此證乳母可服生地黃湯仍忌熱毒之物胎肥則生下肌肉厚遍身紅潤口以復漸漸瘦瘦口白崩粉紅色五心煩熱大輕時時生寒冷體壯主之胎弱則生下而面黃精光肌肉薄大便白不身無血召時時寒氣多藏目無精彩亦當治體法治之凡胎氣羸弱不養有弱其母飲食忌令飽飽起正無忌令兒得寒不寒即然不虛即怯熱乃作連虛則作驚怯則作結寒則溫之熱則涼之虛則壯養使則益衛醫用安神丸若用微利汗毒用之可保無虞不若古人胎教之法決無諸證生子必壯容端正爲世之英傑也

諸症

吳氏云小兒四五歲不能言蓋人之五臟以心之聲爲言所不能言者由在胎時其母有驚怖內動於兒臟邪氣乘於心故心氣不足而不能言也宜服錢氏萬應丸以意加減減服服效
百碎內嗽
此名乳嗽喉關調理不忌證也當審虛實而施治實者散之虛者補之其證氣露痰盛口瘡服熱散

後可利之其金丸等藥主之散其質也其語啞吐或驚悸困倦自汗常帶補肺散散散散大厥散補其虛也大抵治驚風項項項項之風丸乃要藥也用天麻麻湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯白閉子痘黃末之煉蜜丸如失實人今須爲衣每服九補湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯也
王瑞明醫著

胎風

小兒初生百日內脾風方易治用南星磁石風藥多不效當作胎毒治陽明火邪馬牙亦是胎毒耳針挑破藥白汁塗之藥汁主小兒麻口及口瘡上唇神效初生小兒時時與看顫傳染汁不然苦硬緊漸至撮口難治
按按世難治
小兒見一七之內射腹腹硬發熱汗隨振口不開胎前而內名胎風或因勞動帶少短或因求乳不緊受胎風入胎中或因經絡斷胎冷氣入內傳於脾脾發熱強悍高手足微搐不能吮乳略強似獨眠痰涎壅塞口泡去其海水以艾炙臍中亦有後生者治法多端無如灸法或以天南星一錢生薑自然汁調搽爲妙
小兒無補腎法
小兒無補腎法蓋腎氣弱而生此天一生水化生之源腎之根也此根日耗神弱乳食水較長養至十歲而腎始充滿此後神機安用對損則可用藥補之若受胎時稟賦之不足則可無補藥之原足又何待於補耶

按小兒行遲齒遲顛傾五軟語謬肝腎兩
虧肺白多愁凡此皆因受胎腎氣不足當以六味
地黃九加鹿茸補之若因精氣未滿而御女以通
多致頭目眩暈發渴吐衄或發熱足熱腰腿痠軟
或自汗盜汗一便濁漸變生諸疾候以名狀余嘗
用六味八味二九及補中益氣之劑加減用之無
不奏效

膈風方用酒謔湯天麻丸之類以去痰涎後用益脾散之類補胃氣若遇過寒者氣平口噤是爲內障不治受病之源也凡乳母月事不調氣鬱滯所致若小甲常仲行時服此藥亦有用大連他條子之類又田氏治噎風風人南星末一錢片膽少許以指蘸藥汁擦臍間升丹散亦是驗然久未愈乃以猪乳調五分徐塗之或用牛黃以竹滑調散一字隨猪乳滴於口中至惡心即止全獲靈龜烏末水調搽鼻中錢氏云撮因陰發拭臍風都所入而作用益黃散補之無嫌視其齒隙有泡瘡者吐既開用黑白蠟羅香木蜜食綠口內保嬰散小兒口勝風烏末當作伏龍朱當明火用針挑破以桑白皮汁塗之又云初生乳兒時時僅承乳汁不多多打舌硬撮口之證稱謂膈風因冷試外傷皮膚者用綿紙或枯礬灰捺即愈若三四日不理緊要投兒見患動當治其母因恐驚胎少壯乳母調經散以救前患風入齶中則因男婦驚散風傳於腭絡以致前後者口內有小泡急搗桃仁五苓膏水以艾炙臍中亦有

生者

小兒胎氣虛常微風到驚化胎命丹釣懸散全喉以珠銀粉之。若面赤者搽頂心保命丹釣懸散全喉之類大抵小兒胎氣虛弱不可概用假借虛寒之劑反傷其氣多致不救者且妊娠每月各有經脈滋養一六屬胎一月屬經二月屬心三月屬小腸五月屬脾六月屬胃七月屬肺八月屬大腸九月屬腎十月屬膀胱。胎氣虛者胎動不安而作也須察於某月受病在某經則其陰陽虧其脾胃兼以貼臍之藥佐之無有不愈。

小兒初生其身有如湯發火能者此皆乳時過食膏
藥所致也其母宜服清胃散及益蓬散以清其氣血
兒亦飲淡湯可用也身有皮而面不赤者皆由產
母脾氣不足也用桂木特傳之藥滋養然者皆由產
母胃中火盛也用水煎之經謂脾主肌肉肺主皮
毛故知病脾肺也如腦額生瘡者火土相合遂成溫
熱下流攻腎水也難治如脚上有瘡者陰虛火盛
也此不滿五歲而輕如未滿月而微口握拳攣軟如

因大病虧損胃氣而清熱虛弱所致者用補中益氣湯鎮以地黃丸若面唇赤色正屬腎水不足肝經陰虛火動而內生風熱爾當滋腎水以制陽光其身軀者內氣氣不足肌肉未堅也當黎五軟而施治之

虛諸陽之氣不足也乃天柱骨弱腎主骨足少陰主

[illegible]

五更者頭顱收斂難以動風氣更作傳達於腎獨
手心冷而硬此陽氣不營於四末也經曰脾主四肢
又曰脾主諸陰手足冷而硬者獨陰無陽也故難
治右肝筋青者木乘土位也急用六君子湯加
薑內桂枝附片以益其氣若係風邪當聚驚風
治之此亦肝旺脾弱受風當補脾肝仍參經

初生旬日之間口閉舌赤眼胞腫啼聲喘壯熱黃此在胎中受熱及膏粱內蘊宜用清胃散之類寒者初生自口內手足攣屈或口嚥不開此在胎中過食生冷或感寒氣宜用五味異功散之類胎者體小俱黃小便便澀不通乳啼或乾影惡渴此胎母過食鹹辛辛辣致生濕熱宜用地黃湯之類

熱盛者渴甚數飲頻飲肥者肌肉豐厚身血色滿月後漸瘦生心煩熱大便不利口吻逆逆此受母胃熱所致也母服大連糖飲兒用浴體法以疏通其腠理弱者而無精光肌體瘦弱身無血色大便白水時時咽氣目無精神亦宜用浴體法

夜啼

夜啼有二一脾寒白心熱也夜屬陰陰勝則脾寒之寒虛脾為生於喜溫而惡寒則腹中作痛故曲腰而啼其候面青白手腹俱冷不思乳食是也亦曰胎寒用釣藤散若見燈亮啼者心熱也心熱火見燈則顯熱生而陽相搏故仰身而啼其候面赤手腹俱熱口中氣熱是也用六神散若兼吐瀉少食脾胃虛寒也用二君炮木香大腹不化食少腹脹脾氣虛弱也用真功散心血不足者兼用安神丸水火相搏者柴胡梔子散肝血不足者兼用黃丸大抵此證或因吐瀉內亡津液或因胎前產後失調而致者用如味歸脾湯母若兼怒者加味小柴胡湯乳母心肝熱者兼用胡梔子散仍宜各各察其驚啼之

悲哭

悲哭者脾之經液者肝之液也若六脉皆緊者先以溫湯浸其乳取乳汁以溫湯散之類清其內熱此服反傷脾金木相擊故悲哭有聲者宜用六君柴胡

由然以補脾清肝用六味丸以壯水生木有因驚風過服壯氣燥血之藥而致者有因吐瀉內亡津液而致者及惡父驚陰不足不能生肝者治各藥之苦小兒忽然大叫作聲者不治此驚陰除不足虛火炎上故也用六味丸多有生者仍恐驚夜啼者竹驚啼者舌口瘡大鈞內釣等證

胎逆

錢氏云心之聲為言小兒四五歲不能言者由妊母卒有驚動邪來兒心致心氣不足故不能言也有稟父腎氣不足而亡運者有乳母五六遺熱用寒氣逆者有前後津液內亡會歇乾渴者亦有脾胃虛弱清氣不升而亡運者心氣不足用真功散九君氣不足用羚羊丸閉寒氣逆用加味道遠散津液內亡用七味白木散脾胃虛弱用補中益氣湯

百疳內嗽

百疳內嗽者名乳嗽其證調理當審其虛實若氣粗痰盛口瘡眼熱先用比金丸喘吐驚悸困倦自汗用補肺散驚厥用琥珀散乳嗽用大蘇丸若脾胃內熱用抱龍丸風邪外感者用惺惺散痰熱吐舌面氣粗痰盛或流涎者脾熱氣虛也用真功散加桔梗口瘡眼熱大便堅實者用二黃丸大便不實者用白朮散若喉吐不乳困倦白汗或白利瘦者脾胃氣虛也用六君子加柴胡芍藥等困倦倦感不乳者心脾血虛也四君子加芍藥酸棗仁或因乳母食肉辛厚味致兒為患者仍恐驚嗽諸證

樓英醫學綱目

百日內不治證

發泄肺風口馬聲風逆背

胎毒

胎毒而紅里諸多者胎毒法面黃日里諸多白胎多者多哭更則父母母肥不可生瘦瘦不可生肥也母氣不足則胎毒瘦肉黃不食不足則解胎服口多胎熱生下有血氣時時哭身壯熱如漢茶色目赤大便赤黃稠黏膿液法主之

小兒在胎時因母有熱或受食毒物無益毒之物傳於胎中令兒生一由赤眼閉身腫壯熱哭啼不止口熱如渴乃胎毒之候也宜生地黃湯以宣熱散之必損脾胃加以嘔吐乃成大患宜服生地黃湯用醃乳法

小兒胎毒

小兒胎中有寒生下不能將養再傷於風其候面色青白四肢逆冷手足顫動口熱不開乃胎寒之故或寒氣乘虛入臟作胎喘逆等內釣

月寒生驚

月寒生驚急取諸乳細研辰砂牛黃各少許調抹口中神效乳身服防風通聖散二劑其驚自消

邪氣使機物白下

邪氣使機物白下而不飽也

夜啼

小兒夜啼有四時一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰客忤寒則腹中痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲