

全氏痘疹秘錄

已集

邦字子抄

全氏家藏痘疹秘錄卷六已集

灌漿門

灌漿總論

灌漿症治

家傳方治

清毒活血湯

全氏解毒涼血湯

四物化毒湯

保元化毒湯

十全化毒湯

參茸歸鹿茸湯

滋陰養榮湯

禁忌

脾胃

避穢香

全氏加味保元湯

苗陳董法

正氣飲

花椒奪命法

十全大補湯

七味豆蔻丸

不膿

全氏加減益氣四物湯

全氏加味解毒涼血湯

全氏滋陰養膿湯

嘔吐

泄瀉

人參白朮散

陳氏十一味木香散

十二味異攻散

豆蔻丸

不二散

加減補中益氣湯

戊己丸

痒癩

四物湯

芪歸湯

四君子湯

八珍湯

四聖化毒湯

參歸化毒湯

全氏止痒飲

茵陳薰法

大補解毒湯

救苦散

呂氏薰法

保元湯

煩燥不眠

龍腦丸

導赤散

加減四物湯

酸棗仁湯

安神丸

殊砂益元散

四物寧神湯

一捻金

噎水音啞

甘桔化毒湯

養心化毒湯

瀉白化毒湯

全氏瓜蒌飲

治痘出在喉上

咽喉不利涕唾稠粘

牛黃奪命散

全氏清熱化癰湯

寒戰咬牙

養衛化毒湯

清神化毒湯

導赤化毒湯

加味參歸湯

回陽化毒湯

加味解毒湯

睡夢呢喃

寧神化毒湯

寧神丸

導赤散

癰爛

胆導法

敗草散

全氏托裏解毒湯

天水散

百花膏

發渴

人參麥冬湯

葛根解毒湯

當歸丸

理中丸

黃芪建中湯

家傳益氣和胃丸

家傳三奇丸

家傳蜜導法

救逆

全氏陳皮竹茹湯

四肢發熱厥逆

三一承氣湯

陳氏十二味異攻散

百祥丸

益氣和胃丸

牛黃奪命散

灌漿吉凶

灌漿總論

萬氏曰痘瘡出初原係一點血歟變成小小血泡漸漸起發長大矣血化為水水轉為泡由水泡而轉為膿泡者始為成寔成寔之時却要個個成膿肥厚飽滿根脚紅活顏色蒼老如此則可以刺定日數而知收靨之期也

管氏曰膿者血之變也有血則有膿無血則無膿痘至灌漿大勢已成有膿則生無膿則死必然之勢也

萬氏曰痘至養漿時先出者先作漿後長者後作漿大小亦如此磊落分明不相粘連者上也痘瘡稠密長大胖壯以至作漿未有不相串者只要陷者盡起無處不透轉成膿者次也人言

痘瘡只到成膿則毒氣已解便稱無患不知膿亦有吉有凶如瘡皮堅厚膿漿渾濁約束完固無少破損此真吉兆也若瘡皮軟薄膿水清沒滲漏淫濕易於破損者此猶凶也

乘六曰痘瘡全以膿色為主膿成一分則毒出一分膿成十分則毒出十分若膿成五分則毒僅出一半耳雖獲活命後必發為癰疽若膿僅成一二分或三四分則在內之毒尚多勢必外剥而死矣故成膿之時較之起脹猶為緊要而用藥不可稍緩也再囑其看守之人日夜謹伺不可一時少離恐發痒搔破則膿不得成而致生他變也

痘至七八朝漸次起脹灌漿由紅轉白變成膿漿漸漸肥澤而
且斂束完固者吉兆也。若嫩軟皮薄明亮膿水清波或滲漏淫
濕或水汽空殼而更重搔痒破損者凶候也。若板硬乾黃者毒
威氣鬱血滯也。灰暗紫滯者毒威血不化也。膿治宜活血攻毒解
毒清毒活血湯主之。若痘色紫滯痘形焦枯者毒火灼乾血液
也。急宜攻毒解毒涼血湯加大黃主之。若痘囊浮脹根無紅暈
而殼中出水者氣至而血不隨也。四物化毒湯主之。或根頗紅
潤痘形軟嫩皮薄而陷者血至而氣不充也。保元化毒湯主之。
若皮薄漿清根無紅暈氣血俱虛也。宜用參歸鹿茸湯或十全
大補湯治之。

錦囊曰或問痘瘡之膿漿從何經生來從何經收去答曰痘起
於腎而原伏於腎天一生水腎之謂也腎主骨髓痘毒所伏也
故膿漿始於天一之水然乙癸同源必借木由所以助之是其本
源於腎注於心調暢於肝衛養在於脾收藏伏於脾水火相濟
以成其功又賴戊土以成其實故痘終變而為黃者乃陽明土
之正色也是以無漿則毒不化漿不足則毒不盡毒伏於水必
賴腎以生之毒化於土必賴脾以收之故膿漿之來雖由於肝
血實資於真水真水者即真陰也膿漿之收雖賴於脾土實籍
於真火真火者即真陽也膿漿之理於此昭然矣

來六曰行漿之時毒傳於肺肺主金其色白故白色為膿漿七

日之後聲音多嘎其屬於肺又可徵矣七日之前當用清涼七日之後當用溫補此常法也若瘧毒過盛期前未經清解雖已過七日滿頂通紅或帶紫色猶當以解毒為急不可拘乎常格也若頂已放白紅色附根紅活光澤者不藥而愈若頂平而陷色淡而白或帶皺紋淫淫或無血色氣血兩虛不用大補則煩燥不安虛寒過甚而僅用平補則藥不勝病總在人之活變何如耳

翁曰病緩而投急劑急則拂亂其經病急而用緩藥緩則援救不及其深得用藥之妙乎

清毒活血湯 紫草 當歸 木通 生地 連翹 牛蒡子

山查 桔梗 黃連 黃芩 人參 黃芪 甘草 燈引

全氏解毒涼血湯 連翹 紫草 生地 丹皮 紅花

山查 赤芍 芥穗 石莖 青皮 甘草

四物化毒湯 當歸 川芎 生地 丹皮 麥冬 牛子

防風 水煎服

保元化毒湯 穿山甲 人參 黃芪 天草 川芎 山查

紫草 廣木香 姜奎 白芷 煨姜引

十全化毒湯 黃芪 人參 當歸 連翹 牛子 川芎

參歸鹿茸湯 人參 黃芪 天草 歸身 鹿茸 酒 元肉 三枚

生姜 三片 糯米 百粒 局引

滋陰養榮膿湯

全氏家傳痘至七八日行漿時宜服之

沙參

麥冬

花粉

白芷

姜蚕

芥穗

桔梗

甘草

或生或炙隨症用之

加減法

皮薄有皺加黃芪炙草皮薄色淡而嫩加人參炙草

當歸川芎虛而有熱加生地虛寒加熟地色白或淡泄瀉加

人參鹿茸痘色紅赤加赤芍丹皮紅花生地痘色紫滯加

紫草丹皮桃仁翻白草歸尾紅花或鮮生地黃汁或酒炒黃連

重用山查夾疔加翻白草地疔丁桃仁夾癰加元參紅花吐舌

弄舌加黃連木通生地吐加陳皮藿香陳壁土瀉加木通乾

嘔加姜炒黃連大便秘加大麻仁或大黃小便赤澀加車前

子唇燥口乾加石羔煩躁不安加滑石灯心渴加紅花籽咳

嗽發喘加杏仁貝母蘇梗失音喉疼加元參牛子射干腹痛
加大黃失血加側柏葉京墨童便百草霜白痢加肉桂血痢
加白頭翁黃芩椿根白皮肺熱寒戰重用沙參氣虛寒戰加
人參黃芪腎熱咬牙加石羔黃連血虛咬牙加當歸

乘六曰痘至行漿當用補劑而苦寒之屬不宜輕用痘色深紅
屬有餘症不須忌之若痘症屬虛用大寒大涼之劑一為冰伏
則氣滯血凝膿不能生而有痒痛之虞矣此時不宜輕下若腹
疼便秘者下之亦不妨事但不可過耳

禁忌 與首卷禁忌條參看

準繩痘瘡起發之初當避風寒遠人物節飲食守禁戒到此養

漿之時比之起發尤宜謹慎蓋前此人病未久而氣血尤強足以禦乖戾之變也至此氣耗血虧精神減損少有乖戾不能保任之况瘡始成救猶易觸犯不可不加謹矣如天氣大熱則徹去衣被令常清涼但謹慎門戶窻帳帷勿使邪氣透入天氣大寒則厚加服被令常溫暖更用親近老成之人左右侍之房舍中要明亮勿絕打心火常燒避穢香令香氣襲入日夜常用一人看視互相更替勿令疲倦恐成或作痒為之撫摩莫使搔破以致潰爛難以結痂

賓王翁從武涉縣避暑往溫縣治痘道經馬庄村村外道傍有大柳樹一株二婦人在樹下守一出痘之兒啼哭不已翁在轎

內望見此兒曰邪氣所觸故致頂陷色滯而暗治之而愈何故
啼哭耶婦人叩首而言曰請醫皆云不治先生遠望即知端底
乃活命神仙也願乞良方以救此兒則焚香感德矣翁用保元
湯加紫草紅花命服三劑外以茵陳薰法而愈 又有花椒奪
命法正氣飲乃治灌漿時觸胃作痒之方也亦錄於後

脾胃

萬菊軒曰痘瘡不怕稠密只要能食無有不全者也凡用藥不
可犯其胃氣蓋人以胃氣為本胃強則氣血充實自然易成膿
漿飽滿堅厚不須服藥胃弱則氣血少不能周灌於身而使之
作漿是以虛軟清浹雖有微漿亦水而已宜十全大補湯去生

地加廣木香。或人參白朮散去葛根加黃芪肉桂多服乃佳。然脾胃之強弱在於食之多少。使之堅瀉而已。若食少而大便堅實者。脾胃之氣猶足也。食少而大便泄瀉者。脾胃之氣益虛也。用四君子湯送下豆蔻丸。復以人參白朮散去葛根加黃芪肉桂服之自安。如能食而大便又堅數日未更衣者。宜用胆導法通之。務使氣血流通榮衛和暢而瘧自易瘳。易瘳易瘳不致癰爛也。乘六曰脾胃為後天之本。然人自有生以來。俱以飲食為主也。故經云得穀者昌。絕穀者亡。蓋以飲食為急也。初出之際多不能食。至行漿之時。毒已外發。脾胃宜開。若能大進飲食。膿自易灌。如瘡本稠密。至行漿時。猶不思飲食。而瘡必空。穀穀無膿。

乃凶兆也。若因有食積而惡食者，不在此例。小高庄原二外，甥出痘時，七八朝猶不能食，而痘以期起，灌膿得七分。余曰：此刻雖不能食，而此子前有食積，待食積消後，自能食矣。及至十朝，大進飲食，調理十七日而愈。

避穢香 蒼朮斤半 大黃四兩 大秦十枚 共為末，爐中燒之，不可間斷，以避一切穢惡雜氣。

全氏加味保元湯 人參 黃芪 炙草 紫草 紅花

茵陳薰法 用乾茵陳研末，搗棗膏為丸，如雞卵大，曬乾，燒於屋內，常常薰之。

正氣飲 人參 妙仁 黃芪 陳皮 歸尾 川芎 丹皮