

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷五十八



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十八

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

大腸腑方

痰飲第六

大司馬

論

曰夫飲有四何謂師曰有支飲有懸飲有溢飲有支

飲有支飲有懸飲有溢飲有支

飲有懸飲有溢飲有支

飲有支飲有懸飲有溢飲有支

飲有懸飲有溢飲有支

飲有支飲有懸飲有溢飲有支

水在脇下欬唾引痛

謂之懸飲飲水過多水行歸於四肢當汗出而汗不出
身體疼重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得臥其人
如腫謂之支飲

凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癩先寒
即為虛先熱即為實故水在於心其人心下堅築築短
氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在
於脾其人少氣身體盡重水在於肝脇下支滿噎而痛
水在於腎心下悸

夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脉雙弦者寒也皆大下後喜虛耳脉偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脉平也留飲形不發作無熱脉微煩滿不能食脉沉滑者留飲病病有留飲者脇下痛引缺盆嗽轉甚其人欬而不得臥引項上痛欬者如小兒掣癇狀夫胃中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脉沉者有留飲也心下有留飲其人背寒冷大如手病人肩息

上引此皆有溢飲在胃中久者缺盆滿馬刀腫有劇時
此為氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛
惡寒目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲病人一臂
不隨時復轉移在一臂其脉沉細此非風也必有飲在
上焦其脉虛者為微勞榮衛氣不周故也冬自瘡一本作久
久自瘡

病痰飲者當用溫藥和之

小半夏湯病心腹虛冷遊痰氣上胃脇滿不下食嘔逆

者方

半夏升一

生薑斤一

橘皮兩四

右三味咬咀以水一斗煮取三升分三服若心中急

及心痛內桂心四兩若腹滿痛內當歸三兩羸弱及

老人尤宜服之用人參二兩

仲景無橘皮人參

又方半夏升一

生薑斤一

桂心兩三

甘草兩一

右四味咬咀以水七升煮取二升半分三服

甘草湯治心下痰飲胃脇支滿目眩方

甘草

二兩

桂心

白朮

各三兩

茯苓

四兩

右四味㕮咀以水六升宿漬煮取三升去滓服一升

日三小便當利

十棗湯治病懸飲者若下後不可與也凡上氣汗出而

欬者此為飲也

方見欬篇中

小青龍湯病溢飲者當發其汗

方見欬篇中

范汪用大青龍

湯木防已湯膈間有支飲其人喘滿心下痞堅面色鰲

黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈者用此方

木防已

三兩

桂心

二兩

人參

四兩

石膏

雞子大
十二枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升分二服虛者即愈
實者三日復發發則復與若不愈去石膏加茯苓四
兩芒硝三合以水六升煮取二升去滓下硝令烺分
二服微下利即愈一方不加茯苓

厚朴大黃湯夫酒客欬者必致吐血此坐久飲過度所
致也其脉虛者必胃其胃中本有支飲支飲胃滿主之

之方

厚朴一尺

大黃六兩

枳實四兩

右三味咬咀以水五升煮取二升分為二服溫服之

葶藶大棗瀉肺湯治支飲不得息方見肺癰篇中

小半夏加茯苓湯嘔家不渴渴者為欲解本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之又有先渴却嘔者此為水停心下小半夏加茯苓湯主之治卒嘔吐心下痞膈間有水目眩悸方

半夏一升

茯苓三兩

生薑半斤

右三味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓分再服

溫服之胡洽不用茯苓用桂心四兩

五苓散假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而癰眩水也此

方主之方見前第九卷中

椒目圓腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主之

椒目

木防己

大黃各兩

葶藶二兩

右四味為末蜜丸如梧子大先食飲服闕丸日三後

稍增口中有津液止渴者加芒硝半兩

甘遂半夏湯病者脉伏其人欲自利利者反快雖利心

下續堅滿此為留飲欲去故此方主之

甘遂大者三枚 半夏十二枚水一升煮取半升

芍藥三枚

甘草一枚如指大水一升煮取半升

右四味以蜜半升內二藥汁合得一升半煎取八合

頓服之

大棗苓湯主胃中結痰飲澀結臍下弦滿嘔逆不得食

亦主風水方

茯苓

白朮

各三兩

當歸

橘皮

附子

各二兩

生薑

半夏

桂心

各四兩

細辛

四兩一作人參

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服服三

劑良

茯苓湯治胃膈痰滿方

茯苓

四兩

半夏

一升

生薑

一斤

桂心

八兩

右四味㕮咀以水八升煮取二升半分四服冷極者

加大附子四兩若氣滿者加檳榔三七枚

此方與前卷嘔吐篇

方相重分兩
加減法不同

大半夏湯治痰冷癖飲胃膈中不理方

半夏

升一

白朮

兩三

生薑

兩八

茯苓

人參

桂心

甘草

附子

各二兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服

半夏湯治痰飲癖氣吞酸方

半夏

吳茱萸

各三兩

生薑

六兩

附子

一枚

右四味以水五升煮取二升半分三服老小各半日

三

乾棗湯治腫及支滿癖飲方

大棗

十枚

大戟

大黃

黃芩

甘草

甘遂

各一兩

芫花

葶花

各半兩

右八味㕮咀以水五升煮取一升六合分四服空心

服以快下為度

當歸湯治留飲宿食不消腹中積聚轉下方

當歸

人參

桂心

黃芩

甘草

芍藥

芒硝

各二兩

大黃

四兩

生薑

澤瀉

各三兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治痰飲飲食不消乾嘔方

人參

旋復花

橘皮

細辛

各一兩

澤瀉

白朮

杏仁

枳實

各二兩

茯苓

柴胡

生薑

半夏

芍藥

各三兩

右十三味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服日

三

治胃中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

檳榔

十二枚

生薑

杏仁

白朮

各四兩

半夏

八兩

茯苓

五兩

橘皮

三兩

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服